

# حل المسائل حسابان دوازدهم ریاضی

کانال گام به گام درسی :

**@GamBeGam-Darsi**


با تشکر از گروه ریاضی دوره دوم  
متوسطه استان خوزستان برای تهیه و  
تنظیم این فایل

توجه : کانال گام به گام درسی در سایر  
پیام رسان ها هیچ گونه فعالیتی ندارد

## تابع

- ۱ تبدیل نمودار توابع
- ۲ تابع درجه سوم، توابع یکسوا و بخش پذیری و تقسیم

## فصل



پل طبیعت (جوزان)

بسیاری از توابع طبیعی به کمک توابع مدل‌سازی می‌شوند. تبدیل نمودار تابع  $y = 11.22 \sin\left(\frac{\pi}{6}x - \frac{\pi}{6}\right) + 19.12$  مدل ریاضی زمان‌های غروب آفتاب در اقصای هر ماه شهر تهران است که نمودار آن در بالا رسم شده است.


## تبدیل نمودار توابع

درس


برای رسم بسیاری از توابع، نیاز به روش‌های پیچیده نیست. اگر نمودار یک تابع را در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم به کمک برخی از تبدیل‌ها، نمودار توابع دیگری را رسم کنیم.

### انتقال‌های عمودی و افقی

در سال‌های قبل با انتقال‌های عمودی و افقی آشنا شده‌اید. به‌عنوان مثال می‌توانید نمودار توابع  $y = x^2 + 3$  و  $y = (x+2)^2$  را به کمک نمودار تابع  $y = x^2$  رسم کنید.



(ب)





(الف)

در حالت کلی (مانند مثال بالا، قسمت ب) اگر یک نقطه از نمودار تابع  $y = f(x)$  باشد و تابع  $g$  به صورت  $g(x) = f(x) + k$  تعریف شده باشد، آنگاه:

$$g(x) = f(x) + k = y + k$$

بنابراین نقطه  $(x, y+k)$  از نمودار تابع  $g$  متناظر با نقطه  $(x, y)$  از نمودار  $f$  است.

برای رسم نمودار  $y = f(x) + k$ ، اگر  $k > 0$  باشد، کافی است نمودار تابع  $f(x)$  را  $k$  واحد در راستای قائم به سمت بالا انتقال دهیم و برای  $k < 0$  این انتقال به سمت پایین انجام می‌شود.





به روش مشابه، اگر  $(x, y)$  یک نقطه از نمودار تابع  $y = f(x)$  باشد و تابع  $h$  به صورت  $h(x) = f(x+k)$  تعریف شده باشد، آنگاه:


$$h(x, -k) = f(x, -k+k) = f(x, y)$$

بنابراین نقطه  $(x, -k)$  از نمودار تابع  $h$  متناظر با نقطه  $(x, y)$  از نمودار تابع  $f$  است.

برای رسم نمودار  $y = f(x+k)$ ، اگر  $k > 0$  باشد، کافی است نمودار تابع  $f(x)$  را  $k$  واحد در جهت افقی به سمت چپ انتقال دهیم و برای  $k < 0$  این انتقال به اندازه  $|k|$  واحد به سمت راست انجام می‌شود.



**مثال:** نمودار تابع  $y = \sin x$  با دامنه  $[0, 2\pi]$  رسم شده است. می‌خواهیم نمودار تابع  $f(x) = \sin x + 2$  و  $g(x) = \sin(x - \frac{\pi}{4})$  را به کمک انتقال رسم کنیم. با توجه به توضیحات بالا، کافی است نمودار تابع  $y = \sin x$  را ۲ واحد به بالا انتقال دهیم تا  $f(x)$  رسم شود (شکل الف) و اگر آن را  $\frac{\pi}{4}$  واحد به راست انتقال دهیم،  $g(x)$  رسم می‌شود. (شکل ب)



(ب)



(الف)

کارد کلاسی

الف) نمودار تابع  $f(x) = \sqrt{x}$  را با دامنه  $[0, 4]$  رسم کنید و برد تابع را مشخص کنید.  
 ب) نمودار توابع  $k(x) = f(x-2)$  و  $g(x) = f(x)+3$  را به کمک انتقال رسم کنید.  
 ج) دامنه و برد توابع  $k$  و  $g$  را محاسبه و با دامنه و برد تابع  $f$  مقایسه کنید.



	$f(x) = \sqrt{x}$	$k(x) = f(x-2)$	$g(x) = f(x)+3$
دامنه	$[0, 4]$	$[2, 6]$	$[0, 4]$
برد	$[0, 2]$	$[0, 2]$	$[3, 5]$

ج) بازه دامنه تابع  $k$  از انتقال بازه دامنه

$f$  در راستای افقی به اندازه ۲ واحد به سمت راست به دست می‌آید و برد تابع  $k$  همان برد تابع  $f$  می‌باشد.

بازه دامنه  $g$  همان بازه دامنه تابع  $f$  است و بازه برد تابع  $g$  از انتقال ۳ واحد برد  $f$  در راستای قائم به سمت بالا به دست می‌آید.




فصل اول: تابع ۵

۱ در زیر، نمودار توابع  $y = \cos x$  و  $y = \log_2 x$ ،  $y = 2^x$  رسم شده‌اند. نمودار توابع  $y = \cos(x + \frac{\pi}{2})$ ،  $y = \log_2(x+2)$ ،  $y = 2^{x-1} + 2$  را به کمک انتقال رسم کنید.


رسم: با انتقال یک واحد در راستای افقی به طرف راست واحد در راستای عمودی به طرف بالا

رسم: با انتقال ۲ واحد در راستای افقی به طرف چپ



رسم: با انتقال یک واحد در راستای افقی به طرف چپ



مثال: نمودار تابع  $f$  به صورت زیر داده شده است. با انتقال‌های افقی و عمودی، نمودار تابع  $y = f(x+1) - 3$  را رسم می‌کنیم.



برای این کار ابتدا نمودار تابع  $f$  را یک واحد به سمت چپ انتقال می‌دهیم تا نمودار تابع  $y = f(x+1)$  رسم شود (شکل الف) و سپس این نمودار را سه واحد به پایین منتقل می‌کنیم تا نمودار تابع  $y = f(x+1) - 3$  رسم شود (شکل ب).



(ب)

(الف)




## انبساط و انقباض عمودی

فعالیت

1 در جدول زیر، چند نقطه از نمودارهای توابع  $y = \sin x$  و  $y = 3 \sin x$  را مشخص کرده و نمودار آنها را در بازه  $[0, 2\pi]$  رسم کرده ایم. با تکمیل این جدول، نمودار تابع  $y = \frac{1}{3} \sin x$  را نیز در دستگاه زیر رسم کنید.

$x$	$0$	$\frac{\pi}{2}$	$\pi$	$\frac{3\pi}{2}$	$2\pi$
$y = \sin x$	$0$	$1$	$0$	$-1$	$0$
$y = 3 \sin x$	$0$	$3$	$0$	$-3$	$0$
$y = \frac{1}{3} \sin x$	$0$	$\frac{1}{3}$	$0$	$-\frac{1}{3}$	$0$



2 با مقایسه نمودارهای بالا، نمودارهای توابع  $y = 3 \sin x$  و  $y = \frac{1}{3} \sin x$  چه تفاوتی با نمودار تابع  $y = \sin x$  دارند؟  
 نمودار تابع  $y = 3 \sin x$  نسبت به نمودار تابع  $y = \sin x$ ، انقباض عمودی با ضریب انبساط 3 داشته است.  
 نمودار تابع  $y = \frac{1}{3} \sin x$  نسبت به نمودار تابع  $y = \sin x$ ، انقباض عمودی با ضریب انقباضی  $\frac{1}{3}$  داشته است.

3 دامنه و برد توابع  $y = 3 \sin x$  و  $y = \frac{1}{3} \sin x$  چه تفاوتی با دامنه و برد تابع  $y = \sin x$  دارند؟  
 دامنه تابع  $y = 3 \sin x$  همان دامنه تابع  $y = \sin x$  است. ولی برد تابع  $y = 3 \sin x$  نسبت به برد تابع  $y = \sin x$  انقباض عمودی با ضریب انبساط 3 داشته است به این صورت در حالت کلی اگر  $(x, y)$  یک نقطه از نمودار تابع  $y = f(x)$  باشد و تابع  $g$  به صورت  $g(x) = kf(x)$  تعریف شده باشد، آنگاه: که برد تابع  $y = \sin x$ ،  $[ -1, 1 ]$  می باشد؛ شد برد تابع  $y = 3 \sin x$ ،  $[ -3, 3 ]$  می باشد.

$$g(x) = kf(x) = ky.$$


بنابراین  $(x, ky)$  یک نقطه از نمودار تابع  $g$  متناظر با نقطه  $(x, y)$  از نمودار تابع  $f$  است.

ارائه جدول 3: دامنه تابع  $y = \frac{1}{3} \sin x$  همان دامنه تابع  $y = \sin x$  است ولی

برد تابع  $y = \frac{1}{3} \sin x$  نسبت به برد تابع  $y = \sin x$  انقباض عمودی با ضریب انقباض  $\frac{1}{3}$  داشته است به این صورت که برد تابع  $y = \sin x$ ،  $[ -1, 1 ]$  می باشد؛ شد برد تابع  $y = \frac{1}{3} \sin x$ ،  $[ -\frac{1}{3}, \frac{1}{3} ]$  می باشد.

فصل اول: تابع ۷

برای رسم نمودار تابع  $y = kf(x)$ ، کافی است عرض نقاط نمودار تابع  $y = f(x)$  را در  $k$  ضرب کنیم. در شکل‌های زیر، نمودار تابع  $y = kf(x)$  برای دو حالت  $k > 1$  و  $0 < k < 1$  رسم شده است.



اگر  $k > 1$  باشد، نمودار  $y = kf(x)$  از انبساط عمودی نمودار  $y = f(x)$  حاصل می‌شود و اگر  $0 < k < 1$  باشد، نمودار  $y = kf(x)$  از انقباض عمودی نمودار  $y = f(x)$  به دست می‌آید.

اگر عرض نقاط تابع  $y = f(x)$  را قرینه کنیم، نقاط تابع  $y = -f(x)$  به دست می‌آیند. بنابراین نمودار تابع  $y = -f(x)$ ، قرینه نمودار تابع  $y = f(x)$  نسبت به محور  $x$  است.

کاردز کلاس

\* حل این کاردزکس در صفحه بعد \*



۱ اگر دامنه و برد تابع  $y = f(x)$  به ترتیب بازه‌های  $[a, b]$  و  $[c, d]$  باشند، دامنه و برد تابع  $y = kf(x)$  را برای  $k > 0$  و  $k < 0$  تعیین کنید.

۲ نمودار توابع زیر را به کمک نمودار تابع  $y = x^2$  رسم کنید.

الف)  $y = -x^2$

ب)  $y = 2x^2 - 1$

پ) نمودار روبه‌رو از قرینه‌یابی و انتقال نمودار تابع  $y = |x|$  به دست آمده است. ضابطه این تابع را مشخص کنید.

تهیه کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان



حل کار در کلاس صفحه ۷ :


حل کار در کلاس ۱ :

حالت  $k > 0$  :

دامنه تابع  $y = kf(x)$  (برای  $k > 0$ ) همان دامنه تابع  $y = f(x)$  یعنی  $[a, b]$  می باشد و برد تابع  $y = kf(x)$  (برای  $k > 0$ ) برابر  $[kc, kd]$  می باشد.  
حالت  $k < 0$  :

دامنه تابع  $y = kf(x)$  (برای  $k < 0$ ) همان دامنه تابع  $y = f(x)$  یعنی  $[a, b]$  می باشد و برد تابع  $y = kf(x)$  (برای  $k < 0$ ) برابر  $[k \cdot d, k \cdot c]$  می باشد.

حل کار در کلاس ۲ :



الف) برای رسم نمودار تابع  $y = -x^2$  کافی است نمودار  $y = x^2$  را نسبت به محور  $x$  ها قرینه کنیم.

ب) برای رسم نمودار تابع  $y = 2x^2 - 1$  ابتدا نمودار تابع  $y = x^2$  را نسبت به محوری با ضریب ۲ انبساط

خواهد داشت پس نمودار حاصل  $\perp$  واحد در راستای قائم به طرف پایین منتقل می شود.


$$y = -|x+2| - 1$$

توضیح قسمت ب) در نمودار تابع رسم شده، ابتدا نمودار تابع  $y = |x|$  دو واحد در راستای افقی به طرف چپ منتقل می شود که ضابطه آن به  $y = |x+2|$  تبدیل می شود پس نسبت به محور  $x$  ها قرینه شده است که ضابطه آن تبدیل به  $y = -|x+2|$  می شود و در آخر یک واحد در راستای قائم به طرف پایین منتقل می شود که ضابطه آن را به  $y = -|x+2| - 1$  تبدیل می کند.

و پاسخ کار در کلاس ۳ در دستگاه های مختصات موجود در سوال داد شد.

۸


نمودار تابع  $y = f(x)$  در زیر رسم شده است. با انجام مراحل زیر، نمودار تابع  $y = -f(x-1) + 2$  را رسم کنید.



**انبساط و انقباض افقی**

**فعالیت**

در دستگاه زیر، نمودار تابع  $y = \sin x$  در فاصله  $[0, 2\pi]$  رسم شده است. با تکمیل جدول زیر، نقاطی از نمودار تابع  $y = \sin 2x$  مشخص می‌شود. با کمک این جدول نمودار این تابع را در فاصله  $[0, \pi]$  رسم کنید.



$x$	$0$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\pi$
$y = \sin 2x$	$0$	$1$	$0$	$-1$	$0$

$y = \sin 2x$  : منبسط تابع  
 $y = \sin x$  : طویل تابع

با مقایسه نمودارهای توابع  $y = \sin 2x$  و  $y = \sin x$ ، چه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟

نمودار تابع  $y = \sin 2x$  نسبت به نمودار تابع  $y = \sin x$  انقباض افقی با نسبت انقباض ۲ دارد.

دوره تناوب  $y = \sin 2x$  ،  $T = \pi$  و دوره تناوب  $y = \sin x$  ،  $T = 2\pi$  می‌باشد و دوره تناوب تابع  $y = \sin 2x$  ،  $T = \pi$  می‌باشد.



فصل اول: تابع ۹


در حالت کلی اگر  $(x, y)$  یک نقطه دلخواه از نمودار تابع  $y = f(x)$  باشد و تابع  $g$  به صورت  $g(x) = f(kx)$  تعریف شده باشد،

$$g\left(\frac{x}{k}\right) = f\left(k \frac{x}{k}\right) = f(x) = y. \quad \text{آنگاه:}$$

بنابراین نقطه  $\left(\frac{x}{k}, y\right)$  یک نقطه از نمودار تابع و منظر با نقطه  $(x, y)$  از نمودار تابع  $f$  است.

برای رسم نمودار تابع  $y = f(kx)$ ، کافی است طول نقاط نمودار تابع  $y = f(x)$  را در  $\frac{1}{k}$  ضرب کنیم.

در شکل های زیر، نمودار تابع  $y = f(kx)$  برای دو حالت  $k > 1$  و  $0 < k < 1$  رسم شده است.



اگر  $k > 1$  باشد، نمودار  $y = f(kx)$  از انقباض افقی نمودار  $y = f(x)$  در راستای محور  $x$  به دست می آید و اگر  $0 < k < 1$  باشد، این نمودار از انبساط افقی نمودار  $y = f(x)$  حاصل می شود.

اگر طول نقاط تابع  $y = f(x)$  را قرینه کنیم، نقاط تابع  $y = f(-x)$  به دست می آیند. بنابراین نمودار تابع  $y = f(-x)$  قرینه نمودار تابع  $y = f(x)$  نسبت به محور  $y$  است.

**تهیه کننده:**

**گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان**


حل ۱:  $y = f(kx)$  دامنه تابع (برای  $k > 0$ ) برابر  $[\frac{1}{k}a, \frac{1}{k}b]$  می باشد دربر تابع  $y = f(kx)$

(برای  $k < 0$ ) همان برد تابع  $y = f(x)$  یعنی  $[c, d]$  می باشد.


۱۰:  $y = f(kx)$  دامنه تابع (برای  $k < 0$ ) برابر  $[\frac{1}{k}b, \frac{1}{k}a]$  می باشد.

کاردکلاس و برد تابع  $y = f(kx)$  (برای  $k < 0$ ) همان برد تابع  $y = f(x)$  یعنی  $[c, d]$  می باشد.

۱ اگر دامنه و برد تابع  $y = f(x)$  به ترتیب بازه های  $[a, b]$  و  $[c, d]$  باشند، دامنه و برد تابع  $y = f(kx)$  را برای  $k > 0$  و  $k < 0$  تعیین کنید. حل این کاردکلاس در بالای صفحه





۱ اگر نمودار تابع  $y = f(x)$  به صورت مقابل باشد، نمودار توابع  $y = f(2x)$  و  $y = f(-\frac{x}{2})$  را رسم کنید.



۲ نمودار توابع زیر را به کمک نمودار تابع  $y = \cos x$  رسم کنید.


الف)  $y = \cos 2x - 1$

ب)  $y = 2 \cos(\frac{x}{2})$



مثال: اگر نمودار تابع  $f$  به صورت زیر باشد، نمودار تابع

$g(x) = f(2x + 1)$  را به کمک آن رسم می کنیم




اگر  $A = (x, y)$  یک نقطه از نمودار تابع  $f$  باشد، آنگاه

نقطه متناظر آن روی نمودار تابع  $g = f(2x + 1)$

است، زیرا:

$$g\left(\frac{x-1}{2}\right) = f\left(2\left(\frac{x-1}{2}\right) + 1\right) = f(x - 1 + 1) = f(x) = y.$$

بنابراین نقاط مشخص شده در نمودار  $f$  را یک واحد به سمت چپ منتقل کرده و سپس طول آنها را بر ۲ تقسیم می کنیم تا نقاط متناظر از  $g$  به دست آیند.



با توجه به اینکه  $\frac{x-1}{2} = \frac{x}{2} - \frac{1}{2}$ ، آیا می توانید روشی دیگر برای رسم نمودار تابع  $g$  پیشنهاد کنید؟

آیا می توان برای رسم نمودار تابع  $g$ ، ابتدا نمودار تابع

$y = f(2x)$  را رسم کرد و سپس آن را یک واحد به چپ منتقل

کرد تا  $g(x) = f(2x + 1)$  رسم شود؟ چرا؟

۱- برای یافتن طول نقطه  $A'$ ، از معکوس تابع  $y = 2x + 1$  استفاده می کنیم.

راه حل کاردکلاس ۲

$y = f(-\frac{x}{2})$



هر یک از توابع زیر، تبدیل یافته تابع  $y = \sqrt{x}$  هستند. هر یک از آنها را به نمودارش نظیر کنید.

الف)  $y = \sqrt{2+x} \rightarrow a$

ب)  $y = 2 + \sqrt{x} \rightarrow d$

پ)  $y = -2\sqrt{x} \rightarrow e$


ت)  $y = \sqrt{\frac{x}{2}} \rightarrow c$

ث)  $y = 2 + \sqrt{x-2} \rightarrow b$


ج)  $y = \sqrt{-2x} \rightarrow f$

نهیة کننده:


گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان




(a)




(b)




(c)



(d)



(e)



(f)

■ نمودار تابع  $f$  در شکل زیر رسم شده است. نمودار هر یک از توابع زیر را رسم کنید.


الف)  $y = f(-x)$

ب)  $y = 2f(x-1)$

پ)  $y = -f(x) + 2$

ت)  $y = f(2x-1)$

ث)  $y = f(3-x)$




■ نمودار تابع  $f$  در شکل زیر رسم شده است. نمودار توابع زیر را رسم کنید و آنها را با نمودار  $f$  مقایسه کنید.


الف)  $y = f(-x)$

ب)  $y = -f(x)$

پ)  $y = -f(-x)$



■ نمودار تابع مقابل فقط از قرینه‌یابی و انتقال نمودار تابع  $y = \sqrt{x}$  به دست آمده است. ضابطه این تابع را بنویسید.



نمودار تابع  $y = \sqrt{x}$  هم نسبت به محور  $x$  ها

و هم نسبت به محور  $y$  ها قرینه شده است

و ۲ واحد در راستای قائم به بالا منتقل شده




است بنابراین ضابطه این تابع به صورت زیر می باشد:

$$y = -\sqrt{-x} + 2$$




حل تمرین صفحه ۱۲

حل تمرین ۲:






رسم: یک واحد در راستای افقی به سمت راست و دو واحد در راستای عمودی با ضرب استیلا



رسم: ۳ واحد در راستای محور افقی به سمت راست و سه واحد در راستای عمودی به بالا

حل تمرین ۳:



رسم: هم نسبت به محور x ها و هم نسبت به محور y ها قرینه می کنیم

تهیه کننده:


گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان

## تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش پذیری و تقسیم


فرض کنید  $n$  یک عدد صحیح نامنفی و  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$  اعداد حقیقی باشند که  $a_n \neq 0$ . تابع  $f(x)$  که به صورت زیر تعریف می‌شود، تابع چند جمله‌ای از درجه  $n$  نامیده می‌شود.<sup>۱</sup>

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$


تابع ثابت  $f(x) = c$ ، یک تابع چند جمله‌ای از درجه صفر و تابع خطی  $f(x) = mx + b$  که  $m \neq 0$ ، یک تابع چند جمله‌ای از درجه یک است. به همین ترتیب یک سهمی به معادله  $f(x) = ax^2 + bx + c$  یک تابع چند جمله‌ای از درجه دو است.



تابع درجه صفر



تابع درجه یک



تابع درجه دو

## کاردکلاس

در زیر چند تابع چند جمله‌ای نوشته شده‌اند. درجه هر کدام را مشخص کنید.

$f(x) = 2x - 3$  (درجه ۱) ،  $h(x) = x^2 + x - 4$  (درجه ۲) ،  $n(x) = 2x - x^2$  (درجه ۲)

$g(x) = (x-1)^2 + 2$  (درجه ۲) ،  $m(x) = 5$  (درجه صفر) ،  $p(x) = x^2(1-x)^2$  (درجه ۵)


۱- برای  $f(x) = 0$ ، درجه تعریف نمی‌شود.

## تهیه کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان



فعالیت



$x$	$y = x^3$
-2	$(-2)^3 = -8$
-1	$(-1)^3 = -1$
$-\frac{1}{2}$	$(-\frac{1}{2})^3 = -\frac{1}{8}$
0	0
$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$
1	$1^3 = 1$
2	$2^3 = 8$

یکی از توابع چند جمله‌ای درجه سه، تابع  $f(x) = x^3$  است.  
 ۱ با تکمیل جدول مقابل، نمودار تابع  $f(x) = x^3$  را رسم کنید.

۲ به کمک نمودار رسم شده برای تابع  $f(x) = x^3$ ، نشان دهید که این تابع وارون پذیر است. این تابع یک تابع یک به یک است چون هر خط موازی محور  $x$  ها فقط در آن را در یک نقطه قطع می کند پس وارون پذیر است. نمودار تابع  $f^{-1}$  را رسم کنید و ضابطه  $f^{-1}$  را تعیین کنید.

$y = x^3 \Rightarrow x = \sqrt[3]{y} \Rightarrow y = \sqrt[3]{x}$   
 $\Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$

کاردرکلاس

۱ نمودار هر یک از توابع زیر را به کمک نمودار تابع  $y = x^3$  رسم کنید.

الف)  $y = (x+1)^2$


ب)  $y = -x^2 + 1$

ب)  $y = x^2 - 3x^2 + 3x$

۲ نمودار هر یک از توابع  $y = x^2$  و  $y = x^3$  در فاصله  $[0, 2]$  رسم شده است.

در فاصله  $[0, 1]$ ، نمودار کدام تابع پایین تر و نمودار کدام تابع بالاتر است؟ در فاصله  $[1, 2]$  چگونه؟

در فاصله  $[0, 2]$  نمودار تابع  $y = x^3$  با  $y = x^2$  در  $x=1$  قرار دارد.



تهیه کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان

حل کار در کلاس صفحه ۱۱۱ :

حل ۱ :


الف)  $y = (x+1)^3$

رسم : یک واحد در راستای  
افقی به چپ منتقل می کنیم



ب)  $y = -x^3 + 1$

رسم : هر چند نسبت به محور افقی  
سه یک واحد در راستای  
عمودی به سمت بالا منتقل می کنیم




ج)  $y = x^3 - 3x^2 + 3x$

ابتدا تابع همت بیاریم صورت  $y = (x+a)^3 + b$  می نویسیم :

$$y = x^3 - 3x^2 + 3x = \underbrace{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}_{\text{انتخاب متغیر تکامل درجه دوم}} + 1 = (x-1)^3 + 1$$

امکان برای رسم : یک واحد در راستای افقی به راست و یک واحد در راستای قائم به  
سمت بالا منتقل می کنیم.



تهیه کننده :


گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه ، استان خوزستان



### توابع صعودی و توابع نزولی

#### تعالیت

تنفس هوای پاک در شهرهای صنعتی یکی از آرزوهای ساکنین این شهرهاست. براساس شاخص کیفیت هوا (AQI)، کیفیت هوای یک منطقه، یکی از وضعیت‌های پاک، سالم، ناسالم برای گروه‌های حساس، ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک می‌باشد. نمودار زیر، میانگین شاخص کیفیت هوا در ۱۵ روز پایانی دی ماه سال ۱۳۹۵ در شهر تهران را نشان می‌دهد.




د [۲۸, ۲۹]

الف) شاخص کیفیت هوا در چه فاصله‌های زمانی روبه افزایش بوده است؟ در فاصله‌های زمانی [۱۶, ۲۰]، [۲۱, ۲۳] و [۲۸, ۲۹]

ب) شاخص کیفیت هوا در چه فاصله‌های زمانی روبه کاهش بوده است؟ در فاصله‌های زمانی [۲۰, ۲۱] و [۲۳, ۲۵]

پ) این شاخص در چه فاصله زمانی ثابت بوده است؟ در فاصله زمانی [۲۷, ۲۸]



دامنه تابع  $f$  که در شکل مقابل دیده می‌شود، بازه  $[۱, ۸]$  است. در بازه  $[۱, ۳]$ ، هم‌زمان با افزایش  $x$ ، نمودار تابع روبه بالا می‌رود. به همین خاطر به تابع  $f$  در بازه  $[۱, ۳]$  صعودی می‌گوییم. در بازه  $[۳, ۴]$  مقدار تابع ثابت است.

در ادامه و در بازه  $[۴, ۸]$ ، هم‌زمان با افزایش  $x$ ، نمودار تابع روبه پایین می‌رود و به همین منظور به تابع  $f$  در بازه  $[۴, ۸]$  نزولی گفته می‌شود.


#### نهیة کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان


## توابع صعودی و توابع نزولی

اگر برای هر دو نقطه  $a$  و  $b$  از دامنه تابع  $f$  که  $a < b$ ، داشته باشیم  $f(a) \leq f(b)$ ، آنگاه  $f$  را تابعی صعودی می‌نامیم. از آنجائی که معمولاً رفتار تابع را در بازه‌هایی از اعداد حقیقی بررسی می‌کنیم، بنابراین می‌توان گفت:

تابع  $f$  را در یک بازه، صعودی می‌گوییم، اگر برای هر دو مقدار  $a$  و  $b$  در این بازه که  $a < b$ ، آنگاه  $f(a) \leq f(b)$ . در فاصله‌ای که یک تابع صعودی است، با حرکت روی نمودار (از چپ به راست)، روبه پایین نخواهیم رفت. نمودارهای زیر همگی مربوط به توابع صعودی‌اند.



تابع  $f$  را در یک بازه، نزولی می‌گوییم، اگر برای هر دو مقدار  $a$  و  $b$  در این بازه که  $a < b$ ، آنگاه  $f(a) \geq f(b)$ . در فاصله‌ای که یک تابع نزولی است، با حرکت روی نمودار (از چپ به راست)، روبه بالا نخواهیم رفت. نمودارهای زیر همگی مربوط به توابع نزولی‌اند.




به تابعی که در یک بازه فقط صعودی یا فقط نزولی باشد، یکنوا می‌گوییم.


❖ تابع  $f$  را در یک بازه، ثابت می‌گوییم، اگر برای تمام مقادیر  $x$  در این بازه، مقدار  $f(x)$  ثابت باشد. با توجه به تعاریف بالا، تابع ثابت در یک بازه، هم صعودی و هم نزولی محسوب می‌شود.

تهیه کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان



الف) تابع اکیداً صعودی




ب) تابع اکیداً نزولی

### توابع اکیداً صعودی و توابع اکیداً نزولی

❖ تابع  $f$  را در یک بازه، اکیداً صعودی می‌گوییم، اگر برای هر دو مقدار  $a$  و  $b$  در این بازه که  $a < b$ ، آنگاه  $f(a) < f(b)$  در فاصله‌ای که یک تابع اکیداً صعودی است، با حرکت روی نمودار (از چپ به راست)، همواره روبه بالا خواهیم رفت. (شکل الف)

❖ تابع  $f$  را در یک بازه، اکیداً نزولی می‌گوییم، اگر برای هر دو مقدار  $a$  و  $b$  در این بازه که  $a < b$ ، آنگاه  $f(a) > f(b)$  در فاصله‌ای که یک تابع اکیداً نزولی است، با حرکت روی نمودار (از چپ به راست)، همواره روبه پایین خواهیم رفت. (شکل ب)





به تابعی که در یک بازه فقط اکیداً صعودی یا فقط اکیداً نزولی باشد، اکیداً یکتوا می‌گوییم.  
❖ مثال: نمودار تابع  $f$  در شکل مقابل رسم شده است. در فاصله  $(-\infty, -1]$  تابع  $f$  ثابت است. همچنین در فاصله  $[-1, 0]$  تابع اکیداً نزولی و در فاصله  $[0, +\infty)$  تابع اکیداً صعودی است.

### کارد کلاس


۱ نمودار توابع زیر را رسم کنید.  
الف) تابع  $f$  در بازه  $[-1, +\infty)$  اکیداً نزولی و در بازه  $[+1, +\infty)$  اکیداً صعودی است.  
تابع  $g$  در بازه  $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$  اکیداً نزولی است.  
 $f(x) = x^2 + 2x$  ,  $g(x) = 2^{-x}$  ,  $h(x) = |x+2|$

الف) در چه بازه‌هایی این توابع، اکیداً صعودی و در چه بازه‌هایی اکیداً نزولی هستند؟  
تابع  $h$  در بازه  $[-2, +\infty)$  اکیداً نزولی و در بازه  $(-\infty, +2]$  اکیداً صعودی می‌باشد.

ب) کدام یک از آنها در تمام دامنه خود، اکیداً یکتوا است؟



نمودار تابع  $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq -1 \\ 2 & x < -1 \end{cases}$  را رسم کنید. در چه فاصله‌هایی این تابع صعودی و در چه فاصله‌هایی نزولی است؟



تابع  $f$  در بازه‌های  $(-\infty, -1)$  و  $(-1, +\infty)$  صعودی و در بازه  $(-\infty, -1)$  نزولی است.

جواب ۳: الف) بله، چون اگر تابع  $f$  در یک فاصله صعودی باشد آنگاه برای هر  $a, b$  در آن فاصله که  $a < b$  آنگاه  $f(a) < f(b)$  است. واضح است که  $f(a) < f(b)$  می‌تواند برعکس نیز باشد. بنابراین تابع  $f$  صعودی است. الف) اگر تابع  $f$  در یک فاصله اکیداً صعودی باشد، آیا اکیداً صعودی نیز هست؟ چرا؟

ب) اگر تابع  $f$  در یک فاصله صعودی باشد، آیا اکیداً صعودی نیز خواهد بود؟ مثال بزنید. **خیر:** طبق نمودار تابع  $f$  یک تابع صعودی در بازه  $(-\infty, 1)$  داشته‌ایم؛ شدنی اکیداً صعودی نیست.



مثال نقض:  $f(x) = \begin{cases} 3x-2, & x \geq 1 \\ 1, & x < 1 \end{cases}$

الف) فرض کنید تابع  $f$  در یک فاصله اکیداً صعودی باشد و  $a$  و  $b$  متعلق به این فاصله باشند. اگر  $f(a) \leq f(b)$  نشان دهید که  $a \leq b$ .

ب) اگر  $\log(x+1) \leq \log(2x-3)$ ، حدود  $x$  را به دست آورید. **حل: قسمت ب) یا این صفحه**

الف) اثبات (برهان خلف): فرض  $a < b$  بنا بر این  $b < a$  و چون  $f$  در این فاصله صعودی است پس طبق معنی تابع اکیداً صعودی  $f(a) < f(b)$  و تقسیم و بخش پذیری

که این خلاف فرض ضرورت سوال یعنی  $f(a) < f(b)$  می‌باشد بنا بر این فرض برهان خلف باطل است و  $a \leq b$

**فعالیت**

با تقسیم چند جمله‌ای‌ها بر یکدیگر آشنا هستید. توابع چند جمله‌ای  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$  و  $p(x) = x^2 - 2$  را در نظر می‌گیریم. الف) اگر  $q(x)$  و  $r(x)$  به ترتیب خارج قسمت و باقیمانده تقسیم  $f(x)$  بر  $p(x)$  باشند. نشان دهید که  $q(x) = x - 3$  و  $r(x) = 2x - 5$  است. ب) درستی تساوی  $f(x) = p(x)q(x) + r(x)$  را بررسی کنید.

$$\begin{array}{r} x^3 - 3x^2 + 1 \\ \underline{-(x^2 - 2x)} \phantom{+ 1} \\ -2x^2 + 2x + 1 \\ \underline{-(2x^2 - 4x)} \phantom{+ 1} \\ 6x + 1 \\ \underline{-(6x - 12)} \\ 13 \end{array}$$

**تفسیر تقسیم برای چند جمله‌ای‌ها**

اگر  $f(x)$  و  $p(x)$  توابع چند جمله‌ای باشند و درجه  $p(x)$  از صفر بزرگ‌تر باشد، آنگاه توابع چند جمله‌ای منحصر بفرد  $q(x)$  و  $r(x)$  وجود دارند به طوری که: **حل قسمت ب) فعالیت؛ از طرف راست به طرف چپ می‌ریس!**

$$p(x) \cdot q(x) + r(x) = (x^2 - 2)(x - 3) + 2x - 5 = x^3 - 3x^2 + 1 = f(x)$$

که در آن  $r(x) = 0$  یا درجه  $r(x)$  از درجه  $p(x)$  کمتر است.

اگر  $r(x) = 0$  باشد، چند جمله‌ای  $f$  بر چند جمله‌ای  $p$  بخش پذیر است.



**حل قسمت ب) کاربرد کلاس بالا:** می‌دانیم تابع  $f$  با  $p$  به  $q$  و  $r$  تقسیم می‌شود. صعودی می‌باشد بنا بر این به کمک قسمت الف می‌توان نوشت:

مخرج برد  $\rightarrow x \geq -4 \Rightarrow -x \leq 4 \Rightarrow x + 1 \leq 2x - 3$  و **قسمت الف**  $\log(x+1) \leq \log(2x-3)$

کاردرکلاس

اگر  $f(x) = x^2 - 16$  و  $p(x) = x + 2$ ، نشان دهید که  $f(x)$  بر  $p(x)$  بخش پذیر است.

$$f(x) = x^2 - 16 = (x^2 + 4)(x^2 - 4) = \underbrace{(x^2 + 4)}_{q(x)} \underbrace{(x - 2)(x + 2)}_{p(x)} + 0$$

چون  $r(x) = 0$  بنابراین  $x^2 - 16$  بر  $x + 2$  بخش پذیر است.

فعالیت

در تقسیم  $f(x) = x^2 + 2$  بر  $p(x) = 2x - 1$  و  $q(x)$  به ترتیب خارج قسمت و باقی مانده اند.

الف) نشان دهید که  $r(x)$  از درجه صفر است. *می دانیم در تقسیم چندجمله ای  $f(x)$  بر چندجمله ای  $p(x)$  درجه باقی مانده بیشتر از درجه مقوم نمی باشد.  $r(x)$  از درجه صفر است و چون درجه  $p(x)$  یک باشد پس درجه  $r(x)$  صفر است.*

$$f(x) = (2x - 1)q(x) + r(x)$$

اکنون ریشه چند جمله ای  $p(x) = 2x - 1$  را به دست آورید و با قرار دادن در رابطه بالا نشان دهید که  $r(x) = f(\frac{1}{2})$  به طور کلی می توان گفت:

$$p(x) = 0 \Rightarrow 2x - 1 = 0 \Rightarrow 2x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = (2\left(\frac{1}{2}\right) - 1) \cdot q\left(\frac{1}{2}\right) + r\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \cdot q\left(\frac{1}{2}\right) + r\left(\frac{1}{2}\right) = r\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\Rightarrow r(x) = f\left(\frac{1}{2}\right)$$

**نصیه:** باقی مانده تقسیم چند جمله ای  $f(x)$  بر  $ax + b$  عبارت است از  $f\left(\frac{-b}{a}\right)$ .

کاردرکلاس

۱ باقی مانده تقسیم چند جمله ای  $x^2 + x - 2$  را بر  $2x + 1$  به دست آورید.

$$r(x) = f\left(\frac{-b}{a}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right) - 2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} - 2 = -\frac{7}{4}$$

۲ اگر چند جمله ای  $x^2 + ax - 2$  بر  $x - a$  بخش پذیر باشد، مقدار  $a$  را تعیین کنید.

$$f(x) = x^2 + ax - 2$$

$x - a$  بخش پذیر است بنابراین:

$$f(x) = 0 \Rightarrow f(a) = 0 \Rightarrow a^2 + a(a) - 2 = 0 \Rightarrow 2a^2 - 2 = 0$$

$$2a^2 = 2 \Rightarrow a^2 = 1 \Rightarrow a = \pm 1$$

تهیه کننده:

$$\begin{array}{r} x^k - a^k \mid x - a \\ -x^k + ax^{k-1} \\ \hline ax^k - a^k \\ -ax^k + a^2x^{k-1} \\ \hline a^2x^k - a^k \\ -a^2x^k + a^3x^{k-1} \\ \hline \vdots \\ a^{k-1}x^k - a^k \\ -a^{k-1}x^k + a^k \\ \hline a^kx - a^k \\ -a^kx + a^k \\ \hline 0 \end{array}$$

حل سوال ۱ فعالیت:

از تقسیم انجام شد. نتیجه میگیریم  $x^k - a^k = (x-a)(x^{k-1} + ax^{k-2} + a^2x^{k-3} + \dots + a^{k-2}x + a^{k-1})$

**فعالیت**

با اتحادهای زیر از سال های قبل آشنا هستید.

$x^2 - a^2 = (x-a)(x+a)$  و  $x^3 - a^3 = (x-a)(x^2 + ax + a^2)$

۱ از تقسیم  $x^n - a^n$  بر  $x-a$  نشان دهید که:

$x^n - a^n = (x-a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + a^2x^{n-3} + \dots + a^{n-2}x + a^{n-1})$

۱ آیا  $x^n - a^n$  بر  $x-a$  بخش پذیر است؟ بده چون: اگر  $f(x) = x^n - a^n$  باشد داریم:  $r(x) = f(a)$

برابرین:  $r(x) = a^n - a^n = 0$

۲ از تقسیم  $x^n - a^n$  بر  $x-a$  نشان دهید که  $x^n - a^n$  به صورت زیر تجزیه می شود.

جواب فعالیت ۱

$$\begin{array}{r} x^n - a^n \mid x - a \\ -x^n + ax^{n-1} \\ \hline ax^n - a^n \\ -ax^n + a^2x^{n-1} \\ \hline a^2x^n - a^n \\ -a^2x^n + a^3x^{n-1} \\ \hline \vdots \\ a^{n-1}x^n - a^n \\ -a^{n-1}x^n + a^n \\ \hline 0 \end{array}$$

$x^n - a^n = (x-a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + a^2x^{n-3} + \dots + a^{n-2}x + a^{n-1})$

۳ چند جمله ای های  $x^0 - 1$  و  $x^6 - 64$  را به کمک اتحاد بالا تجزیه کنید.

$$\begin{array}{r} ax^{n-1} - a^n \\ -ax^{n-1} + a^2x^{n-2} \\ \hline a^2x^{n-1} - a^n \\ -a^2x^{n-1} + a^3x^{n-2} \\ \hline \vdots \\ a^{n-1}x - a^n \\ -a^{n-1}x + a^n \\ \hline 0 \end{array}$$

از تقسیم  $x^n - a^n = (x-a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + a^2x^{n-3} + \dots + a^{n-2}x + a^{n-1})$

جواب فعالیت ۴

$x^0 - 1 = (x-1)(x^0 + x^0 + \dots + x^0 + 1)$   
 $x^4 - 16 = x^4 - 2^4 = (x-2)(x^3 + 2x^2 + 4x + 8)$   
 $= (x-2)(x^3 + 2x^2 + 4x + 8)$

۱ در اتحاد بالا، اگر  $n$  فرد باشد، با تغییر  $a$  به  $-a$  اتحاد زیر را نتیجه بگیرید.

$x^n + a^n = (x+a)(x^{n-1} - ax^{n-2} + a^2x^{n-3} - \dots - a^{n-2}x + a^{n-1})$

اگر  $n$  فرد باشد در فعالیت بالا تبدیل  $a$  به  $-a$  داریم:

$x^n - (-a)^n = (x - (-a))(x^{n-1} + (-a)x^{n-2} + (-a)^2x^{n-3} + \dots + (-a)^{n-2}x + a^{n-1})$

۲ در فعالیت بالا، اگر  $n$  زوج باشد، با تغییر  $a$  به  $-a$  اتحاد زیر را نتیجه بگیرید.

$x^n - a^n = (x-a)(x^{n-1} - ax^{n-2} + a^2x^{n-3} - \dots + a^{n-2}x + a^{n-1})$

به کمک این اتحاد، چند جمله ای  $x^4 - 16$  را طوری تجزیه کنید که  $x+2$  یک عامل آن باشد.


در فعالیت بالا اگر  $n$  زوج باشد تبدیل  $a$  به  $-a$  داریم:

$x^n - (-a)^n = (x - (-a))(x^{n-1} + (-a)x^{n-2} + (-a)^2x^{n-3} + \dots + (-a)^{n-2}x + a^{n-1})$

$x^n - a^n = (x+a)(x^{n-1} - ax^{n-2} + a^2x^{n-3} - \dots + a^{n-2}x + a^{n-1})$

برابرین:  $x^4 - 16 = x^4 - 2^4 = (x+2)(x^3 - 2x^2 + 4x - 8)$





(الف) حل تمرین ۱

فصل اول: تابع ۲۱



تمرین

۱ تابع  $f(x) = (x-2)^3 + 1$  را در نظر بگیرید.

(الف) نمودار تابع  $f$  را به کمک نمودار تابع  $y = x^3$  رسم کنید. بالا

(ب) نشان دهید که  $f$  وارون پذیر است و نمودار  $f^{-1}$  را رسم کنید. تابع




(پ) ضابطه  $f^{-1}$  را به دست آورید.

چون هر خط موازی محور  $x$  ها، آن را در بیش از یک نقطه قطع نکند.

نمودار توابع  $f$ ،  $g$  و  $h$  در زیر رسم شده اند.

$$y = (x-2)^3 + 1 \Rightarrow (x-2)^3 = y-1 \Rightarrow x-2 = \sqrt[3]{y-1} \Rightarrow x = \sqrt[3]{y-1} + 2$$

$$\Rightarrow y = \sqrt[3]{x-1} + 2 \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1} + 2$$



(الف) تابع  $f$  در چه فاصله‌هایی اکیداً صعودی و در چه فاصله‌هایی صعودی است؟ تابع  $g$  در بازه‌های  $(-\infty, -3)$  و  $(3, +\infty)$  اکیداً صعودی و در بازه  $(-3, +\infty)$  صعودی است.

(ب) تابع  $g$  در چه فاصله‌هایی اکیداً نزولی و در چه فاصله‌هایی نزولی است؟ تابع  $h$  در چه فاصله‌هایی اکیداً نزولی است؟



تابع  $h$  در بازه‌های  $(-\infty, 0)$  و  $(0, +\infty)$  اکیداً نزولی است.

۲ نمودار هر یک از توابع زیر را رسم کنید. کدام یک از آنها در تمام دامنه خود، اکیداً یکنواست؟

(الف)  $f(x) = \sqrt{2-x}$

(ب)  $g(x) = 4^{-x}$

(ج)  $h(x) = \log_2 x$



تابع  $f$  در دامنه خود اکیداً نزولی است بنابراین تابع  $f$  در دامنه خود اکیداً یکنواست.

تابع  $g$  در دامنه خود اکیداً نزولی است بنابراین تابع  $g$  در دامنه خود اکیداً یکنواست.

تابع  $h$  در دامنه خود اکیداً صعودی است بنابراین تابع  $h$  در دامنه خود اکیداً یکنواست.

تهیه کننده:

حل قسمت دوم سوال 5: خیر؛ اگر  $f$  و  $g$  روی یک فاصله اکیداً صعودی باشند؛ ادامه حل 5:

نمی توان گفت همواره  $f-g$  نیز اکیداً روی آن فاصله صعودی است.  
 مثال نشان: توابع  $f(x) = 2x+4$  و  $g(x) = 5x+4$  روی دامنه خود اکیداً صعودی هستند ولی:

$$(f-g)(x) = 2x+4 - (5x+4) = -3x$$

که یک تابع اکیداً نزولی است!



22

آیا تابعی وجود دارد که در یک فاصله، هم صعودی و هم نزولی باشد؟ بله - مثال تابع  $f(x) = 2$  در فاصله  $[-2, 2]$



هم صعودی است و هم نزولی

حل قسمت دوم: اگر توابع  $f$  و  $g$  در یک فاصله اکیداً صعودی باشند، نشان دهید که تابع  $f+g$  نیز در این فاصله اکیداً صعودی است. برای

مثال: تابع  $f-g$  را چه می توان گفت؟ حل قسمت اول سوال:

$$\forall a, b \in I, a < b \Rightarrow f(a) < f(b) \quad \text{چون} \quad f(a) + g(a) < f(b) + g(b)$$

$$\forall a, b \in I, a < b \Rightarrow f(a) < g(b)$$

بنابراین  $f+g$  نیز اکیداً صعودی است (از سه روی فاصله  $I$ )  
 اگر باقی مانده تقسیم چند جمله ای  $x^2 + kx + 2$  بر  $x-2$  برابر با 6 باشد،  $k$  را تعیین کنید.

$$r(x) = 4 \Rightarrow r(x) = f(2) = 4 \Rightarrow 2^2 + k(2) + 2 = 4 \Rightarrow 4k = 4 - 10 = -6$$

$$\Rightarrow k = \frac{-6}{2} \Rightarrow k = -3$$

مقادیر  $a$  و  $b$  را طوری تعیین کنید که چند جمله ای  $x^3 + ax^2 + bx + 1$  بر  $x-1$  و  $x+1$  بخش پذیر باشد.

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$$

$$r(x) = f(1) = 0 \Rightarrow 1^3 + a(1)^2 + b(1) + 1 = 0 \Rightarrow 4a + 2b = -9$$

$$r(x) = f(-1) = 0 \Rightarrow (-1)^3 + a(-1)^2 + b(-1) + 1 = 0 \Rightarrow a - b = 0 \Rightarrow a = b$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4a + 2b = -9 \\ a - b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4a + 2a = -9 \\ 4a + 2a = -9 \\ 6a = -9 \\ a = -\frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -\frac{3}{2} \\ a = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

هر یک از چند جمله ای های زیر را بر حسب عامل های خواسته شده تجزیه کنید.

الف)  $x^4 - 1 = x^4 - 1^2 = (x-1)(x^3 + 1x^2 + 1x + 1)$   $x-1$  با عامل  $x^3 - 1$

ب)  $x^4 - 1 = (x-1)(x^3 + x^2 + x + 1)$   $x+1$  با عامل  $x^3 - 1$

ب)  $x^4 - 1 = x^4 - 1^2 = (x+1)(x^3 - 1x^2 + 1x - 1)$   $x+2$  با عامل  $x^3 + 2x^2$

ب)  $x^4 - 1 = (x+1)(x^3 - x^2 + x - 1)$   $x+2$  با عامل  $x^3 + 2x^2$

الف) فرض کنید تابع  $f$  در یک بازه اکیداً نزولی باشد و  $a$  و  $b$  متعلق به این بازه باشند. اگر  $f(a) \leq f(b)$  نشان دهید که  $a \geq b$ .

ب) اگر  $\frac{1}{p} \leq (\frac{1}{p})^{3-2}$ ، حدود  $x$  را به دست آورید. حل قسمت الف سوال 9: اثبات (برهان خلف): فرض

$a < b$  بنا بر این  $a < b$  باشد از فرضی چون  $f$  روی فاصله مدون اکیداً نزولی است بنابراین

برای هر  $a$  و  $b$  عضو این فاصله  $a < b$  نتیجه می شود  $f(a) > f(b)$  و این خلاف

فرض  $f(a) \leq f(b)$  موجود در صورت سوال می باشد. از این تناقض نتیجه می شود

فرض برهان خلف باطل است و  $a \geq b$  می باشد.

حل قسمت ب سوال 9: می داریم در تابع  $f(x) = a^x$ ، اگر  $a < 1$ ، باشد، تابع اکیداً نزولی

است بنابراین طبق قسمت الف همین نتیجه داریم: قسمت الف  $\frac{1}{p} \leq (\frac{1}{p})^{3-2} \Rightarrow 3x - 2 \geq 2 \Rightarrow x \geq \frac{4}{3}$

تهیه کننده:

## مثلات

- ۱. تالوب و تاژانت
- ۲. معادلات مثلثاتی

## فصل




انصباب رگ‌ها در بدن انسان به گونه‌ای است که مالومیت هیدرولیکی درون رگ‌ها تا بهی مثلثاتی از زاویه بین هر دو رگ متصیل به هم است. در سیم‌سازی کلمبرونری از شبکه رگ‌ها این خاصیت مورد توجه قرار می‌گیرد.

## تناوب و تانژانت

درس

ما توابع مثلثاتی  $f(x) = \sin x$  و  $f(x) = \cos x$  در سال گذشته آشنا شدیم و دیدیم که در آنها مقادیر تابع برای هر دو نقطه به فاصله  $2\pi$  روی محور  $x$  ها یکسان است  $\sin(x \pm 2k\pi) = \sin x$  و  $\cos(x \pm 2k\pi) = \cos x$  به عبارتی اگر تکه‌ای از نمودار این توابع را در بازه‌ای به طول  $2\pi$  داشته باشیم، با تکرار این تکه می‌توان نمودار توابع فوق را به دست آورد. این مطلب را می‌توانید در شکل‌های زیر مشاهده نمایید.



با دقت به نمودار توابع فوق می‌توان مشاهده کرد که نمودار در بازه‌هایی به طول  $2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots$  تکرار می‌شود. اما کوچک‌ترین بازه‌ای که نمودار این توابع در آن تکرار شده است، همان  $2\pi$  است. چنین توابعی را توابع متناوب و  $2\pi$  را دوره تناوب آنها می‌نامیم.

تعریف:

تابع  $f$  را متناوب می‌نامیم هرگاه یک عدد حقیقی مثبت مانند  $T$  موجود باشد به طوری که برای هر  $x \in D_f$  داشته باشیم  $x \pm T \in D_f$  و  $f(x \pm T) = f(x)$ . کوچک‌ترین عدد مثبت  $T$  با این خاصیت را دوره تناوب  $f$  می‌نامیم.


فعالیت

1 می‌دانیم دوره تناوب تابع  $f(x) = \sin x$  و  $f(x) = \cos x$  برابر  $2\pi$  و مقادیر ماکزیمم و مینیمم این تابع به ترتیب  $1$  و  $-1$  است. در ادامه می‌خواهیم با بررسی نمودارهای داده شده، تأثیر ضریب  $a$  را در تابع  $f(x) = a \sin x$  بر دوره تناوب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم این تابع بررسی نماییم.

گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

فصل دوم: مثلثات ۲۵



۲ با توجه به نمودارهای فوق دوره تناوب و مقادیر ماکزیم و مینیم تابع  $y = a \sin x$  را مشخص نمایید.

اگر  $a > 0$  دوره تناوب  $2\pi$  و ماکزیم  $a$  و مینیم  $-a$

۳ با توجه به آنچه در مورد انتقال توابع می دانید مشخص نمایید دوره تناوب و مقادیر ماکزیم و مینیم تابع  $y = a \sin x + c$  چگونه است. با انجام مراحل مشابه مراحل بالا می توان نشان داد دوره تناوب و مقادیر ماکزیم و مینیم توابع  $y = a \cos x + c$  و  $y = a \cos x + c$  نیز مانند آنچه گفته شد به دست می آید.

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

$$-a \leq a \sin x \leq a$$

$$-a+c \leq a \sin x + c \leq a+c$$

$$-a+c \leq y \leq a+c$$

$\downarrow$  MIN                       $\downarrow$  MAX

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$-a \leq a \cos x \leq a$$

$$-a+c \leq a \cos x + c \leq a+c$$

$$-a+c \leq y \leq a+c$$

$\downarrow$  MIN                       $\downarrow$  MAX

با دقت در نمودار هر یک از توابع داده شده زیر، دوره تناوب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم هر یک را تشخیص دهید. در ادامه می خواهیم با بررسی نمودارهای داده شده، تأثیر ضریب  $b$  در تابع  $y = \sin bx$  را بر دوره تناوب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم این تابع بررسی کنیم.

تابع	نمودار تابع	ماکزیمم	مینیمم	دوره تناوب
$y = \sin x$		1	-1	$2\pi$
$y = \sin 2x$		1	-1	$\pi$
$y = \sin(-2x)$		1	-1	$\frac{2\pi}{2}$
$y = \sin \frac{x}{2}$		1	-1	$4\pi$
$y = \sin\left(-\frac{x}{4}\right)$		1	-1	$4\pi$



@GamBeGam-Darsi

## گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

مشکلات ۲۷

با توجه به نمودارهای فوق دوره تناوب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم تابع  $y = \sin bx$  را مشخص نمایید.

$$T = \frac{2\pi}{|b|}$$

با توجه به آنچه در مورد انتقال توابع می دانیم، مشخص نمایید دوره تناوب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم تابع  $y = \sin bx + c$  چگونه است.

$$-1 \leq \sin bx \leq 1$$

$$-1+c \leq \sin bx + c \leq 1+c$$

با انجام مراحل مشابه در محل بالا می توان نشان داد دوره تناوب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم توابع  $y = a \cos x + c$  و  $y = a \cos x$  نیز مانند آنچه گفته شد به دست می آید.

همان طور که در فعالیت های قبل دیدیم در توابع  $y = a \sin bx + c$  و  $y = a \cos bx + c$  ضرب  $a$  در دوره تناوب تابع بی تأثیر است، اما در مقدار ماکزیمم و مینیمم تابع تأثیر گذار است. برعکس، ضرب  $b$  در دوره تناوب تابع تأثیر گذار و در مقادیر ماکزیمم و مینیمم تابع بی تأثیر است. مقدار  $c$  نیز از آنجا که فقط باعث انتقال نمودار می شود، در دوره تناوب بی تأثیر است و صرفاً در مقدار ماکزیمم و مینیمم تابع تأثیر گذار است.

توابع  $y = a \sin bx + c$  و  $y = a \cos bx + c$  دارای مقدار ماکزیمم  $|a| + c$  و مقدار مینیمم  $-|a| + c$  و دوره تناوب  $\frac{2\pi}{|b|}$  است.

بنابراین با داشتن ضابطه تابعی به صورت فوق می توان مقادیر ماکزیمم و مینیمم و دوره تناوب تابع را به دست آورد و برعکس با داشتن مقادیر ماکزیمم، مینیمم و دوره تناوب یک تابع مثلثاتی، می توان ضابطه تابع مورد نظر را به دست آورد.

مثال: دوره تناوب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم هر یک از توابع زیر را مشخص نمایید.

الف)  $y = 3 \sin(2x) - 2$

ب)  $y = -\frac{1}{4} \cos(\pi x)$

ب)  $y = \pi \sin(-x) + 1$

ت)  $y = 8 \cos\left(\frac{x}{3}\right)$

حل:

الف)  $\max = |3| - 2 = 1$       $\min = -|3| - 2 = -5$       $T = \frac{2\pi}{|b|} = \frac{2\pi}{2} = \pi$


ب)  $\max = \left|-\frac{1}{4}\right| = \frac{1}{4}$       $\min = -\left|-\frac{1}{4}\right| = -\frac{1}{4}$       $T = \frac{2\pi}{|b|} = \frac{2\pi}{\pi} = 2$

ب)  $\max = |\pi| + 1 = \pi + 1$       $\min = -|\pi| + 1 = 1 - \pi$       $T = \frac{2\pi}{|-1|} = 2\pi$

ت)  $\max = |8| = 8$       $\min = -|8| = -8$       $T = \frac{2\pi}{\left|\frac{1}{3}\right|} = 6\pi$


## گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

۲۸




(الف)


مثال: هر یک از نمودارهای داده شده در زیر مربوط به تابعی با ضابطه  $f(x) = a \cos bx + c$  یا  $f(x) = a \sin bx + c$  است. یادفت در شکلی نمودار و تشخیص دوره تناوب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم تابع، ضابطه آن را مشخص نمایید.



(ب)



(پ)



(ت)

حل:

(الف) با توجه به شکل، نمودار تابع مورد نظر می‌تواند به صورت  $y = a \sin bx + c$  باشد. مقادیر ماکزیمم و مینیمم آن برابر ۳ و ۱ و طول دوره تناوب برابر  $\pi$  است. لذا  $T = \frac{2\pi}{|b|} = \pi$  و بنابراین  $|b| = 2$ .  
از طرفی چون مقادیر ماکزیمم و مینیمم به ترتیب  $|a| + c$  و  $-|a| + c$  است، بنابراین همواره مقدار  $c$  میانگین مقادیر ماکزیمم و مینیمم است، داریم  $c = 4$  و در نتیجه  $|a| = 2$ .



## گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

وم: مثلثات ۲۹

با توجه به تأثیری که منفی بودن هر کدام از  $a$  و  $b$  بر قرینه شدن نمودار تابع نسبت به محورهای  $x$  و  $y$  دارد، هر دوی  $a$  و  $b$  باید مثبت باشند لذا ضابطه تابع مورد نظر به صورت مقابل است:

$$y = 3 \sin(2x) + 4$$

ب) با توجه به نمودار، ضابطه تابع مورد نظر می‌تواند به صورت  $y = a \sin bx + c$  باشد و با توجه به مقادیر ماکزیمم و مینیمم و دوره تناوب از روی نمودار،  $c = 0$  و  $|a| = \frac{1}{4}$  و  $|b| = 2$  به دست می‌آید که در آن علامت  $a$  منفی و  $b$  مثبت است.

$$y = -\frac{1}{4} \sin 2x$$

بنابراین داریم:

ب) با توجه به شکل نمودار، ضابطه تابع مورد نظر می‌تواند به صورت  $y = a \cos bx + c$  باشد و مقادیر ماکزیمم و مینیمم آن برابر ۵ و ۱ و طول دوره تناوب برابر  $4\pi$  است. بنابراین  $c = 3$  و  $|a| = 2$  و  $|b| = \frac{1}{4}$  که در آن علامت  $a$  مثبت و علامت  $b$  منفی است. لذا  $a = 2$  و  $b = -\frac{1}{4}$  و بنابراین داریم  $y = 2 \cos(-\frac{x}{4}) + 3$ .

ت) ضابطه این نمودار نیز می‌تواند به صورت  $y = a \cos bx + c$  باشد و  $c = 0$  و  $|a| = 2$  و  $|b| = 1$  و  $a$  منفی و  $b$  مثبت است. بنابراین داریم:

$$y = -2 \cos x$$

### تابع تنازات

#### فعالیت

در دایره مثلثاتی روبه‌رو خط  $TAT'$  در نقطه  $M$  بر محور کسینوس‌ها عمود است.


الف) زاویه  $\alpha$  را در ربع اول دایره مثلثاتی در نظر می‌گیریم و پاره خط  $OM$  را امتداد می‌دهیم تا این خط را در نقطه  $M'$  قطع کند. نشان دهید:

$$\tan \alpha = AM' = b$$

می‌توان دید که تنازات هر زاویه دلخواه مانند  $\alpha$ ، به همین ترتیب از برخورد امتداد ضلع دوم آن زاویه با خط  $TAT'$  تعیین می‌شود. بنابراین خط  $TAT'$  را محور تنازات می‌نامیم. نقطه  $A$  مبدأ این محور است و جهت مثبت محور، از پایین به سمت بالا است.

ب) چرا تنازات زوایایی که انتهای کمان آنها در ربع اول و سوم قرار دارد مقداری مثبت و تنازات زوایایی که انتهای کمان آنها در ربع دوم و چهارم قرار دارد، مقداری منفی است؟

پ) آیا مقدار  $\tan \frac{\pi}{4}$  حقیقی است؟  $\tan \frac{3\pi}{4}$  چطور؟ به کمک شکل، پاسخ خود را توجیه کنید.



چون تنازات زاویه‌هایی که در ربع اول و سوم قرار دارند مثبت هستند و تنازات زاویه‌هایی که در ربع دوم و چهارم قرار دارند منفی هستند. تنازات زاویه‌هایی که در ربع اول و سوم قرار دارند مثبت هستند و تنازات زاویه‌هایی که در ربع دوم و چهارم قرار دارند منفی هستند.

چون برای  $\frac{\pi}{4}$  و  $\frac{3\pi}{4}$  خط  $OM$  عمود بر تنازات است و در ربع اول و سوم قرار دارد و در ربع دوم و چهارم قرار دارد و در ربع اول و سوم قرار دارد و در ربع دوم و چهارم قرار دارد.



# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

۳۰

## تغییرات تانژانت

### فعالیت


با تغییر زاویه  $\alpha$  مقادیر تانژانت آن نیز تغییر می کند. ابتدا این تغییرات را در ربع اول دایره مثلثاتی بررسی می کنیم. اگر  $\alpha = 0$  مقدار  $\tan \alpha$  نیز برابر صفر است و با افزایش اندازه  $\alpha$  مقدار  $\tan \alpha$  نیز افزایش می یابد.

الف) با افزایش مداوم مقادیر زاویه  $\alpha$  در ربع اول و نزدیک شدن آن به  $\frac{\pi}{2}$ ، مقادیر تانژانت تا چه حد افزایش می یابد؟ *بی نهایت (توضیح در رساله) (اعداد صحیح یا در ساقهای اعداد صحیح بی نهایت تعریف نشده است)*

ب) توضیح دهید اگر عدد حقیقی و مثبت  $a$  را داشته باشیم، چگونه می توان زاویه ای مانند  $\alpha$  یافت، به طوری که  $\tan \alpha = a$ . *ا اندازه  $\alpha$  روی محور تانژانت ها جابجایی کنیم و مرکز 0 وصل می کنیم*



$$\tan \alpha = \frac{a}{1} = a$$



### کاردر کلاس

الف) با بررسی تغییرات مقادیر تانژانت در ربع های دوم، سوم و چهارم مشخص کنید روند این تغییر در هر ربع افزایشی است یا کاهش؟

*تا  $+\infty$  افزایشی*  
 تا  $-\infty$  افزایشی  
 تا  $+\infty$  افزایشی  
 تا  $-\infty$  افزایشی

ب) بازه تغییرات مقدار تانژانت را در هر ربع بنویسید.

*در ربع اول تغییرات تانژانت از 0 تا  $+\infty$  افزایشی*  
*در ربع دوم تغییرات تانژانت از  $-\infty$  تا 0 افزایشی*  
*در ربع سوم تغییرات تانژانت از 0 تا  $+\infty$  افزایشی*  
*در ربع چهارم تغییرات تانژانت از  $-\infty$  تا 0 افزایشی*



گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان صفحات ۳۱

ربع	دوم	سوم	چهارم
زوایا			
افزایشی یا کاهشی	افزایشی	افزایشی	افزایشی
بازه تغییرات	$(-\infty, +\infty)$	$(-\infty, +\infty)$	$(-\infty, +\infty)$

ب) جدول زیر را کامل کنید. (علامت  $\uparrow$  به معنی افزایش یافتن و علامت  $\downarrow$  به معنی کاهش یافتن است.)

ربع اول		ربع دوم			ربع سوم			ربع چهارم							
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\pi$	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	$2\pi$
$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$



# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

## تابع تانژانت

همان طور که می بینیم به ازای هر زاویه دلخواه در دایره مثلثاتی (به جز  $x = k\pi + \frac{\pi}{2}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ), عددی حقیقی به عنوان  $\tan \alpha$  داریم و تابعی با ضابطه  $y = \tan \alpha$  مشخص می کند. دامنه این تابع مجموعه  $D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$  است و برد آن مجموعه اعداد حقیقی است. به سادگی می توان دید تابع  $y = \tan \alpha$ , تابعی متناوب است<sup>۱</sup> و دوره تناوب آن  $\pi$  است. زیرا:

$$\tan(\pi + x) = \tan x$$

### کاردرکلاس


صعودی یا نزولی بودن تابع  $y = \tan \alpha$  را در بازه  $[0, 2\pi]$  بررسی کنید.

در بازه  $(0, \frac{\pi}{2})$  صعودی  
 در بازه  $(\frac{\pi}{2}, \pi)$  صعودی  
 در بازه  $(\pi, \frac{3\pi}{2})$  صعودی  
 در بازه  $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$  صعودی

### رسم تابع $y = \tan \alpha$

### فعالیت

در شکل زیر نمودار تابع  $y = \tan \alpha$  در ربع اول رسم شده است. مشابه آن، نمودار این تابع را در ربع های دیگر رسم کنید.



۱- به دست آوردن دوره تناوب توابع شامل  $\tan$  مدنظر نیست.

## گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان ۳۳

توابع

دوره تناوب و مفادیر ماکزیمم و مینیمم هر یک از توابع زیر را به دست آورید.

الف)  $y = 1 + 2 \sin \sqrt{x}$

$T = \frac{2\pi}{\sqrt{x}}$

ماکزیمم: ۳

مینیمم: -۱

ب)  $y = \sqrt{3} - \cos \frac{\pi}{4} x$

$T = 4$

ماکزیمم:  $\sqrt{3} + 1$

مینیمم:  $\sqrt{3} - 1$

پ)  $y = -\pi \sin \frac{1}{\pi} (x - 2)$

$T = 2\pi$

ماکزیمم:  $\pi$

مینیمم:  $-\pi$

ت)  $y = -\frac{3}{4} \cos 3x$

$T = \frac{2\pi}{3}$

ماکزیمم:  $3 \times \frac{3}{4}$

مینیمم:  $-\frac{3}{4}$

هر یک از توابع داده شده را با نمودارهای زیر نظیر کنید.

الف)  $y = \sin \pi x$

ب)  $y = 2 - \cos \frac{1}{2} x$


پ)  $y = 1 - \cos 2x$

ت)  $y = \sin 2x$


۱)  $y = 1 - \cos 2x$




۲)  $y = 2 - \cos \frac{1}{2} x$



۳)  $y = \sin 2x$



۴)  $y = \sin \pi x$



# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

۳۴

در هر مورد ضابطه تابعی مثلثاتی با دوره تناوب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم داده شده بنویسید.

الف)  $T = \pi$  ,  $\max = 3$  ,  $\min = -3$

$y = 3 \sin 2u$

ب)  $T = 2$  ,  $\max = 4$  ,  $\min = -3$

$y = -4 \sin \frac{\pi}{2} u + 3$


ب)  $T = 4\pi$  ,  $\max = -1$  ,  $\min = -7$

$y = -3 \sin \frac{1}{4} u - 7$

ت)  $T = \frac{\pi}{2}$  ,  $\max = 1$  ,  $\min = -1$

$y = \cos 4u$

ضابطه مربوط به هر یک از نمودارهای داده شده را بنویسید.



کدام یک از جملات زیر درست و کدام یک نادرست است؟

الف) تابع تنازنت در دامنه اش صعودی است. **نادرست**

ب) می توان بازه ای یافت که تابع تنازنت در آن نزولی باشد. **نادرست**

پ) می توان بازه ای یافت که تابع تنازنت در آن غیر صعودی باشد. **درست**

ت) تابع تنازنت در هر بازه که در آن تعریف شده باشد، صعودی است. **درست**

با توجه به محورهای سینوس و تنازنت، در موارد زیر مقادیر  $\sin \alpha$  و  $\tan \alpha$  را با هم مقایسه کنید:

ب)  $0 < \alpha < 2\pi$

	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\pi$
$\sin \alpha$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$1$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$0$
$\tan \alpha$	$1$	$+$	$1$	$-1$	$0$

الف)  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$

	$0$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\pi$
$\sin \alpha$	$0$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$1$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$0$
$\tan \alpha$	$0$	$1$	$+$	$1$	$0$

$\tan \alpha$  و  $\sin \alpha$  در ربع چهارم نیز در دو محور هستند

در ربع اول  $\sin \alpha$  و  $\tan \alpha$  در دو محور هستند




معادلات مثلثاتی

معادلات مثلثاتی

معادله‌ای که در آن اطلاعاتی از نسبت‌های مثلثاتی یک زاویه مجهول داریم، یک معادله مثلثاتی نام دارد.  
 مثال: تابع مثلثاتی  $y = \sin x$  را که نمودار آن در زیر رسم شده است در نظر بگیرید.



همان‌طور که از نمودار پیداست، صفرهای این تابع جواب‌های معادله مثلثاتی  $\sin x = 0$  می‌باشند. به عبارت دیگر جواب‌های این معادله که به صورت  $\dots, -3\pi, -2\pi, -\pi, 0, \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$  می‌باشند، محل تقاطع تابع ثابت  $y = 0$  (یعنی محور  $x$ ها) و تابع  $y = \sin x$  است.  
 این جواب‌ها را می‌توان به صورت کلی  $x = k\pi$  که  $k$  یک عدد صحیح است نمایش داد.  
 به‌طور مشابه جواب‌های معادله  $\sin x = 1$  مقداری از  $x$  هستند که به ازای آنها مقدار  $\sin x$  برابر ۱ می‌شود. این مقادیر محل تقاطع  $y = \sin x$  و  $y = 1$  است که در نمودار زیر رسم شده‌اند.



جواب‌های معادله صفحه قبل به صورت


$$x = \dots, \frac{\pi}{2} - 2\pi, \frac{\pi}{2} - 4\pi, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2\pi, \dots$$

می‌باشند که به صورت کلی  $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$  قابل نمایش است.

اکنون معادله  $\sin x = \frac{1}{4}$  را در نظر می‌گیریم. فعالیت زیر به شما کمک می‌کند تا جواب‌های این معادله را بیابید.

۱ چند زاویه را که مقدار سینوس آنها برابر  $\frac{1}{4}$  است مثال بزنید.  $\frac{5\pi}{4}, \frac{\pi}{4}$

۲ خط  $y = \frac{1}{4}$  و نمودار  $y = \sin x$  را در زیر رسم کرده ایم. مقادیری را که مثال زده‌اید روی نمودار پیدا کنید. این مقادیر ستاظر با چه نقاطی از شکل زیر می‌باشند؟ آیا مقادیری که پیدا کرده‌اید در بین نقاط نمایش داده شده در زیر هستند؟ بله  $B, A$




نمای باسفیغ‌های یافت شد از آن‌ها ساده‌تر  
می‌باشد

۳ طول تعدادی از نقاط تقاطع دو نمودار  $y = \sin x$  و  $y = \frac{1}{4}$  را که در شکل فوق مشخص شده‌اند، در معادله  $\sin x = \frac{1}{4}$  جایگذاری کنید. آیا در معادله صدق می‌کنند؟ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟  
 $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{4}$   
 $\sin \frac{5\pi}{4} = \sin(\pi + \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{4}$   
 $\sin(-\frac{7\pi}{4}) = \frac{1}{4}$

۴ در دایره مثلثاتی زیر خط  $y = \frac{1}{4}$  و زوایای  $\frac{\pi}{6}$  و  $\pi - \frac{\pi}{6}$  که سینوس آنها برابر  $\frac{1}{2}$  است رسم شده‌اند. کدام دسته از زوایای مشخص شده بر روی نمودار سؤال قبل هم انتها با زاویه  $\frac{\pi}{6}$  و کدام دسته هم انتها با زاویه  $\pi - \frac{\pi}{6}$  هستند؟ آنها را در جاهای خالی زیر مرتب کنید. آیا می‌توانید دو دسته زیر را از دو طرف ادامه دهید.

هم انتها با  $\frac{\pi}{6}$ :  $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}, \frac{17\pi}{6}, \dots$

هم انتها با  $\pi - \frac{\pi}{6}$ :  $\frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}, \frac{19\pi}{6}, \dots$




© Gambi



فصل دوم: مثلثات ۳۷

برای عدد حقیقی  $-1 \leq a \leq 1$  که  $\sin x = a$ ، زاویه‌ای مانند  $\alpha$  وجود دارد که برای آن داریم  $\sin \alpha = a$ . بنابراین معادله  $\sin x = a$  به صورت  $\sin x = \sin \alpha$  بازنویسی می‌شود. اکنون برای یافتن جواب‌های معادله  $\sin x = \sin \alpha$  باید رابطه بین کمان‌های  $x$  و  $\alpha$  را بیابیم. با توجه به دایره مثلثاتی روبه‌رو رابطه بین کمان معلوم  $\alpha$  و کمان‌های مجهول  $x$  به طوری که  $\sin x = \sin \alpha$  در دوران‌های مختلف به صورت زیر است:

$$\sin x = \sin \alpha \Rightarrow x = 2k\pi + \alpha \text{ و } x = (2k+1)\pi - \alpha, k \in \mathbb{Z}$$



جواب‌های کلی معادله  $\sin x = \sin \alpha$  به صورت  $x = 2k\pi + \alpha$  و  $x = (2k+1)\pi - \alpha$  می‌باشد که  $k \in \mathbb{Z}$ .

مثال: معادله  $\sin x = -\frac{1}{2}$  را حل کنید.

$$\sin x = -\frac{1}{2}$$

$$\sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$$

$$\begin{cases} x = 2k\pi - \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z} \\ x = 2k\pi + \frac{7\pi}{6}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

کارد کلاس

الف)  $2\sin x - \sqrt{3} = 0$

ب)  $2\sin x + \sqrt{3} = 0$

$$2\sin \alpha - \sqrt{3} = 0$$

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin \alpha = \sin 60^\circ$$

$$\begin{cases} x = 2k\pi + \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \\ x = 2k\pi + \frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$2\sin \alpha + \sqrt{3} = 0$$

معادلات زیر را حل کنید.


$$\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \frac{4\pi}{3}$$

$$\sin \alpha = \sin \frac{2\pi}{3}$$

$$\begin{cases} \alpha = 2k\pi + \frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \\ \alpha = 2k\pi + \frac{4\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$


نمودار تابع  $y = \cos x$  و خط  $y = \frac{\sqrt{3}}{4}$  در زیر رسم شده‌اند. مشابه فعالیت قبل به سؤالات زیر پاسخ دهید تا جواب‌های معادله

$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{4}$  را بیابید.



الف) برخی از جواب‌های معادله  $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{4}$  را با توجه به نقاط تقاطع دو نمودار پیدا کنید.  $-\frac{13\pi}{4}, \frac{13\pi}{4}, -\frac{5\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, -\frac{11\pi}{4}, \frac{11\pi}{4}, -\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$

ب) با استفاده از دایره مثلثاتی روبه‌رو محل تقاطع خط  $x = \frac{\sqrt{3}}{4}$  با دایره مثلثاتی، جواب‌های معادله فوق را به دست آورید.  $2\pi - \frac{13\pi}{4} = \frac{11\pi}{4}$   
 $2\pi + \frac{13\pi}{4} = \frac{29\pi}{4}$   
 برای هر عدد حقیقی  $-1 \leq a \leq 1$  در معادله  $\cos x = a$  زاویه‌ای حقیقی  $\alpha$  وجود دارد که  $\cos \alpha = a$



بنابراین برای حل معادله فوق کافی است ابتدا آن را به صورت  $\cos x = \cos \alpha$  نوشته و سپس رابطه بین زوایای  $x$  و  $\alpha$  را با توجه به دایره مثلثاتی روبه‌رو به صورت زیر به دست آوریم.  
 $\cos x = \cos \alpha \Rightarrow x = 2k\pi + \alpha$  و  $x = 2k\pi - \alpha, k \in \mathbb{Z}$

جواب‌های کلی معادله  $\cos x = \cos \alpha$  به صورت  $x = 2k\pi \pm \alpha$  می‌باشند که  $k \in \mathbb{Z}$



مثال: جواب‌های معادله  $\cos x = \frac{1}{3}$  را به دست آورید. کدام جواب‌ها در بازه  $[-3\pi, \pi]$  می‌باشند؟

می‌دانیم در  $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{3}$  پس معادله به صورت  $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$  می‌باشد. بنابراین جواب‌های کلی معادله به صورت زیر هستند:

$$x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

اکنون با جایگذاری مقادیر صحیح به جای  $k$  در عبارت فوق نتیجه می‌شود که جواب‌های  $x = -2\pi - \frac{\pi}{3}, -2\pi + \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}$

از معادله فوق در بازه داده شده می‌باشند.

مثال: معادله  $\sin 2x = \sin 3x$  را حل کنید.

می‌دانیم که جواب‌های این معادله به شکل زیر هستند:


$$\begin{cases} 2x = 2k\pi + 3x \Rightarrow x = 2k\pi, & k \in \mathbb{Z} \\ 2x = (2k+1)\pi - 3x \Rightarrow x = \frac{(2k+1)\pi}{5}, & k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

مثال: معادله  $2\sin 3x - \sqrt{2} = 0$  را حل کنید

$$2\sin 3x - \sqrt{2} = 0$$

$$2\sin 3x = \sqrt{2}$$

$$\sin 3x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \sin 3x = \sin \frac{\pi}{4} \Rightarrow \begin{cases} 3x = 2k\pi + \frac{\pi}{4} \Rightarrow x = \frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{12}, & k \in \mathbb{Z} \\ 3x = (2k+1)\pi - \frac{\pi}{4} \Rightarrow x = \frac{(2k+1)\pi}{3} - \frac{\pi}{12}, & k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$



مثال: یک بازیکن هندبال توپ را با سرعت

$16 \text{ m/s}$  برای هم‌تیمی خود که در  $12/8$  متری او

قرار دارد پرتاب می‌کند. اگر رابطه بین سرعت توپ

$v$  (بر حسب متر بر ثانیه)، مسافت طی شده افقی  $d$  (بر

حسب متر) و زاویه پرتاب  $\theta$  به صورت زیر باشد، آنگاه

زاویه پرتاب توپ چقدر بوده است؟

$$d = \frac{v^2 \sin 2\theta}{g}$$

از رابطه داده شده به دست می آید:

$$12/8 = \frac{(16)^2 \sin 2\theta}{10} \Rightarrow \sin 2\theta = \frac{12/8 \times 10}{256} \Rightarrow \sin 2\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} 2\theta = 2k\pi + \frac{\pi}{6}, & k \in \mathbb{Z} \\ 2\theta = (2k+1)\pi - \frac{\pi}{6}, & k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

با توجه به شکل، جواب قابل قبول  $\theta = \frac{\pi}{12}$  می باشد.

مثال: جواب های معادله  $\sin x \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$  را به دست آورید.

$$2 \sin x \cos x = 2 \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

$$\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin 2x = \sin \frac{\pi}{3} \Rightarrow \begin{cases} 2x = 2k\pi + \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{6}, & k \in \mathbb{Z} \\ 2x = (2k+1)\pi - \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = \frac{(2k+1)\pi}{2} - \frac{\pi}{6}, & k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

مثال: معادله  $\cos x (2 \cos x - 9) = 5$  را حل کنید

ابتدا این معادله را به صورت  $2 \cos^2 x - 9 \cos x - 5 = 0$  می نویسیم. با تغییر متغیر  $t = \cos x$  می توان معادله فوق را به معادله درجه دوم

$2t^2 - 9t - 5 = 0$  تبدیل کرد. جواب های این معادله  $t = 5$  و  $t = -\frac{1}{2}$  است. بنابراین جواب های معادله مثلثاتی بالا از حل

دو معادله ساده  $\cos x = 5$  و  $\cos x = -\frac{1}{2}$  به دست می آیند. از آنجا که  $\cos x = 5$  جواب ندارد (جرا؟) فقط جواب های معادله

$\cos x = -\frac{1}{2}$  را به دست می آوریم.

$$\cos x = -\frac{1}{2} \Rightarrow \cos x = \cos \frac{2\pi}{3} \Rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$$

مثال: معادله  $\sin x + \cos x = 1$  را در بازه  $0 \leq x \leq 2\pi$  حل کنید.

$$\sin x + \cos x = 1$$

$$\sin x = 1 - \cos x$$

$$\sin^2 x = (1 - \cos x)^2$$

$$\sin^2 x = 1 - 2 \cos x + \cos^2 x \quad \text{استفاده از رابطه } \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

فصل دوم: مثلثات ۴۱

$$1 - \cos^2 x = 1 - 2 \cos x + \cos^2 x$$

$$2 \cos^2 x - 2 \cos x = 0$$

$$2 \cos x (\cos x - 1) = 0 \Rightarrow 2 \cos x = 0 \text{ یا } \cos x - 1 = 0$$

اکنون جواب‌های معادله‌های به دست آمده را در بازه  $0 \leq x < 2\pi$  می‌یابیم:

$$2 \cos x = 0 \Rightarrow \cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$$


$$\cos x - 1 = 0 \Rightarrow \cos x = 1 \Rightarrow x = 0, 2\pi$$

از آنجا که در گام سوم از به توان رساندن استفاده کرده‌ایم باید جواب‌های به دست آمده فوق را در معادله گذاشته و درستی آنها را

تحقیق کنیم (چرا؟). پس از بررسی معلوم می‌شود که  $x = \frac{3\pi}{2}$  جواب معادله داده شده نیست و بنابراین غیر قابل قبول است اما  $x = 0, \frac{\pi}{2}$  مقادیر به دست آمده جواب معادله در بازه داده شده هستند. *نکته: از توان رساندن استفاده نکنیم و جواب‌های ما قدری جواب فرعی امکان شده باشد که باید بررسی آن‌ها صرف می‌شود.*

در شکل زیر نمودار تابع  $y = \tan x$  و خط  $y = a$  که  $a$  یک عدد حقیقی است رسم شده‌اند. از روی نمودار این دو تابع می‌توان مشاهده کرد که جواب‌های معادله  $\tan x = a$  همان طول نقاط تقاطع دو نمودار است. در واقع همواره برای عدد حقیقی  $a$ ، که  $\tan x = a$  زاویه‌ای چون  $\alpha$  وجود دارد که برای آن داریم  $\tan \alpha = a$ . بنابراین معادله  $\tan x = a$  به صورت  $\tan x = \tan \alpha$  بازنویسی می‌شود. اکنون برای یافتن جواب‌های معادله  $\tan x = \tan \alpha$  باید رابطه بین زوایای  $x$  و  $\alpha$  را بیابیم.





از دایره مثلثاتی و محور تنازنت در شکل مقابل می توان دریافت که رابطه بین زوایای  $x$  و  $a$  به صورت  $x = k\pi + a$  که  $k$  یک عدد صحیح، است می باشد.

در نمودار بالا اگر  $a = 1$  باشد، داریم:

$$\tan x = 1 \Rightarrow \tan x = \tan \frac{\pi}{4} \Rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{4} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

جواب های کلی معادله  $\tan x = \tan a$  به صورت  $x = k\pi + a$  می باشد که  $k$  یک عددی صحیح است.

❖ مثال: معادله  $\tan x = \tan 5x$  را حل کنید.

$$x = k\pi + 5x \Rightarrow 4x = k\pi \rightarrow x = \frac{k\pi}{4} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

❖ حل:

از روابط مجموع و تفاضل زوایا برای نسبت های مثلثاتی سینوس و کسینوس می توان روابط مجموع و تفاضل زوایا را برای تنازنت به صورت زیر به دست آورد.

$$\begin{aligned} \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta} \\ &= \frac{\frac{\sin \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} + \frac{\cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}}{\frac{\cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \end{aligned}$$

همچنین با تغییر  $\beta$  به  $-\beta$  در رابطه فوق رابطه تفاضل زوایا به صورت زیر به دست می آید:


$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

## گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

فصل دوم: مثلثات ۴۳

مثال: نشان دهید در شکل زیر رابطه بین زاویه دید دوربین ( $\beta$ ) با فاصله افقی آن با تابلو نقاشی به صورت زیر است.

$$\tan \beta = \frac{2/5x}{x^2 + \frac{3}{4}}$$



نسب زاویه دید را در حالتی که فاصله افقی برابر یک متر است به دست آورید.

پاسخ حل: با توجه به شکل برای مثلث قائم الزاویه پایین شکل داریم:

$$\tan \alpha = \frac{2/5}{x}$$

$$\tan \theta = \frac{3}{x}$$

همچنین برای مثلث بزرگ که یک زاویه آن  $\theta$  است داریم:

اکنون با استفاده از رابطه تفاضل زوایا برای تانژانت به دست می آید:

$$\tan \beta = \tan(\theta - \alpha) = \frac{\tan \theta - \tan \alpha}{1 + \tan \theta \tan \alpha} = \frac{\frac{3}{x} - \frac{2/5}{x}}{1 + \frac{3}{x} \cdot \frac{2/5}{x}} = \frac{\frac{3 - 2/5}{x}}{\frac{x^2 + 3}{x^2}} = \frac{2/5x}{x^2 + \frac{3}{4}}$$

وقتی فاصله افقی برابر یک متر آنگاه داریم:

$$x = 1 \rightarrow \tan \beta = \frac{2/5 \times 1}{1^2 + \frac{3}{4}} = \frac{2/5}{2/5} = 1$$

از طرفی می دانیم که  $\tan \frac{\pi}{4} = 1$  پس جواب های معادله  $\tan \beta = 1$  به صورت زیر به دست می آید:

$$\beta = k\pi + \frac{\pi}{4}$$

لیکن با توجه به شکل تنها جواب منطقی در حالت  $k=0$  که مقدار  $\beta = \frac{\pi}{4}$  را به دست می دهد قابل قبول می باشد.

$$\begin{cases} \cos \alpha = \frac{5}{13} \\ \sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{25}{169}} = \sqrt{\frac{144}{169}} = \frac{12}{13} \\ \cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = 2 \times \frac{25}{169} - 1 = \frac{50}{169} - 1 = \frac{-119}{169} \\ \sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha = 2 \times \frac{12}{13} \times \frac{5}{13} = \frac{120}{169} \end{cases}$$

تمرین

فرض کنید  $\cos \alpha = \frac{5}{13}$  و  $\alpha$  زاویه‌ای حاده باشد. حاصل عبارات زیر را به دست آورید.

الف)  $\cos 2\alpha$

ب)  $\sin 2\alpha$

نسبت‌های مثلثی سینوس و کسینوس را برای زاویه  $22/5^\circ$  به دست آورید.

$$\sin 22,5^\circ = \sqrt{\frac{1 - \cos 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$$

معادلات زیر را حل کنید.

$$\cos 22,5^\circ = \sqrt{\frac{1 + \cos 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$$

الف)  $\sin \frac{\pi}{4} = \sin 2x$

ب)  $\cos 2x - \cos x + 1 = 0$

ب)  $\cos x = \cos 2x$

ت)  $\cos 2x - \sin x + 1 = 0$

ت)  $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$

ج)  $\sin x - \cos^2 x = 0$

ج)  $\tan (2x - 1) = 0$

ح)  $\tan 2x = \tan \pi x$

مثلثی با مساحت ۳ سانتی متر مربع مفروض است. اگر اندازه دو ضلع آن به ترتیب ۲ و ۶ سانتی متر باشند، آنگاه چند مثلث با

این خاصیت‌ها می‌توان ساخت؟



$$\frac{1}{2} \times 2 \times 6 \times \sin \alpha = 3$$

$$\sin \alpha = \frac{1}{2}$$

$$\alpha = 2k\pi + \frac{\pi}{6} \text{ kez}$$

$$\alpha = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{6} \text{ kez}$$

دو حالت می‌توان ساخت  $\alpha = \frac{\pi}{6}$  و  $\alpha = \frac{5\pi}{6}$

گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان



الف)  $\sin \frac{\pi}{p} = \sin \pi x$

$\pi x = 2k\pi + \frac{\pi}{p} \rightarrow x = \frac{2k\pi}{p} + \frac{1}{p}$

ب)  $\cos \pi x - \cos \pi + 1 = 0$

$\pi \cos \pi x - \pi \cos \pi + \pi = 0$

$\pi \cos \pi x - \cos \pi = 0 \rightarrow \cos \pi x (\pi \cos \pi - 1) = 0$   $\begin{cases} \cos \pi x = 0 \\ \cos \pi x = \frac{1}{\pi} \end{cases}$

$\begin{cases} x = k\pi + \frac{\pi}{2} \\ x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{p} \end{cases}$

ج)  $\cos \pi x - \sin x + 1 = 1 \rightarrow -\pi \sin \pi x + 1 - \sin x = 0 \rightarrow \pi \sin \pi x + \sin x - 1 = 0$

$(\sin x + 1)(\pi \sin x - 1) = 0 \rightarrow \begin{cases} \sin x = -1 \rightarrow x = 2k\pi + \frac{3\pi}{2} \\ \sin x = \frac{1}{\pi} \rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + \frac{\pi}{4} \\ x = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{4} \end{cases} \end{cases}$

د)  $\cos \pi x = \cos \pi x$

$x = 2k\pi \pm \pi$

$\begin{cases} \pi x = 2k\pi + \pi \rightarrow x = -2k\pi \\ x = 2k\pi - \pi \rightarrow x = \frac{2k\pi}{p} \end{cases}$

ه)  $\pi \sin \pi x + \sin x - 1 = 0 \rightarrow (\sin x + 1)(\pi \sin x - 1) = 0$   $\begin{cases} \sin x = -1 \\ \sin x = \frac{1}{\pi} \end{cases}$

$\rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + \frac{3\pi}{2} \\ x = 2k\pi + \frac{\pi}{4} \\ x = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{4} \end{cases}$

و)  $\sin \pi x - \cos \pi x = 0 \rightarrow \sin x + \pi \sin \pi x - 1 = 0 \rightarrow (\sin x + 1)(\pi \sin x - 1) = 0$

$-\pi \sin \pi x + 1$

$\begin{cases} \sin x = -1 \\ \sin x = \frac{1}{\pi} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + \frac{3\pi}{2} \\ x = 2k\pi + \frac{\pi}{4} \\ x = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{4} \end{cases}$

ز)  $\tan(\pi x - 1) = 0$

$\pi x - 1 = k\pi$

$x = \frac{k\pi + 1}{\pi}$

ح)  $\tan \pi x = \tan \pi x$

$\pi x = k\pi + \pi x$

$(\pi - \pi)x = k\pi$

$x = \frac{k\pi}{\pi - \pi}$

## حدهای نامتناهی – حد در بی نهایت

۱. حدهای نامتناهی

۲. حد در بی نهایت

فصل

آفریدگار مهربان و مهربان

بسیاری از پدیده‌های طبیعی به وسیله توابع ریاضی مدل‌سازی می‌شوند. در مسئله پاک‌سازی آب رودخانه‌ها، با تابع  $f(x) = \frac{7500}{1000 - x}$  مدل‌سازی می‌شود. که در آن  $x$  درصد آلودگی و  $f(x)$  هزینه پاک‌سازی برحسب میلیون تومان است. از آنجا که این تابع رفتار بی‌نهایت دارد برای پاک‌سازی نزدیک صدها درصد آلودگی‌های آب این رودخانه هزینه بسیار زیاد خواهد بود. به طوری که می‌توان گفت هزینه‌ها به سمت بی‌نهایت میل می‌کند.

## حدهای نامتناهی

درس

در سال قبل با حد یک تابع در یک نقطه آشنا شدیم. دیدیم که  $l$  حد تابع  $f$  در نقطه  $a$  است هرگاه بتوانیم مقدارهای  $f(x)$  را به دلخواه (هر قدر که بخواهیم) به  $l$  نزدیک کنیم به شرطی که  $x$  را به اندازه کافی به  $a$  (از دو طرف  $a$ ) نزدیک کرده باشیم اما  $x$  برابر  $a$  نشده باشد در این درس با رفتار برخی دیگر از توابع در همسایگی محدوف یک نقطه آشنا می‌شویم.

### فعالیت



در سال قبل با نمودار تابع گویای  $f(x) = \frac{1}{x}$  آشنا شدیم می‌خواهیم رفتار این تابع را در همسایگی راست  $x = 0$  بررسی کنیم.

۱ جدول زیر رفتار تابع را به ازای برخی از مقادیر  $x$  نشان می دهد آن را تکمیل کنید.

$x$	$\times/1$	$\times/10$	$\times/100$	$\times/1000$	$\dots \rightarrow$
$f(x)$	۱۰	۱۰۰	۱۰۰۰	۱۰.۰۰۰	$\dots \rightarrow$ تعریف شده

۱ اگر بخواهیم  $f(x)$  را از یک میلیون بزرگ تر شود مقدار  $x$  از چه عددی باید کوچک تر شود؟ **یک میلیونیم (۱۰<sup>-۶</sup>)**

۱ وقتی  $x$  با مقادیر بزرگ تر از صفر به صفر نزدیک می شود آیا مقادیر تابع به عددی خاص نزدیک می شوند؟ چرا؟ **خیر**  
 وقتی  $x$  با مقادیر بزرگ تر از صفر به صفر نزدیک می شود مقادیر  $f(x)$  نسبتاً بزرگ می شوند  
 با توجه به این فعالیت مشاهده می شود که وقتی  $x$  با مقادیر بزرگ تر از صفر به صفر نزدیک می شود مقادیر  $f(x)$  بدون هیچ محدودیتی افزایش می یابد. به بیان دیگر می توانیم  $f(x)$  را از هر عدد مثبت دلخواهی در نظر بگیریم بزرگ تر کرد به شرطی که  $x$  را به اندازه کافی با مقادیر بزرگ تر از صفر، به صفر نزدیک کرد در این صورت می نویسیم:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = +\infty$

تذکر: این نماد نشان می دهد که حد فوق موجود نیست. چون مقدار تابع به عدد خاصی نزدیک نمی شود و مثبت بی نهایت فقط یک نماد است که نمایش می دهد مقدار تابع از هر عدد مثبتی می تواند بزرگ تر باشد.

کارد کلاس

برای تابع  $f(x) = \frac{1}{x}$

الف) جدول زیر را کامل کنید:

$x$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{10}$	$-\frac{1}{100}$	$-\frac{1}{1000}$	$-\frac{1}{10000}$	$\dots \rightarrow$
$f(x)$	۲	-۲	-۱۰	-۱۰۰	-۱۰۰۰	-۱۰۰۰۰	$\dots \rightarrow$ تعریف شده

ب) اگر بخواهیم مقدار  $f(x)$  از  $-10^6$  کوچک تر شود  $x$  باید چگونه انتخاب شود؟ **باید  $x < -10^{-6}$**

ب) وقتی  $x$  از سمت چپ به صفر نزدیک شود  $f(x)$  چه تغییری می کند؟ **مقادیر  $f(x)$  نسبتاً بزرگ و منفی می شود**  
**اما به عدد خاصی نزدیک نمی شود**  
 ت) در مورد  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$  چه می توان گفت؟

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$


با توجه به آنچه در فعالیت و کار در کلاس صفحہی قبل مشاهده شد تعریف زیر را می‌توان ارائه داد.

تعریف حدهای یک طرفه نامتناهی


فرض کنیم تابع  $f$  در یک همسایگی راست نقطه‌ای مانند  $a$  تعریف شده باشد در این صورت  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$  بدین معنی است که می‌توانیم  $f(x)$  را به دلخواه هر قدر بخواهیم از هر عدد مثبتی بزرگ‌تر کنیم به شرطی که  $x$  را از سمت راست به اندازه کافی به  $a$  نزدیک کرده باشیم.

همچنین فرض کنیم تابع  $f$  در یک همسایگی چپ نقطه‌ای مانند  $a$  تعریف شده باشد در این صورت  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$  بدین معنی است که می‌توانیم  $f(x)$  را به دلخواه هر قدر بخواهیم از هر عدد مثبتی بزرگ‌تر کنیم به شرطی که  $x$  را از سمت چپ به اندازه کافی به  $a$  نزدیک کرده باشیم.


تذکره: تعریف حدهای یک طرفه نامتناهی  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$  نیز مشابه تعاریف فوق است. توصیف حالت‌های مختلف حدهای یک طرفه نامتناهی در شکل‌های زیر آمده است.




$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$




$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$$



مثال: نمودار تابع  $f(x) = \frac{1}{x}$  در شکل روبه‌رو رسم شده

است می‌خواهیم رفتار تابع  $f$  را در همسایگی محذوف نقطه  $x = 0$

بررسی کنیم به جدول صفحہ بعد توجه کنید:

©

فصل سوم: جدهای نامتناهی - حد در بی نهایت ۴۸

$x$	$-0.5$	$-0.1$	$-0.01$	$-0.001$	$\dots \rightarrow$	$0$	$\leftarrow \dots$	$0.001$	$0.01$	$0.1$	$0.5$
$f(x)$	۲	۱۰	۱۰۰	۱۰۰۰	$\dots \rightarrow$	تعریف نشده	$\leftarrow \dots$	۱۰۰۰	۱۰۰	۱۰	۲

مشاهده می‌شود با نزدیک کردن  $x$  به اندازه کافی به صفر، مقدارهای  $f(x)$  را می‌توان به دلخواه بزرگ کرد بنابراین  $f(x)$  از هر عدد دلخواه بزرگ‌تر می‌شود و در نتیجه مقدار حد تابع یک عدد خاصی نمی‌شود و حد متناهی ندارد. در اینجا می‌نویسیم

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x|} = +\infty$$

تعریف:

فرض کنید تابع  $f$  در همسایگی محذوف  $a$  تعریف شده باشد در این صورت  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$  یعنی اینکه می‌توانیم  $f(x)$  را به میزان دلخواه از هر عدد مثبت بزرگ‌تر کنیم به شرطی که  $x$  را به اندازه کافی به  $a$  نزدیک کرده باشیم.

تعریف مشابهی از حد در مورد تابع‌هایی که وقتی  $x$  به  $a$  نزدیک می‌شود مقدار تابع خیلی کوچک‌تر می‌شود در زیر وجود دارد.


تعریف:

فرض کنید تابع  $f$  در همسایگی محذوف  $a$  تعریف شده باشد در این صورت  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$  یعنی اینکه می‌توانیم مقدارهای  $f(x)$  را به میزان دلخواه از هر عدد منفی کوچک‌تر کنیم به شرطی که  $x$  را به اندازه کافی به  $a$  نزدیک کرده باشیم.

مثال: برای حد تابع  $f(x) = \frac{1}{x}$  در نقطه  $x = 0$  می‌توان گفت:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$


مثال: در مورد حد تابع  $f(x) = \frac{1}{|x|}$  در نقطه  $x = 0$  می‌توان گفت:  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{|x|} = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{|x|} = +\infty$

نمودار توابع  $f, g, h$  در شکل های زیر داده شده اند با توجه به آنها حدود خواسته شده را در صورت وجود به دست آورید.



$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$$


$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$$

نهیته کنده!

گروه ریاضی مطلق دوم متوسطه، امتحان خوزستان



$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} h(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} h(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{3\pi}{2})^-} h(x) = +\infty$$

خرواشفتی

بی نهایت مفهومی انتزاعی است که در رشته های مختلف ریاضیات با تغییرات مختلف به کار می رود و معمولاً به معنای «فراتر از هر مقدار» است و برای توصیف مقادیر بیش از هر عدد به کار می رود و نشانه آن در ریاضیات  $\infty$  می باشد.

این نماد به صورت چیزی است که محدود نیست و در آن هیچ محدودیت فضایی و زمانی وجود ندارد. در حسابان بی نهایت به معنای چیزی بی پایان است  $\infty \rightarrow \infty$  یعنی متغیر  $x$  فراتر از هر مقدار در نظر گرفته شده رشد می کند.

بی نهایت دارای دو مفهوم فیزیکی و ریاضی است که کاملاً با یکدیگر متفاوت اند مفهوم فیزیکی بی نهایت دارای تعریف دقیقی نیست و در جاهای مختلف برای شرایط متفاوت است. به عنوان مثال می گویم اگر جسم در کانون عدسی محدب قرار گیرد تصویر در بی نهایت تشکیل می شود. حال اگر دو عدسی با فواصل کانونی متفاوت در خط بگیریم و اجسامی را روی کانون این دو عدسی قرار دهیم. طبق قاعده تصاویر هر دو در بی نهایت تشکیل می شود. اما تصویر این دو دقیقاً در یک نقطه تشکیل نمی شود. یعنی بی نهایت برای این دو عدسی متفاوت است اما مفهوم بی نهایت در ریاضیات کاملاً متفاوت با بی نهایت فیزیکی است در ریاضیات می گویم «بی نهایت مفهومی است که از هر مقدار دیگر بیشتر است» این مفهوم دقیقاً همان مفهومی است که در «حد در بی نهایت» در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال در حد تابع می گویم  $x \rightarrow \infty$  یعنی اینکه  $x$  از هر عدد انتخاب شده ای بزرگتر باشد.



### برخی از قضایای حدهای بی نهایت

نقطه قضیه ۱: اگر  $n$  یک عدد طبیعی باشد، آن گاه:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^n} = \begin{cases} +\infty & n \text{ عددی زوج باشد،} \\ -\infty & n \text{ عددی فرد باشد.} \end{cases}$$

نقطه مثال: با توجه به قضیه فوق می توان نوشت:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^3} = -\infty$$

نقطه قضیه ۲: الف) اگر  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$  آن گاه  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = +\infty$  و برعکس.

ب) اگر  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$  آن گاه  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = +\infty$  و برعکس.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{|x-1|} = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{|x-1|} = +\infty \quad \text{در نتیجه} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{|x-1|} = +\infty$$

### کلردر کلاس

با استفاده از نمودار توابع داده شده و همچنین فضایای بالا حاصل حدود زیر را بدست آورید.



مثبت قضیه ۱ (مزاحمت)  $n=1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

ب)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$

الف)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$





قضیه ۳: اگر  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \neq 0$  و  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$  آن گاه:

الف) اگر  $L > 0$  و مقادیر  $g(x)$  در یک همسایگی محذوف  $a$  مثبت باشد، آن گاه  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$

ب) اگر  $L < 0$  و مقادیر  $g(x)$  در یک همسایگی محذوف  $a$  مثبت باشد، آن گاه  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$

پ) اگر  $L > 0$  و مقادیر  $g(x)$  در یک همسایگی محذوف  $a$  منفی باشد، آن گاه  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$

ت) اگر  $L < 0$  و مقادیر  $g(x)$  در یک همسایگی محذوف  $a$  منفی باشد، آن گاه  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$

تذکر: قضیه ۳ در حالتی که  $x \rightarrow a$  یا  $x \rightarrow a^-$  نیز برقرار است.

مثال: هزینه پاک‌سازی  $x$  درصد آلودگی‌های شهری و صنعتی از رودخانه‌ای به وسیله تابعی، با ضابطه  $f(x) = \frac{255x}{100-x}$  محاسبه می‌شود که در آن  $x$  درصد آلودگی و  $f(x)$  هزینه پاک‌سازی برحسب میلیون تومان است دامنه تابع  $[0, 100)$  می‌باشد. مثلاً برای هزینه ۲۰ درصد از آلودگی‌های این رودخانه ۴۲۰۷۵ میلیون تومان لازم است.

برای پاک‌سازی ۹۵ درصد از آلودگی‌ها  $f(95) = 27825$  و در نتیجه نزدیک به پنج میلیارد تومان برای این کار لازم است.

توجه به قضیه فوق داریم:  $\lim_{x \rightarrow 100^-} \frac{255x}{100-x} = +\infty$

و این بدان معنا است که با نزدیک شدن  $x$  به عدد ۱۰۰ مقدار  $f(x)$  از هر عدد مثبت از پیش تعیین شده‌ای بزرگ‌تر خواهد شد لذا نمی‌توان صد درصد آلودگی‌های رودخانه را پاک‌سازی کرد.



سد شهید عباسپور، آندیکا، خوزستان، کشور جمهوری اسلامی ایران

مثال: حاصل  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1}{4-x^2}$  را به دست آورید.

حل: از آنجا که  $4-x^2 = (2-x)(2+x)$  وقتی  $x$  در همسایگی جیب ۲، باشد. مخارج کسر یا مقادیر مثبت به صفر میل می‌کنند.

از طرفی  $\lim_{x \rightarrow 2} x+1 = 3$  طبق بند الف) قضیه فوق  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1}{4-x^2} = +\infty$

مثال: حاصل  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-1}{\sin x}$  را به دست آورید.

حل: وقتی  $x$  در همسایگی راست صفر باشد حد صورت کسر برابر  $-1$  و حد مخرج کسر برابر صفر است و از آنجا که در

همسایگی راست صفر  $\sin x$  مقداری مثبت است. در نتیجه طبق بند (ب) قضیه فوق  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-1}{\sin x} = -\infty$

مثال: حاصل  $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x^2+x}{x^2+2x+1}$  را به دست آورید.

حل: از آنجا که حد فوق به صورت  $\frac{0}{0}$  در می‌آید و چون  $x \neq -1$  پس می‌توان صورت و مخرج کسر را بر  $x-1$  تقسیم کرد.

داریم:

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x^2+x}{x^2+2x+1} = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x(x+1)}{(x+1)^2} = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x}{x+1} = +\infty$$

### کاردرکلاس

جذهای زیر را محاسبه کنید.

الف)  $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1-x}{x+2} = \frac{1-2}{-2+2} = \frac{-1}{0^+} = +\infty$

ب)  $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{[x]-2}{x-2} = \frac{[2]-2}{2-2} = \frac{1-2}{0^-} = \frac{-1}{0^-} = +\infty$

ب)  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2-1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x+1)(x-1)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1} = \frac{1+1}{1-1} = \frac{2}{0^+} = +\infty$

قضیه ۴: اگر  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  و  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$  (و یا  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$ ) آنگاه  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

تذکر: قضیه فوق در حالتی که  $x \rightarrow a^+$  یا  $x \rightarrow a^-$  نیز برقرار است.

مثال: حاصل  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{x+1}{\tan x}$  را به دست آورید.

حل: در یکی از کار در کلاس‌های قبل به صورت شهودی دیده شد که:  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$  از طرفی

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{x+1}{\tan x} = 0 \text{ طبق قضیه فوق } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (x+1) = \frac{\pi}{2} + 1$$

توابع  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  و  $g(x) = x+1$  را در نظر بگیرید.  
الف) حاصل  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  را به دست آورید.  
ب) تابع  $f+g$  را به صورت یک تابع گویا بنویسید و حاصل  $\lim_{x \rightarrow 0} (f+g)(x)$  را محاسبه کنید.  
ب) چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟  
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x + 1}{x^2} = +\infty$   
ب) تابع  $f \times g$  را به صورت یک تابع گویا بنویسید و حاصل  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \times g(x)$  را محاسبه کنید و ارتباط آن را با  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  بیان کنید.  
 $(f \times g)(x) = \frac{1}{x^2} \times (x+1) = \frac{x+1}{x^2}$   
 $\lim_{x \rightarrow 0} (f \times g)(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x^2} = \frac{1}{0^2} = +\infty$   
همان‌طور در فعالیت فوق مشاهده کردید به‌طور کلی قضیه زیر را می‌توان بیان کرد.

قضیه ۵: اگر  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$  آن‌گاه:

الف)  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = +\infty$

ب) اگر  $L > 0$  آن‌گاه  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = +\infty$

ب) اگر  $L < 0$  آن‌گاه  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = -\infty$

تذکر: قضیه فوق برای حالتی که  $x \rightarrow a'$  یا  $x \rightarrow a''$  نیز برقرار است.

مثال: برای به دست آوردن حاصل  $\lim_{x \rightarrow 0} (2x+1 + \frac{1}{x^2})$  از آنجا که  $\lim_{x \rightarrow 0} (2x+1) = 1$  و  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$  با توجه به بند الف قضیه فوق حاصل حد برابر  $+\infty$  می‌شود.

مثال: حاصل  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin^2 x}{x^2}$  را به دست آورید.

حل: می‌توان نوشت  $\frac{x + \sin^2 x}{x^2} = \frac{1}{x} + \frac{\sin^2 x}{x^2}$  از طرفی  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} = 1$  و  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty$  با توجه به بند الف قضیه فوق حاصل حد برابر  $+\infty$  خواهد شد.

۱- این قضیه در حالت  $L = 0$  در این کتاب بررسی نمی‌شود و در آوازیایی‌ها رعایت این مسئله الزامی است. همچنین حالت  $0 \cdot \infty$  در این کتاب مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.



فصل سوم: جدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(n) = L, \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = -\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f+g)(n) = -\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f \cdot g)(n) = -\infty \text{ اگر } L > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f \cdot g)(n) = +\infty \text{ اگر } L < 0$$

در در کلاس

قضیه ۵ را در حالتی که  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$  بازنویسی کنید.



حاصل حدود زیر را به دست آورید در هر مرحله مشخص کنید از کدام قضیه استفاده کرده‌اید.

الف)  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+1}{x-1} = \frac{1+1}{1-1} = \frac{2}{0^-} = -\infty$       ب)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2+x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \frac{1}{x}) = +\infty$

ب)  $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x+2}{x^2+4x+4} = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{n+2}{(n+2)^2} = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{1}{n+2} = \frac{1}{-2+2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$       ت)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 - \cos 2x}{x} = \frac{2 - \cos(0)}{0^+} = \frac{2-1}{0^+} = \frac{1}{0^+} = +\infty$

مجاناب قائم

به نمودارهای هر یک از توابع  $f(x) = \frac{1}{x}$  و  $g(x) = \frac{1}{x^2}$  در اطراف نقطه صفر توجه کنید.



$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$  خط  $x=0$  را در هر دو منحنی، مجاناب قائم نمودار می‌گویند.

تعریف:

خط  $x=a$  را مجاناب قائم نمودار تابع  $f(x)$  گویند هرگاه حداقل یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$


$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$



توجه کننده:  
گروه ریاضی، مقطع نهم متوسطه، استان خوزستان


۵۶

مثال: در هر یک از شکل های زیر خط  $x = a$  یک مجانب قائم منحنی داده شده است.




$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$$




$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$$




$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$

مثال: کدام یک از خطوط  $x = 3$  و  $x = -1$  مجانب های قائم تابع  $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 2x - 3}$  می باشند؟

حل: شرایط مجانب قائم را برای دو خط مذکور بررسی می کنیم.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 2x - 3} = -\infty$$

به علاوه از آنجا که  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$  می توانستیم بگوییم  $x = -1$  نیز مجانب قائم منحنی تابع  $f$  است از طرفی

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 2x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x-1)}{(x-3)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-1}{x+1} = \frac{1}{2}$$

خط  $x = 3$  شرایط مجانب قائم را ندارد. لذا منحنی تابع  $f$  فقط یک مجانب قائم به صورت  $x = -1$  دارد.

فصل سوم : جدهای ناستناهی - حد در بی نهایت

مثال : نمودار تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{x+1}{x^2+x}$  در نزدیکی مجانب قائم آن به چه صورتی می باشد؟

$$f(x) = \frac{x+1}{x(x^2+1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$$



پس خط  $x = 0$  مجانب قائم منحنی تابع است و در مجاورت این خط نمودار تابع به صورت روبه رو خواهد بود.

کاور کلاس

$$x^2 - x - 4 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = -2 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - x - 4} = \frac{9 - 9 + 2}{9 - 3 - 4} = \frac{2}{2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - x - 4} = \frac{4 + 6 + 2}{4 + 2 - 4} = \frac{12}{2} = 6$$

مجانب های قائم تابع  $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - x - 6}$  را در صورت وجود به دست آورید.

$x = 3$   
 $x = -2$

مجاانب قائم  
 $x = 3$   
 $x = -2$



سوال 1

(الف)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{3+n^2} = \sqrt{3}$   
 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty^+$   
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3+n^2}}{n^2} = +\infty$

توجه کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان

تمرین

با استفاده از قضایای نامتناهی درستی حدهای زیر را نشان دهید.

(الف)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3+x^2}}{x^2} = +\infty$

(ب)  $\lim_{x \rightarrow -2} \left| \frac{5-x}{2+x} \right| = +\infty$

(ب)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty$

$\lim_{n \rightarrow 2} (1) = 1$   
 $\lim_{n \rightarrow 2} (n-2)^2 = 0^+$   
 $\lim_{n \rightarrow 2} \frac{1}{(n-2)^2} = +\infty$


$\lim_{x \rightarrow -2} \left| \frac{5-x}{2+x} \right| = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{5-(-2)}{2+(-2)} = \frac{7}{0} = +\infty$

حدهای زیر را محاسبه کنید

(الف)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x}{x^2-4} = \frac{4}{4-4} = \frac{4}{0} = -\infty$   
 (ب)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2+2x-1}{x^2+x-12} = \frac{9+6-1}{9+3-12} = \frac{14}{0} = -\infty$   
 (ب)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+1}{9-x^2} = \frac{4}{9-9} = \frac{4}{0} = -\infty$



نمودار تابعی را رسم کنید که دامنه آن  $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$  بوده و دارای دو مجانب قائم باشد.



نمودار تابعی را رسم کنید که دامنه آن  $\mathbb{R} - \{-2, 2\} - \{1\}$  بوده و دارای مجانب قائم باشد.

مجاانب‌های قائم توابع زیر را در صورت وجود به دست آورید.

(الف)  $f(x) = \frac{2x-1}{3-x}$

(ب)  $g(x) = \frac{x^2+x}{x^2-x}$

$x^2-x=0 \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=1 \end{cases}$  (مجاانب قائم است)

$x=3 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x-1}{3-x} = \frac{5}{0} = \infty$

$\lim_{n \rightarrow 1} \frac{n^2+n}{n^2-n} = \frac{2}{0} = \infty$


$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{n^2+n}{n^2-n} = \frac{1}{-1} = -1$

$x=3$  می باشد قائم است

نمودار تابع  $f(x) = \frac{1}{x-|x|}$  در مجاورت مجانب قائم خود چگونه است؟

$x=0$  می باشد  $D_f = (-\infty, 0)$

کدام شکل زیر وضعیت نمودار تابع  $f(x) = \frac{x}{x^2-2x+1}$  را در همسایگی  $x=1$  نمایش می دهد؟ چرا؟




$\lim_{n \rightarrow 1} \frac{n}{n^2-2n+1} = \lim_{n \rightarrow 1} \frac{n}{(n-1)^2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$   
 $\lim_{n \rightarrow 1} \frac{n}{n^2-2n+1} = \lim_{n \rightarrow 1} \frac{n}{(n-1)^2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$

© Gambi

## حد در بی نهایت

در درس قبل حدهای نامتناهی و مجانب‌های قائم یک منحنی را بررسی کردیم در آنجا مشاهده کردیم که با نزدیک شدن  $x$  به چه عددی  $f(x)$  به دلخواه بزرگ‌تر می‌شود.  
در این درس بررسی می‌کنیم که با دلخواه بزرگ شدن (تزدیک شدن)  $x$  مقادیر  $f(x)$  چه تغییری می‌کند؟ این مطلب در رسم نمودارها و برای بررسی رفتار شاخه‌های نمودار تابع بسیار مفید است.

## فعالیت



نمودار تابع  $f(x) = \frac{1}{x}$  را در بازه  $(0, +\infty)$

در نظر بگیرید.

۱ جدول زیر را کامل کنید.

$x$	۱	۲	۵	۱۰	۱۰۰	$10^2$	$10^5$	$10^6$
$f(x)$	۱	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{10^2}$	$\frac{1}{10^5}$	$\frac{1}{10^6}$

۲ اگر بخواهیم فاصله  $f(x)$  تا محور  $x$  ها از  $\frac{1}{5}$  کمتر شود  $x$  را باید حداقل از چه عددی بزرگ‌تر بگیریم؟

۳ اگر بخواهیم فاصله  $f(x)$  تا محور  $x$  ها از  $\frac{1}{10}$  کمتر شود  $x$  را باید حداقل از چه عددی بزرگ‌تر در نظر

بگیریم؟ ۱۰




۱ اگر بخواهیم فاصله  $f(x)$  تا محور  $x$  ها از  $\frac{1}{10}$  کوچک تر شود  $x$  را باید حداقل از چه عددی بزرگ تر در نظر بگیریم؟

۲ آیا فاصله  $f(x)$  تا محور  $x$  ها را می توان به هر میزان دلخواه کاهش داد؟ **پلم با آنتی ب گاهای بزرگ**

با توجه به نمودار تابع  $f(x) = \frac{1}{x}$  و جدول صفحه قبل می توان مشاهده کرد در صورتی که  $x$  به اندازه کافی بزرگ اختیار شود می توان  $f(x)$  را به اندازه دلخواه به صفر نزدیک کرد. در این صورت می گوئیم حد  $f(x)$  وقتی  $x$  به سمت مثبت بی نهایت میل کند

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \text{ می نویسیم}$$

### کاردر کلاس



نمودار تابع  $f(x) = \frac{1}{x}$  را در بازه  $(-\infty, 0)$  در نظر بگیرید.

۱ جدول زیر را کامل کنید.

$x$	-1	-2	-5	-10	-100	-10 <sup>2</sup>	-10 <sup>3</sup>	...
$f(x)$	-1	-1/2	-1/5	-1/10	-1/100	-1/10 <sup>2</sup>	-1/10 <sup>3</sup>	...

۲ اگر بخواهیم فاصله  $f(x)$  از محور  $x$  ها کمتر از  $\frac{1}{10}$  شود،  $x$  را باید از چه عددی کوچک تر در نظر بگیریم؟

۳ اگر بخواهیم فاصله  $f(x)$  تا محور  $x$  ها از  $\frac{1}{100}$  کمتر شود،  $x$  را باید از چه عددی کوچک تر در نظر بگیریم؟

با توجه به نمودار تابع  $f(x) = \frac{1}{x}$  و جدول بالا می توان مشاهده کرد اگر  $x$  به اندازه کافی کوچک تر (یعنی از هر عدد منفی

کوچک تر) شود آن گاه  $f(x)$  را می توان به اندازه دلخواه به صفر نزدیک کرد. در این صورت می نویسیم:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$



تذکره : منظور از  $x \rightarrow \pm\infty$  آن است که  $x \rightarrow +\infty$  یا  $x \rightarrow -\infty$  لذا با توجه به فعالیت و کار در کلاس صفحه قبل به طور خلاصه می‌توان نوشت :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$$

تعریف :

- اگر تابع  $f(x)$  در بازه‌ای مانند  $(a, +\infty)$  تعریف شده باشد گوئیم حد  $f(x)$  وقتی  $x$  به سمت مثبت بی‌نهایت میل می‌کند برابر  $l$  است و می‌نویسیم  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$  هرگاه بتوان با اختیار  $x$  های به قدر کافی بزرگ، فاصله  $f(x)$  از  $l$  را به هر اندازه کوچک کرد.
- اگر تابع  $f$  در بازه  $(-\infty, a)$  تعریف شده باشد. می‌گوئیم حد  $f(x)$  وقتی  $x$  به سمت منفی بی‌نهایت میل می‌کند برابر  $l$  است و می‌نویسیم  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$  هرگاه بتوان با اختیار  $x$  های به قدر کافی کوچک فاصله  $f(x)$  را از  $l$  به هر اندازه کوچک کرد.


### کاردر کلاس

با استفاده از نمودارهای  $f$  و  $g$  حدهای زیر را به دست آورید.



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -2$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

قضیه ۶: اگر  $a$  عددی حقیقی و  $n$  عددی طبیعی باشد آنگاه:

الف)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a}{x^n} = 0$

مثال: حاصل هر یک از حدود  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sqrt{2}}{x^2}$  و  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-5}{2x^3}$  برابر صفر است.

قضیه ۷: اگر  $L_1$  و  $L_2$  اعداد حقیقی و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L_1$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = L_2$  آنگاه:

الف)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f \pm g)(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = L_1 \pm L_2$

توجه کنید:

گروه ریاضی مفتح دوم متوسطه، استان خوزستان

ب)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = L_1 \cdot L_2$

پ)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)}{\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$  (با فرض  $L_2 \neq 0$ )

تذکر: قضیه فوق وقتی  $x$  به سمت  $-\infty$  میل می کند نیز برقرار است.

مثال: حدود زیر را محاسبه کنید.

الف)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 3 + \frac{5}{x^2} \right)$

ب)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{3}{x^2}}{\frac{5}{x} + 4}$

حل:

الف) با استفاده از قسمت الف قضیه ۷ و سپس استفاده از قضیه ۶ می توان نوشت:


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 3 + \frac{5}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x^2} = 3 + 0 = 3$$

ب) با استفاده از قسمت ب) قضیه ۷ و سپس استفاده از قضیه ۶ می توان نوشت:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{3}{x^2}}{\frac{5}{x} + 4} = \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} 2 + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x^2}}{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x} + \lim_{x \rightarrow -\infty} 4} = \frac{2 + 0}{0 + 4} = \frac{1}{2}$$

### حدهای نامتناهی در بی‌نهایت

در محاسبه حد توابع وقتی  $x$  به  $+\infty$  میل می‌کند، ممکن است، با بزرگ شدن مقادیر  $x$  مقدارهای  $f(x)$  به عدد خاصی نزدیک نشوند ولی مقادیر  $f(x)$  از هر عدد دلخواه مثبت بزرگ‌تر شوند همان‌طور که در نمودار توابع  $f(x) = x$  و  $g(x) = x^2$  در شکل زیر دیده می‌شود با افزایش مقادیر  $x$  مقادیر  $f(x)$  و  $g(x)$  از هر عدد دلخواه مثبتی بزرگ‌تر می‌شود.




همچنین با کوچک شدن مقادیر  $x$ ، مقادیر  $f(x)$  از هر عدد دلخواه منفی کوچک‌تر می‌شود، در نمودارهای بالا می‌توان مشاهده کرد که با کاهش مقادیر  $x$  مقادیر  $f(x)$  از هر عدد منفی دلخواه کوچک‌تر و مقادیر  $g(x)$  از هر عدد دلخواهی بزرگ‌تر می‌شود. در حالت کلی برای یک تابع  $f$  که در یک بازه  $(a, +\infty)$  تعریف شده است اگر با میل کردن  $x$  به سمت  $+\infty$  نیز به سمت

$$+\infty \text{ میل کند می‌گوییم حد این تابع در } +\infty \text{ برابر } +\infty \text{ است و می‌نویسیم } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\text{برای مثال } \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

همچنین اگر با میل کردن  $x$  به سمت  $+\infty$ ،  $f(x)$  به سمت  $-\infty$  میل کند می‌گوییم حد این تابع در  $+\infty$  برابر  $-\infty$  است و می‌نویسیم

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ به عنوان مثال } \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^2 = -\infty$$



$\lim_{n \rightarrow -\infty} f(n) = +\infty$  یعنی کاهش مقدار  $n$  مقادیر  $f(n)$  از هر عدد (جزءه مثبتی بزرگتری) شود.  
 $\lim_{n \rightarrow -\infty} f(n) = -\infty$  یعنی کاهش مقدار  $n$  مقادیر  $f(n)$  از هر عدد (جزءه منفی بزرگتری) شود.

کاردر کلاس

۱. مفاهیم  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  را بیان کنید.

۲. با توجه به نمودار توابع  $y = x^2$  و  $y = x$  حدود زیر را مشخص کنید.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$


$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$

توجه کنید:

گروه ریاضی سطح دوم متوسطه، استان خوزستان

فعالیت

تابع  $f(x) = x^3$  را با نمودار رویه رو در نظر بگیرید.



۱. جدول زیر را کامل کنید.

$x$	$\dots \leftarrow$	$-10^4$	$-10^3$	$-10^2$	$-10$	$1$	$10$	$100$	$1000$	$10^4$	$\rightarrow \dots$
$f(x)$	$\dots \leftarrow$	$-10^8$	$-10^6$	$-10^4$	$-10^2$	$1$	$1000$	$10^6$	$10^9$	$10^{12}$	$\rightarrow \dots$

۲. با افزایش (کاهش)  $x$ ، مقدار  $f(x)$  چه تغییری می کند؟ با افزایش (کاهش)  $f(x)$  افزایش (کاهش)  $x$  می پذیرد.

۳. در مورد حدهای  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3$  چه می توان گفت؟

$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 = +\infty$

$\lim_{n \rightarrow -\infty} n^3 = -\infty$



قضیه ۸ : اگر  $n$  عددی طبیعی باشد آن گاه

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty \end{array} \right\} \text{ (ب) اگر } n \text{ فرد باشد :}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^n = +\infty \text{ : (الف) اگر } n \text{ زوج باشد :}$$

قضیه ۹ : اگر  $l$  عددی حقیقی و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$  آن گاه

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \begin{cases} +\infty & \text{اگر } l \text{ مثبت باشد} \\ -\infty & \text{اگر } l \text{ منفی باشد} \end{cases}$$

تذکره : قضیه ۹ در حالتی که  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$  نیز به طریق مشابه برقرار است.

قضیه ۱۰ : اگر  $l$  عددی حقیقی و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$  آن گاه

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \begin{cases} +\infty & \text{اگر } l \text{ مثبت باشد} \\ -\infty & \text{اگر } l \text{ منفی باشد} \end{cases}$$

تذکره : قضیه ۱۰ در حالتی که  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$  نیز به طریق مشابه برقرار است.

مثال : حدود زیر را محاسبه کنید.

الف)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + x - 1)$       ب)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 - 2x - 5x^2)$

حل :

الف)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + x - 1) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(-2 + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3}\right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^3 = +\infty$

ب)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 - 2x - 5x^2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{3}{x^2} - \frac{2}{x} - 5\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^2 = -\infty$

به طور کلی حد هر چند جمله‌ای به صورت  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  در  $x \rightarrow \pm\infty$  از جمله‌ای از آن است که دارای بزرگ‌ترین درجه است یعنی :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$$

$$g(x) = b_n x^m + b_{n-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0$$

در کلاس

الف) اگر  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  و  $g(x) = b_n x^m + b_{n-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0$  دو چند جمله‌ای باشند نشان دهید.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^{n-m} + \dots}{b_n}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_n x^m + \dots + b_1 x + b_0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_n x^m} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n}{b_n} x^{n-m}$$

در هر یک از حالت‌های  $m = n$  و  $m < n$  و  $m > n$  حد قسمت قبل به چه صورت‌هایی نوشته می‌شود؟

i)  $m > n \rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

ii)  $m = n \rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_n}$

iii)  $m < n \rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$

به کمک نتیجه قسمت قبل حد‌های زیر را محاسبه کنید.

الف)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x^4 - 7x + 1}{2x^2 - x + 3} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x^2}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3}{2} = \pm\infty$

ب)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-3x^3 + x - 1}{4x^2 - 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-3x^3}{4x^2} = -\frac{3}{4}x = -\frac{1}{4}$


ب)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2 - x + 1}{3x^3 + 2x - 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2}{3x^3} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{3x} = 0$



### مجانب افقی

خط  $y = L$  را مجانب افقی نمودار  $y = f(x)$  می‌نامیم به شرطی که حداقل یکی از دو شرط  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$  برقرار باشد.

به عنوان مثال در هر یک از شکل‌های زیر خط  $y = 1$  مجانب افقی نمودارها است. چرا؟



مثال: مجانب‌های افقی و قائم تابع  $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$  را به دست آورید.


$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x-1}{x+1} = 2$$

حل: برای یافتن مجانب افقی کافی است حد تابع را در  $\pm\infty$  حساب کنیم داریم:

پس خط  $y = 2$  مجانب افقی تابع است.


$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2x-1}{x+1} = -\infty$$

این تابع دارای مجانب قائم نیز می‌باشد و خط  $x = -1$  مجانب قائم تابع است زیرا نمودار تابع به صورت زیر است.





۱ کدام یک از نمودار توابع زیر مجانب افقی دارد؟ آن را مشخص کنید.




الف مجانب افقی ندارد

ب  $y=2$  مجانب افقی

ج  $y=2$  مجانب افقی ندارد

توجه کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان



د مجانب افقی ندارد

ه  $y=2$  مجانب افقی

۲ مجانب های افقی و قائم تابع های زیر را در صورت وجود به دست آورید.

الف)  $f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}$

$y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x+1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{\infty} = 0$

مجاذب افقی  $y=0$

ب)  $g(x) = x^2$

$y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^2 = \pm\infty$

مجاذب افقی ندارد

ج)  $h(x) = \frac{x^2-1}{x+1}$

$y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2-1}{x+1} = \pm\infty$

مجاذب افقی ندارد



Gambe.com-Darsi

مفهوم

۱ مفهوم هر یک از گزاره‌های زیر را بیان کنید.

الف)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$

حرفی متغیر  $x$  برای هر مقدار قدری بزرگ  $M$  و هر  $\epsilon$  کوچک می‌شود.

ب)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 4$

حرفی متغیر  $x$  که هر قدر کوچکتر شود مقدار  $f(x)$  به  $4$  نزدیک می‌شود.

۲ برای تابع  $f$  که نمودار آن داده شده است موارد زیر را به دست آورید:

الف)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$

ب)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$


پ)  $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = +\infty$

ت)  $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$

ث)  $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty$

ج) مجانب‌های افقی و قائم

$\left\{ \begin{array}{l} \text{مجبانب قائم} \\ \text{مجبانب افقی} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = -1 \\ x = 3 \\ y = 1 \\ y = -1 \end{array} \right.$



توجه کنید:

گروه ریاضی منطقه دوم متوسطه، استان خوزستان

۳ حاصل حدود زیر را به دست آورید:

الف)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+5}{x-2}$

$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{n} = 3$

ب)  $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t^2+1}{t^3-2t^2+1}$

$= \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t^2}{t^3} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{1}{t} = 0$

پ)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x^7+2x}{4x+1}$

$= \lim_{\epsilon n} \frac{-\epsilon^7 n^7}{4\epsilon n} = -\infty$

ت)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 2x^2)$

$= \lim_{n \rightarrow -\infty} n^3 = -\infty$

۴ مجانب‌های افقی و قائم نمودارهای هر یک از توابع زیر را در صورت وجود به دست آورید:

الف)  $y = \frac{2x-1}{x-3}$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{مجبانب قائم} \\ \text{مجبانب افقی} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = 3 \\ y = 2 \end{array} \right.$

ب)  $y = \frac{x}{x^2-4}$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{مجبانب قائم} \\ \text{مجبانب افقی} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = 2, x = -2 \\ y = 0 \end{array} \right.$

پ)  $y = \frac{1+2x^2}{1-x^2}$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{مجبانب قائم} \\ \text{مجبانب افقی} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = 1, x = -1 \\ y = -1 \end{array} \right.$

ت)  $y = \frac{2x}{1+x^2}$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{مجبانب قائم} \\ \text{مجبانب افقی} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{ندارد} \\ y = 0 \end{array} \right.$

۵ نمودار تابع  $f$  را به گونه‌ای رسم کنید که همه شرایط زیر را دارا باشد:

الف)  $f(1) = f(-2) = 0$

ب)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$

پ) خط  $y = -1$  مجانب افقی آن باشد.



## حدهای نامتناهی

درس

در سال قبل با حد یک تابع در یک نقطه آشنا شدیم. دیدیم که  $l$  حد تابع  $f$  در نقطه  $a$  است هرگاه بتوانیم مقدارهای  $f(x)$  را به دلخواه (هر قدر که بخواهیم) به  $l$  نزدیک کنیم به شرطی که  $x$  را به اندازه کافی به  $a$  (از دو طرف  $a$ ) نزدیک کرده باشیم اما  $x$  برابر  $a$  نشده باشد در این درس با رفتار برخی دیگر از توابع در همسایگی محدوف یک نقطه آشنا می‌شویم.

### فعالیت



در سال قبل با نمودار تابع گویای  $f(x) = \frac{1}{x}$  آشنا شدیم می‌خواهیم رفتار این تابع را در همسایگی راست  $x = 0$  بررسی کنیم.

۱ جدول زیر رفتار تابع را به ازای برخی از مقادیر  $x$  نشان می دهد آن را تکمیل کنید.

$x$	$\times/1$	$\times/10$	$\times/100$	$\times/1000$	$\dots \rightarrow$
$f(x)$	۱۰	۱۰۰	۱۰۰۰	۱۰.۰۰۰	$\dots \rightarrow$ تعریف شده

۱ اگر بخواهیم  $f(x)$  را از یک میلیون بزرگ تر شود مقدار  $x$  از چه عددی باید کوچک تر شود؟ **یک میلیونیم (۱۰<sup>-۶</sup>)**

۱ وقتی  $x$  با مقادیر بزرگ تر از صفر به صفر نزدیک می شود آیا مقادیر تابع به عددی خاص نزدیک می شوند؟ چرا؟ **خیر**  
 وقتی  $x$  با مقادیر بزرگ تر از صفر به صفر نزدیک می شود مقادیر  $f(x)$  نسبتاً بزرگ می شوند  
 با توجه به این فعالیت مشاهده می شود که وقتی  $x$  با مقادیر بزرگ تر از صفر به صفر نزدیک می شود مقادیر  $f(x)$  بدون هیچ محدودیتی افزایش می یابد. به بیان دیگر می توانیم  $f(x)$  را از هر عدد مثبت دلخواهی در نظر بگیریم بزرگ تر کرد به شرطی که  $x$  را به اندازه کافی با مقادیر بزرگ تر از صفر، به صفر نزدیک کرد در این صورت می نویسیم:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = +\infty$

تذکر: این نماد نشان می دهد که حد فوق موجود نیست. چون مقدار تابع به عدد خاصی نزدیک نمی شود و مثبت بی نهایت فقط یک نماد است که نمایش می دهد مقدار تابع از هر عدد مثبتی می تواند بزرگ تر باشد.

کارد کلاس

برای تابع  $f(x) = \frac{1}{x}$

الف) جدول زیر را کامل کنید:

$x$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{10}$	$-\frac{1}{100}$	$-\frac{1}{1000}$	$-\frac{1}{10000}$	$\dots \rightarrow$
$f(x)$	۲	-۲	-۱۰	-۱۰۰	-۱۰۰۰	-۱۰۰۰۰	$\dots \rightarrow$ تعریف شده

ب) اگر بخواهیم مقدار  $f(x)$  از  $10^{-6}$  کوچک تر شود  $x$  باید چگونه انتخاب شود؟ **باید  $x < -10^6$**

ب) وقتی  $x$  از سمت چپ به صفر نزدیک شود  $f(x)$  چه تغییری می کند؟ **مقادیر  $f(x)$  نسبتاً بزرگ و منفی می شود**

اما به عدد خاصی نزدیک نمی شود

ت) در مورد  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$  چه می توان گفت؟

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$


با توجه به آنچه در فعالیت و کار در کلاس صفحہی قبل مشاهده شد تعریف زیر را می‌توان ارائه داد.

تعریف حدهای یک طرفه نامتناهی


فرض کنیم تابع  $f$  در یک همسایگی راست نقطه‌ای مانند  $a$  تعریف شده باشد در این صورت  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$  بدین معنی است که می‌توانیم  $f(x)$  را به دلخواه هر قدر بخواهیم از هر عدد مثبتی بزرگ‌تر کنیم به شرطی که  $x$  را از سمت راست به اندازه کافی به  $a$  نزدیک کرده باشیم.

همچنین فرض کنیم تابع  $f$  در یک همسایگی چپ نقطه‌ای مانند  $a$  تعریف شده باشد در این صورت  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$  بدین معنی است که می‌توانیم  $f(x)$  را به دلخواه هر قدر بخواهیم از هر عدد مثبتی بزرگ‌تر کنیم به شرطی که  $x$  را از سمت چپ به اندازه کافی به  $a$  نزدیک کرده باشیم.


تذکره: تعریف حدهای یک طرفه نامتناهی  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$  نیز مشابه تعاریف فوق است. توصیف حالت‌های مختلف حدهای یک طرفه نامتناهی در شکل‌های زیر آمده است.




$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$




$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$$



مثال: نمودار تابع  $f(x) = \frac{1}{x}$  در شکل روبه‌رو رسم شده

است می‌خواهیم رفتار تابع  $f$  را در همسایگی محذوف نقطه  $x = 0$

بررسی کنیم به جدول صفحہ بعد توجه کنید:

©

فصل سوم: جدهای نامتناهی - حد در بی نهایت ۴۸

$x$	$-0.5$	$-0.1$	$-0.01$	$-0.001$	$\dots \rightarrow$	$0$	$\leftarrow \dots$	$0.001$	$0.01$	$0.1$	$0.5$
$f(x)$	۲	۱۰	۱۰۰	۱۰۰۰	$\dots \rightarrow$	تعریف نشده	$\leftarrow \dots$	۱۰۰۰	۱۰۰	۱۰	۲

مشاهده می‌شود با نزدیک کردن  $x$  به اندازه کافی به صفر، مقدارهای  $f(x)$  را می‌توان به دلخواه بزرگ کرد بنابراین  $f(x)$  از هر عدد دلخواهی بزرگ‌تر می‌شود و در نتیجه مقدار حد تابع یک عدد خاصی نمی‌شود و حد متناهی ندارد. در اینجا می‌نویسیم

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x|} = +\infty$$

تعریف:

فرض کنید تابع  $f$  در همسایگی محذوف  $a$  تعریف شده باشد در این صورت  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$  یعنی اینکه می‌توانیم  $f(x)$  را به میزان دلخواه از هر عدد مثبت بزرگ‌تر کنیم به شرطی که  $x$  را به اندازه کافی به  $a$  نزدیک کرده باشیم.

تعریف مشابهی از حد در مورد تابع‌هایی که وقتی  $x$  به  $a$  نزدیک می‌شود مقدار تابع خیلی کوچک‌تر می‌شود در زیر وجود دارد.


تعریف:

فرض کنید تابع  $f$  در همسایگی محذوف  $a$  تعریف شده باشد در این صورت  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$  یعنی اینکه می‌توانیم مقدارهای  $f(x)$  را به میزان دلخواه از هر عدد منفی کوچک‌تر کنیم به شرطی که  $x$  را به اندازه کافی به  $a$  نزدیک کرده باشیم.

مثال: برای حد تابع  $f(x) = \frac{1}{x}$  در نقطه  $x = 0$  می‌توان گفت:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$


مثال: در مورد حد تابع  $f(x) = \frac{1}{|x|}$  در نقطه  $x = 0$  می‌توان گفت:  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{|x|} = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{|x|} = +\infty$

نمودار توابع  $f, g, h$  در شکل های زیر داده شده اند با توجه به آنها حدود خواسته شده را در صورت وجود به دست آورید.



$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$$


$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$$

توجه کننده!

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، امتحان خوزستان



$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} h(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} h(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{3\pi}{2})^-} h(x) = +\infty$$

خرواشدنی

بی نهایت مفهومی انتزاعی است که در رشته های مختلف ریاضیات با تغییرات مختلف به کار می رود و معمولاً به معنای «فراتر از هر مقدار» است و برای توصیف مقادیر بیش از هر عدد به کار می رود و نشانه آن در ریاضیات  $\infty$  می باشد.

این نماد به صورت چیزی است که محدود نیست و در آن هیچ محدودیت فضایی و زمانی وجود ندارد. در حسابان بی نهایت به معنای چیزی بی پایان است  $\infty \rightarrow \infty$  یعنی متغیر  $x$  فراتر از هر مقدار در نظر گرفته شده رشد می کند.

بی نهایت دارای دو مفهوم فیزیکی و ریاضی است که کاملاً با یکدیگر متفاوت اند مفهوم فیزیکی بی نهایت دارای تعریف دقیقی نیست و در جاهای مختلف برای شرایط متفاوت است. به عنوان مثال می گویم اگر جسم در کانون عدسی محدب قرار گیرد تصویر در بی نهایت تشکیل می شود. حال اگر دو عدسی با فواصل کانونی متفاوت در خط بگیریم و اجسامی را روی کانون این دو عدسی قرار دهیم. طبق قاعده تصاویر هر دو در بی نهایت تشکیل می شود. اما تصویر این دو دقیقاً در یک نقطه تشکیل نمی شود. یعنی بی نهایت برای این دو عدسی متفاوت است اما مفهوم بی نهایت در ریاضیات کاملاً متفاوت با بی نهایت فیزیکی است در ریاضیات می گویم «بی نهایت مفهومی است که از هر مقدار دیگر بیشتر است» این مفهوم دقیقاً همان مفهومی است که در «حد در بی نهایت» در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال در حد تابع می گویم  $x \rightarrow \infty$  یعنی اینکه  $x$  از هر عدد انتخاب شده ای بزرگتر باشد.



### برخی از قضایای حدهای بی نهایت

نقطه قضیه ۱: اگر  $n$  یک عدد طبیعی باشد، آن گاه:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^n} = \begin{cases} +\infty & n \text{ عددی زوج باشد،} \\ -\infty & n \text{ عددی فرد باشد.} \end{cases}$$

نقطه مثال: با توجه به قضیه فوق می توان نوشت:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^3} = -\infty$$

نقطه قضیه ۲: الف) اگر  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$  آن گاه  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$  و برعکس.

ب) اگر  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$  آن گاه  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$  و برعکس.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{|x-1|} = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{|x-1|} = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{|x-1|} = +\infty$$

### کلردر کلاس

با استفاده از نمودار توابع داده شده و همچنین فضایای بالا حاصل حدود زیر را بدست آورید.



نقطه قضیه ۱ (مزاحمت)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

ب)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$

الف)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$





قضیه ۳: اگر  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \neq 0$  و  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$  آن گاه:

الف) اگر  $L > 0$  و مقادیر  $g(x)$  در یک همسایگی محذوف  $a$  مثبت باشد، آن گاه  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$

ب) اگر  $L < 0$  و مقادیر  $g(x)$  در یک همسایگی محذوف  $a$  مثبت باشد، آن گاه  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$

پ) اگر  $L > 0$  و مقادیر  $g(x)$  در یک همسایگی محذوف  $a$  منفی باشد، آن گاه  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$

ت) اگر  $L < 0$  و مقادیر  $g(x)$  در یک همسایگی محذوف  $a$  منفی باشد، آن گاه  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$

تذکر: قضیه ۳ در حالتی که  $x \rightarrow a$  یا  $x \rightarrow a^-$  نیز برقرار است.

مثال: هزینه پاک‌سازی  $x$  درصد آلودگی‌های شهری و صنعتی از رودخانه‌ای به وسیله تابعی، با ضابطه  $f(x) = \frac{255x}{100-x}$  محاسبه می‌شود که در آن  $x$  درصد آلودگی و  $f(x)$  هزینه پاک‌سازی برحسب میلیون تومان است دامنه تابع  $[0, 100)$  می‌باشد. مثلاً برای هزینه  $20$  درصد از آلودگی‌های این رودخانه  $62,75$  میلیون تومان لازم است.

برای پاک‌سازی  $95$  درصد از آلودگی‌ها  $f(95) = 278,25$  و در نتیجه نزدیک به پنج میلیارد تومان برای این کار لازم است.

توجه به قضیه فوق داریم:  $\lim_{x \rightarrow 100^-} \frac{255x}{100-x} = +\infty$

و این بدان معنا است که با نزدیک شدن  $x$  به عدد  $100$  مقدار  $f(x)$  از هر عدد مثبت از پیش تعیین شده‌ای بزرگ‌تر خواهد شد. لذا نمی‌توان صد درصد آلودگی‌های رودخانه را پاک‌سازی کرد.



سد شهید عباسپور، آندیکا، خوزستان، کشور جمهوری اسلامی ایران

مثال: حاصل  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1}{4-x^2}$  را به دست آورید.

حل: از آنجا که  $4-x^2 = (2-x)(2+x)$  وقتی  $x$  در همسایگی جیب  $2$ ، باشد. مخارج کسر یا مقادیر مثبت به صفر میل می‌کنند.

از طرفی  $\lim_{x \rightarrow 2} x+1 = 3$  طبق بند الف) قضیه فوق  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1}{4-x^2} = +\infty$

مثال: حاصل  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-1}{\sin x}$  را به دست آورید.

حل: وقتی  $x$  در همسایگی راست صفر باشد حد صورت کسر برابر  $-1$  و حد مخرج کسر برابر صفر است و از آنجا که در

همسایگی راست صفر  $\sin x$  مقداری مثبت است. در نتیجه طبق بند (ب) قضیه فوق  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-1}{\sin x} = -\infty$

مثال: حاصل  $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x^2+x}{x^2+2x+1}$  را به دست آورید.

حل: از آنجا که حد فوق به صورت  $\frac{0}{0}$  در می‌آید و چون  $x \neq -1$  پس می‌توان صورت و مخرج کسر را بر  $x+1$  تقسیم کرد.

داریم:

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x^2+x}{x^2+2x+1} = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x(x+1)}{(x+1)^2} = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x}{x+1} = +\infty$$

### کاردرکلاس

جذهای زیر را محاسبه کنید.

الف)  $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1-x}{x+2} = \frac{1-2}{-2+2} = \frac{-1}{0^+} = +\infty$

ب)  $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{[x]-2}{x-2} = \frac{[2]-2}{2-2} = \frac{1-2}{0^-} = \frac{-1}{0^-} = +\infty$

ب)  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2-1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x+1)(x-1)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1} = \frac{1+1}{1-1} = \frac{2}{0^+} = +\infty$

قضیه ۴: اگر  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  و  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$  (و یا  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$ ) آنگاه  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

تذکر: قضیه فوق در حالتی که  $x \rightarrow a^+$  یا  $x \rightarrow a^-$  نیز برقرار است.

مثال: حاصل  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{x+1}{\tan x}$  را به دست آورید.

حل: در یکی از کار در کلاس‌های قبل به صورت شهودی دیده شد که:  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$  از طرفی

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{x+1}{\tan x} = 0 \quad \text{طبق قضیه فوق} \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (x+1) = \frac{\pi}{2} + 1$$

1. تابع  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  و  $g(x) = x + 1$  را در نظر بگیرید.

$$\lim_{n \rightarrow 0} f(n) = +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} g(n) = 0 + 1 = 1$$

الف) حاصل  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  را به دست آورید.

ب) تابع  $f+g$  را به صورت یک تابع گویا بنویسید و حاصل  $\lim_{x \rightarrow 0} (f+g)(x)$  را محاسبه کنید.

$$(f+g)(x) = \frac{1}{x^2} + (x+1) = \frac{x^2 + x^2 + 1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x^2 + 1}{x^2} = +\infty$$

ب) چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

2. تابع  $f \times g$  را به صورت یک تابع گویا بنویسید و حاصل  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \times g(x)$  را محاسبه کنید و ارتباط آن را با  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  بیان کنید.

$$(f \times g)(x) = \frac{1}{x^2} \times (x+1) = \frac{x+1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (f \times g)(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x^2} = \frac{1}{0^2} = +\infty$$

همان‌طور در فعالیت فوق مشاهده کردید به‌طور کلی قضیه زیر را می‌توان بیان کرد:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f \times g)(x) = -\infty$$

قضیه 5: اگر  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$  آن‌گاه:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = +\infty \quad \text{الف)}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = +\infty \quad \text{ب) اگر } L > 0 \text{ آن‌گاه}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = -\infty \quad \text{ب) اگر } L < 0 \text{ آن‌گاه}$$

تذکر: قضیه فوق برای حالتی که  $x \rightarrow a^+$  یا  $x \rightarrow a^-$  نیز برقرار است.

مثال: برای به دست آوردن حاصل  $\lim_{x \rightarrow 0} (2x + 1 + \frac{1}{x^2})$  از آنجا که  $\lim_{x \rightarrow 0} 2x + 1 = 1$  و  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$  با توجه به بند الف قضیه فوق حاصل حد برابر  $+\infty$  می‌شود.

مثال: حاصل  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin^2 x}{x^2}$  را به دست آورید.

حل: می‌توان نوشت  $\frac{x + \sin^2 x}{x^2} = \frac{x}{x^2} + \frac{\sin^2 x}{x^2}$  از طرفی  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} = 1$  و  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2} = +\infty$  با توجه به بند الف قضیه فوق حاصل حد برابر  $+\infty$  خواهد شد.

1- این قضیه در حالت  $L = 0$  در این کتاب بررسی نمی‌شود و در آزمونهای ها رعایت این مسئله الزامی است. همچنین حالت  $0 \cdot \infty$  در این کتاب مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.



اگر  $\lim_{n \rightarrow a} g(n) = L$  و  $\lim_{n \rightarrow a} f(n) = -\infty$  باشد

$\lim_{n \rightarrow a} (f+g)(n) = -\infty$

$\lim_{n \rightarrow a} (f \cdot g)(n) = -\infty$  اگر  $L > 0$  باشد

$\lim_{n \rightarrow a} (f \cdot g)(n) = +\infty$  اگر  $L < 0$  باشد

در در کلاس

توجه کنید:

قضیه ۵ را در حالتی که  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$  باز نویسی کنید.

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان



حاصل حدود زیر را به دست آورید در هر مرحله مشخص کنید از کدام قضیه استفاده کرده‌اید.

الف)  $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x+1}{x-1} = \frac{1+1}{-1-1} = \frac{2}{-2} = -1$       ب)  $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2+x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -1^-} (1 + \frac{1}{x}) = +\infty$

ب)  $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x+2}{x^2+4x+4} = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{n+2}{(n+2)^2} = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{1}{n+2} = \frac{1}{-2+2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$       ت)  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 - \cos 2x}{x} = \frac{2 - \cos(0)}{0^-} = \frac{2-1}{0^-} = \frac{1}{0^-} = -\infty$

مجاناب قائم  $= \lim_{n \rightarrow -2^+} \frac{1}{n+2} = \frac{1}{-2+2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$

به نمودارهای هر یک از توابع  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  و  $g(x) = \frac{1}{x}$  در اطراف نقطه صفر توجه کنید.



$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -\infty$  خط  $x = 0$  را در هر دو منحنی، مجاناب قائم نمودار می‌گویند.

تعریف:

خط  $x = a$  را مجاناب قائم نمودار تابع  $f(x)$  گویند هرگاه حداقل یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$


$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$




مثال: در هر یک از شکل های زیر خط  $x = a$  یک مجانب قائم منحنی داده شده است.




$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$$




$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$$




$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$

مثال: کدام یک از خطوط  $x = -1$  و  $x = 3$  مجانب های قائم تابع  $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 2x - 3}$  می باشند؟

حل: شرایط مجانب قائم را برای دو خط مذکور بررسی می کنیم.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 2x - 3} = -\infty$$

به علاوه از آنجا که  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$  می توانستیم بگوییم  $x = -1$  نیز مجانب قائم منحنی تابع  $f$  است از طرفی

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 2x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x-1)}{(x-3)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-1}{x+1} = \frac{1}{2}$$

خط  $x = 3$  شرایط مجانب قائم را ندارد. لذا منحنی تابع  $f$  فقط یک مجانب قائم به صورت  $x = -1$  دارد.

فصل سوم : جدهای ناستناهی - حد در بی نهایت

مثال : نمودار تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{x+1}{x^2+x}$  در نزدیکی مجانب قائم آن به چه صورتی می باشد؟

$$f(x) = \frac{x+1}{x(x^2+1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$$



پس خط  $x = 0$  مجانب قائم منحنی تابع است و در مجاورت این خط نمودار تابع به صورت روبه رو خواهد بود.

کاور کلاس

$$x^2 - x - 4 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = -2 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - x - 4} = \frac{9 - 9 + 2}{9 - 3 - 4} = \frac{2}{2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - x - 4} = \frac{4 + 6 + 2}{4 + 2 - 4} = \frac{12}{2} = 6$$

مجانب های قائم تابع  $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - x - 6}$  را در صورت وجود به دست آورید.

$x = 3$   
 $x = -2$

مجاور قائم  
 $\begin{cases} x = 3 \\ x = -2 \end{cases}$



سوال 1

الف)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{3+n^2} = \sqrt{3}$   
 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty^+$   
 ب)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3+n^2}}{n^2} = +\infty$

نهی کنده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان

تمرین

با استفاده از قضایای نامتناهی درستی حدهای زیر را نشان دهید.

الف)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3+x^2}}{x^2} = +\infty$

ب)  $\lim_{x \rightarrow -2} \left| \frac{5-x}{2+x} \right| = +\infty$

ب)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty$

$\lim_{n \rightarrow 2} (1) = 1$   
 $\lim_{n \rightarrow 2} (n-2)^2 = 0^+$   
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty$


$\lim_{x \rightarrow -2} \left| \frac{5-x}{2+x} \right| = +\infty$   
 $\lim_{x \rightarrow -2} |2-x| = \sqrt{\frac{5-(-2)}{2+(-2)}} = \sqrt{\frac{7}{0^+}} = +\infty$

حدهای زیر را محاسبه کنید

الف)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x}{x^2-4} = \frac{6}{9-4} = \frac{6}{5} = 1.2$   
 ب)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2+2x-1}{x^2+x-12} = \frac{9+6-1}{9+3-12} = \frac{14}{0^+} = +\infty$   
 ج)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+1}{9-x^2} = \frac{4}{9-9} = \frac{4}{0^+} = +\infty$



نمودار تابعی را رسم کنید که دامنه آن  $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$  بوده و دارای دو مجانب قائم باشد.



نمودار تابعی را رسم کنید که دامنه آن  $[-2, 2] - \{1\}$  بوده و دارای مجانب قائم باشد.

مجاانب‌های قائم توابع زیر را در صورت وجود به دست آورید.

الف)  $f(x) = \frac{2x-1}{3-x}$

ب)  $g(x) = \frac{x^2+x}{x^2-x}$

$x^2-x=0 \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=1 \end{cases}$  (مجاانب قائم است)

$x=3 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x-1}{3-x} = \frac{5}{0^+} = +\infty$

$\lim_{n \rightarrow 1} \frac{n^2+n}{n^2-n} = \frac{2}{0^+} = +\infty$


$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{n^2+n}{n^2-n} = \frac{1}{1} = 1$

$x=3$  مجانب قائم است

نمودار تابع  $f(x) = \frac{1}{x-|x|}$  در مجاورت مجانب قائم خود چگونه است؟

$x=0$  مجانب قائم است  
 $D_f = (-\infty, 0)$

کدام شکل زیر وضعیت نمودار تابع  $f(x) = \frac{x}{x^2-2x+1}$  را در همسایگی  $x=1$  نمایش می‌دهد؟ چرا؟




$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x^2-2x+1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{(x-1)^2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$   
 $\lim_{n \rightarrow 1} \frac{n}{n^2-2n+1} = \lim_{n \rightarrow 1} \frac{n}{(n-1)^2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$

## حد در بی نهایت

در درس قبل حدهای نامتناهی و مجانب‌های قائم یک منحنی را بررسی کردیم در آنجا مشاهده کردیم که با نزدیک شدن  $x$  به چه عددی  $f(x)$  به دلخواه بزرگ‌تر می‌شود.  
در این درس بررسی می‌کنیم که با دلخواه بزرگ شدن (تزدیک شدن)  $x$  مقادیر  $f(x)$  چه تغییری می‌کند؟ این مطلب در رسم نمودارها و برای بررسی رفتار شاخه‌های نمودار تابع بسیار مفید است.

## فعالیت



نمودار تابع  $f(x) = \frac{1}{x}$  را در بازه  $(0, +\infty)$

در نظر بگیرید.

۱ جدول زیر را کامل کنید.

$x$	۱	۲	۵	۱۰	۱۰۰	$10^2$	$10^5$	$10^6$
$f(x)$	۱	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{10^2}$	$\frac{1}{10^5}$	$\frac{1}{10^6}$

۲ اگر بخواهیم فاصله  $f(x)$  تا محور  $x$  ها از  $\frac{1}{5}$  کمتر شود  $x$  را باید حداقل از چه عددی بزرگ‌تر بگیریم؟

۳ اگر بخواهیم فاصله  $f(x)$  تا محور  $x$  ها از  $\frac{1}{10}$  کمتر شود  $x$  را باید حداقل از چه عددی بزرگ‌تر در نظر

بگیریم؟ ۱۰




۱ اگر بخواهیم فاصله  $f(x)$  تا محور  $x$  ها از  $\frac{1}{10}$  کوچک تر شود  $x$  را باید حداقل از چه عددی بزرگ تر در نظر بگیریم؟

۲ آیا فاصله  $f(x)$  تا محور  $x$  ها را می توان به هر میزان دلخواه کاهش داد؟ **پلم با آنتی ب گاهای بزرگ**

با توجه به نمودار تابع  $f(x) = \frac{1}{x}$  و جدول صفحه قبل می توان مشاهده کرد در صورتی که  $x$  به اندازه کافی بزرگ اختیار شود می توان  $f(x)$  را به اندازه دلخواه به صفر نزدیک کرد. در این صورت می گوئیم حد  $f(x)$  وقتی  $x$  به سمت مثبت بی نهایت میل کند

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \text{ می نویسیم}$$

### کاردر کلاس



نمودار تابع  $f(x) = \frac{1}{x}$  را در بازه  $(-\infty, 0)$  در نظر بگیرید.

۱ جدول زیر را کامل کنید.

$x$	-1	-2	-5	-10	-100	-10 <sup>2</sup>	-10 <sup>3</sup>	...
$f(x)$	-1	-1/2	-1/5	-1/10	-1/100	-1/10 <sup>2</sup>	-1/10 <sup>3</sup>	...

۲ اگر بخواهیم فاصله  $f(x)$  از محور  $x$  ها کمتر از  $\frac{1}{10}$  شود  $x$  را باید از چه عددی کوچک تر در نظر بگیریم؟

۳ اگر بخواهیم فاصله  $f(x)$  تا محور  $x$  ها از  $\frac{1}{100}$  کمتر شود  $x$  را باید از چه عددی کوچک تر در نظر بگیریم؟

با توجه به نمودار تابع  $f(x) = \frac{1}{x}$  و جدول بالا می توان مشاهده کرد اگر  $x$  به اندازه کافی کوچک تر (یعنی از هر عدد منفی

کوچک تر) شود آن گاه  $f(x)$  را می توان به اندازه دلخواه به صفر نزدیک کرد. در این صورت می نویسیم:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$



تذکره : منظور از  $x \rightarrow \pm\infty$  آن است که  $x \rightarrow +\infty$  یا  $x \rightarrow -\infty$  لذا با توجه به فعالیت و کار در کلاس صفحه قبل به طور خلاصه می‌توان نوشت :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$$


تعریف :

■ اگر تابع  $f(x)$  در بازه‌ای مانند  $(a, +\infty)$  تعریف شده باشد گوئیم حد  $f(x)$  وقتی  $x$  به سمت مثبت بی‌نهایت میل می‌کند برابر  $l$  است و می‌نویسیم  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$  هرگاه بتوان با اختیار  $x$  های به قدر کافی بزرگ، فاصله  $f(x)$  از  $l$  را به هر اندازه کوچک کرد.

■ اگر تابع  $f$  در بازه  $(-\infty, a)$  تعریف شده باشد. می‌گوئیم حد  $f(x)$  وقتی  $x$  به سمت منفی بی‌نهایت میل می‌کند برابر  $l$  است و می‌نویسیم  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$  هرگاه بتوان با اختیار  $x$  های به قدر کافی کوچک فاصله  $f(x)$  را از  $l$  به هر اندازه کوچک کرد.


### کاردر کلاس

با استفاده از نمودارهای  $f$  و  $g$  حدهای زیر را به دست آورید.



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -2$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

قضیه ۶: اگر  $a$  عددی حقیقی و  $n$  عددی طبیعی باشد آنگاه:

الف)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a}{x^n} = 0$

مثال: حاصل هر یک از حدود  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sqrt{x}}{x^2}$  و  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-5}{x^3}$  برابر صفر است.

قضیه ۷: اگر  $L_1$  و  $L_2$  اعداد حقیقی و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L_1$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = L_2$  آنگاه:

الف)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f \pm g)(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = L_1 \pm L_2$

ب)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = L_1 \cdot L_2$

پ)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)}{\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$  (با فرض  $L_2 \neq 0$ )

تذکر: قضیه فوق وقتی  $x$  به سمت  $-\infty$  میل می کند نیز برقرار است.

مثال: حدود زیر را محاسبه کنید.

الف)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 + \frac{5}{x^2})$

ب)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{3}{x^2}}{\frac{5}{x} + 4}$

حل:

الف) با استفاده از قسمت الف قضیه ۷ و سپس استفاده از قضیه ۶ می توان نوشت:


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 + \frac{5}{x^2}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x^2} = 3 + 0 = 3$$

ب) با استفاده از قسمت ب) قضیه ۷ و سپس استفاده از قضیه ۶ می توان نوشت:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{3}{x^2}}{\frac{5}{x} + 4} = \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} 2 + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x^2}}{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x} + \lim_{x \rightarrow -\infty} 4} = \frac{2 + 0}{0 + 4} = \frac{1}{2}$$

### حدهای نامتناهی در بی‌نهایت

در محاسبه حد توابع وقتی  $x$  به  $+\infty$  میل می‌کند، ممکن است، با بزرگ شدن مقادیر  $x$  مقدارهای  $f(x)$  به عدد خاصی نزدیک نشوند ولی مقادیر  $f(x)$  از هر عدد دلخواه مثبت بزرگ‌تر شوند همان‌طور که در نمودار توابع  $f(x) = x$  و  $g(x) = x^2$  در شکل زیر دیده می‌شود با افزایش مقادیر  $x$  مقادیر  $f(x)$  و  $g(x)$  از هر عدد دلخواه مثبتی بزرگ‌تر می‌شود.




همچنین با کوچک شدن مقادیر  $x$ ، مقادیر  $f(x)$  از هر عدد دلخواه منفی کوچک‌تر می‌شود، در نمودارهای بالا می‌توان مشاهده کرد که با کاهش مقادیر  $x$  مقادیر  $f(x)$  از هر عدد منفی دلخواه کوچک‌تر و مقادیر  $g(x)$  از هر عدد دلخواهی بزرگ‌تر می‌شود. در حالت کلی برای یک تابع  $f$  که در یک بازه  $(a, +\infty)$  تعریف شده است اگر با میل کردن  $x$  به سمت  $+\infty$  نیز به سمت

$+\infty$  میل کند می‌گوییم حد این تابع در  $+\infty$  برابر  $+\infty$  است و می‌نویسیم  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$$\text{برای مثال } \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

همچنین اگر با میل کردن  $x$  به سمت  $+\infty$ ،  $f(x)$  به سمت  $-\infty$  میل کند می‌گوییم حد این تابع در  $+\infty$  برابر  $-\infty$  است و می‌نویسیم

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ به عنوان مثال } \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^2 = -\infty$$



$\lim_{n \rightarrow -\infty} f(n) = +\infty$  یعنی کاهش مقدار  $n$  مقادیر  $f(n)$  از هر عدد (جزءه مثبتی بزرگتری) شود.  
 $\lim_{n \rightarrow -\infty} f(n) = -\infty$  یعنی کاهش مقدار  $n$  مقادیر  $f(n)$  از هر عدد (جزءه کوچکتری) شود.

کاردر کلاس

۱ مفاهیم  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  را بیان کنید.

۲ با توجه به نمودار توابع  $y = x^2$  و  $y = x$  حدود زیر را مشخص کنید.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$


$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$

توجه کنید:

گروه ریاضی سطح دوم متوسطه، استان خوزستان

فعالیت

تابع  $f(x) = x^3$  را با نمودار رویه رو در نظر بگیرید.



۱ جدول زیر را کامل کنید.

$x$	$\dots \leftarrow$	$-10^4$	$-10^3$	$-10^2$	$-10$	$1$	$10$	$100$	$1000$	$10^4$	$\rightarrow \dots$
$f(x)$	$\dots \leftarrow$	$-10^4$	$-10^3$	$-10^2$	$-10$	$1$	$1000$	$10^4$	$10^9$	$10^8$	$\rightarrow \dots$

۲ با افزایش (کاهش)  $x$ ، مقدار  $f(x)$  چه تغییری می کند؟ با افزایش (کاهش)  $f(x)$  افزایش (کاهش)  $x$  می پذیرد.

۳ در مورد حدهای  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3$  چه می توان گفت؟

$\lim_{n \rightarrow -\infty} n^3 = -\infty$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 = +\infty$



قضیه ۸ : اگر  $n$  عددی طبیعی باشد آن گاه

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty \end{array} \right\} \text{ب) اگر } n \text{ فرد باشد:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^n = +\infty \text{ : الف) اگر } n \text{ زوج باشد:}$$

قضیه ۹ : اگر  $l$  عددی حقیقی و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$  آن گاه

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \begin{cases} +\infty & \text{اگر } l \text{ مثبت باشد} \\ -\infty & \text{اگر } l \text{ منفی باشد} \end{cases}$$

تذکره : قضیه ۹ در حالتی که  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$  نیز به طریق مشابه برقرار است.

قضیه ۱۰ : اگر  $l$  عددی حقیقی و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$  آن گاه

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \begin{cases} +\infty & \text{اگر } l \text{ مثبت باشد} \\ -\infty & \text{اگر } l \text{ منفی باشد} \end{cases}$$

تذکره : قضیه ۱۰ در حالتی که  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$  نیز به طریق مشابه برقرار است.

مثال : حدود زیر را محاسبه کنید.

الف)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + x - 1)$       ب)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 - 2x - 5x^2)$

حل :

الف)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + x - 1) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(-2 + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3}\right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^3 = +\infty$

ب)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 - 2x - 5x^2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{3}{x^2} - \frac{2}{x} - 5\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^2 = -\infty$

به طور کلی حد هر چند جمله‌ای به صورت  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  در  $x \rightarrow \pm\infty$  از جمله‌ای از آن است که دارای بزرگ‌ترین درجه است یعنی :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$$

$$g(x) = b_n x^m + b_{n-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0$$

در کلاس

الف) اگر  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  و  $g(x) = b_n x^m + b_{n-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0$  دو چند جمله‌ای

باشند نشان دهید.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^{n-m}}{b_n x^{n-m}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_n x^m + \dots + b_1 x + b_0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_n x^m} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n}{b_n} x^{n-m}$$

در هر یک از حالت‌های  $m = n$  و  $m < n$  و  $m > n$  حد قسمت قبل به چه صورت‌هایی نوشته می‌شود؟

i)  $m > n \rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

ii)  $m = n \rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_n}$

iii)  $m < n \rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$

نهی کنه:

گروه ریاضی مفتح دوم متوسطه، استان خوزستان

به کمک نتیجه قسمت قبل حد‌های زیر را محاسبه کنید.

الف)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x^5 - 7x + 1}{2x^7 - x + 3} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x^5}{2x^7} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3}{2x^2} = 0$

ب)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-3x^3 + x - 1}{4x^3 - 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-3x^3}{4x^3} = -\frac{3}{4}$


ب)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2 - x + 1}{3x^3 + 2x - 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2}{3x^3} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{3x} = 0$



### مجانب افقی

خط  $y = L$  را مجانب افقی نمودار  $y = f(x)$  می‌نامیم به شرطی که حداقل یکی از دو شرط  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$  برقرار باشد.

به عنوان مثال در هر یک از شکل‌های زیر خط  $y = 1$  مجانب افقی نمودارها است. چرا؟



مثال: مجانب‌های افقی و قائم تابع  $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$  را به دست آورید.


$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x-1}{x+1} = 2$$

حل: برای یافتن مجانب افقی کافی است حد تابع را در  $\pm\infty$  حساب کنیم داریم:

پس خط  $y = 2$  مجانب افقی تابع است.


$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2x-1}{x+1} = -\infty$$

این تابع دارای مجانب قائم نیز می‌باشد و خط  $x = -1$  مجانب قائم تابع است زیرا نمودار تابع به صورت زیر است.





۱ کدام یک از نمودار توابع زیر مجانب افقی دارد؟ آن را مشخص کنید.




ب)  $y=2$  مجانب افقی ندارد

ب)  $y=2$  مجانب افقی

الف)  $y=2$  مجانب افقی ندارد

توجه کنید:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان



ب)  $y=2$  مجانب افقی ندارد

ت)  $y=2$  مجانب افقی

۲ مجانب های افقی و قائم تابع های زیر را در صورت وجود به دست آورید.

الف)  $f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}$

$$y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x+1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$$

مجاوب افقی  $y=0$

ب)  $g(x) = x^2$

$$y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^2 = \pm\infty$$

مجاوب افقی ندارد

ج)  $h(x) = \frac{x^2-1}{x+1}$

$$y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2-1}{x+1} = \pm\infty$$

مجاوب افقی ندارد



۱ مفهوم هر یک از گزاره‌های زیر را بیان کنید.


الف)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$

حرفه متدیر  $\infty$  برآورد متدیر  $\infty$  بکورد  $2$  نزدیک می‌شود.

ب)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 4$

حرفه متدیر  $\infty$  برآورد متدیر  $\infty$  بکورد  $4$  نزدیک می‌شود.

۲ برای تابع  $f$  که نمودار آن داده شده است موارد زیر را به دست آورید :



توجه کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان

الف)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$

ب)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$

پ)  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$

ت)  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$

ث)  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$

ج) مجانب‌های افقی و قائم

$\left\{ \begin{array}{l} x = 2 \text{ قائم} \\ y = 1 \text{ افقی} \end{array} \right.$

۳ حاصل حدود زیر را به دست آورید :

الف)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+5}{x-2}$

$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{n} = 3$

ب)  $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t^2+1}{t^3-2t^2+1}$

$= \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t^2}{t^3} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{1}{t} = 0$

پ)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x^7+x}{4x+1}$

$= \lim_{\epsilon n} \frac{-\epsilon^7 n^7 + \epsilon n}{4\epsilon n} = -\infty$

ت)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 2x^2)$

$= \lim_{n \rightarrow -\infty} n^3 = -\infty$

۴ مجانب‌های افقی و قائم نمودارهای هر یک از توابع زیر را در صورت وجود به دست آورید :

الف)  $y = \frac{2x-1}{x-3}$

$\left\{ \begin{array}{l} x = 3 \text{ قائم} \\ y = 2 \text{ افقی} \end{array} \right.$

ب)  $y = \frac{x}{x^2-4}$

$\left\{ \begin{array}{l} x = 2, x = -2 \text{ قائم} \\ y = 0 \text{ افقی} \end{array} \right.$

پ)  $y = \frac{1+2x^2}{1-x^2}$

$\left\{ \begin{array}{l} x = 1, x = -1 \text{ قائم} \\ y = 0 \text{ افقی} \end{array} \right.$

ت)  $y = \frac{2x}{1+x^2}$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{مجاذب قائم ندارد} \\ y = 0 \text{ افقی} \end{array} \right.$

۵ نمودار تابع  $f$  را به گونه‌ای رسم کنید که همه شرایط زیر را دارا باشد :

الف)  $f(1) = f(-2) = 0$

ب)  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$  ,  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$

پ) خط  $y = -1$  مجانب افقی آن باشد.



## مشتق

- ۱ آشنایی با مفهوم مشتق
- ۲ مشتق پذیری و پیوستگی
- ۳ آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه‌ای تغییر

## فصل



ماهواره در سیمرغ پایگاه فضایی امام خمینی (ره)

مفهوم مشتق به مسئله تاریخی خط مماس در یک نقطه از منحنی و مسئله یافتن سرعت لحظه‌ای یک جسم مربوط می‌شود. امروزه مشتق در علوم مختلف کاربردهای وسیع و گسترده‌ای دارد. به‌طور مثال در صنایع فضایی، مسائلی نظیر کمینه‌سازی سوخت مصرفی، بیشینه‌سازی سرعت و کمینه‌سازی زمان سفر با مفهوم مشتق ارتباط دارند.


# آشنایی با مفهوم مشتق




مشتق یکی از مفاهیم اساسی ریاضی است که دارای کاربردهای وسیع در ریاضیات و علوم دیگر است. ایده اولیه در مورد مفهوم مشتق، به شیب یک خط مربوط می‌شود. به کمک این ایده به تدریج به صورت دقیق‌تری با مفهوم مشتق آشنا می‌شویم.

1 شیب هر یک از خط‌های داده شده را به دست آورید و مشخص کنید که کدام یک مثبت و کدام یک منفی است؟

$A|_0^2, B|_2^3$   
 $m = \frac{2-0}{2-(-1)} = \frac{2}{3}$   
 شیب خط  $> 0$





$A|_2^0, B|_0^{-2}$   
 $m = \frac{0-2}{0-(-2)} = \frac{-2}{2} = -1$   
 شیب خط  $< 0$



خط	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_4$
شیب	$\frac{2}{5}$	$-2$	$2$	$-\frac{2}{3}$

2 با توجه به جدول رویه‌رو، نمودار مربوط خط‌های  $d_1, d_2, d_3, d_4$  را روی شکل مشخص کنید.




توجه کننده:  
 گروه ریاضی اطلاع دوم متوسطه، استان خوزستان

$A|_{-1}^{-1}, C|_0^0 \rightarrow m = \frac{0-(-1)}{0-(-1)} = 1 = md_3$   
 $B|_0^{-3}, D|_{-3}^0 \rightarrow m = \frac{-3}{3} = -1 = md_4$

$D|_0^{-2}, E|_2^3 \rightarrow m = \frac{3}{5} = md_1$   
 $G|_0^1, F|_1^{-2} \rightarrow m = \frac{-2}{-1} = 2 = md_2$

## خط مماس بر یک منحنی




یافتن خط مماس در یک نقطه از یک منحنی مسئله‌ای تاریخی است که زمانی طولانی برای حل آن صرف شده است. مفهوم خط مماس بر یک دایره از زمان‌های گذشته مشخص بوده است. خط مماس بر دایره، خطی است که با دایره یک و فقط یک نقطه مشترک داشته باشد. این تعریف در حالت کلی برای همه منحنی‌ها صادق نیست.

## خواندنی

از نظر تاریخی مسئله یافتن خط مماس در یک نقطه از یک منحنی، برای اولین بار در اوایل قرن هفدهم میلادی زمانی مطرح شد که فرما ریاضی‌دان فرانسوی اقدام به تعین ماکزیمم‌ها و مینیمم‌های چند تابع خاص کرد. فرما دریافت که خطوط مماس، در نقاطی که منحنی ماکزیمم یا مینیمم دارد باید افقی باشند. از این رو به نظرس رسیده که مسئله تعیین نقاط ماکزیمم یا مینیمم به حل مسئله دیگر، یعنی یافتن مماس‌های افقی مربوط می‌شود. تلاش برای حل این مسئله کلی‌تر بود که فرما را به کشف برخی از ایده‌های مقدماتی مفهوم «مشتق» هدایت کرد. مفهوم مشتق به شکل امروزی آن نخستین بار در سال ۱۳۶۶ میلادی، توسط نیوتن و به فاصله چند سال بعد از او توسط لایب‌نیتس، مستقل از یکدیگر پدید آمد. شیوه نیوتن مبتنی بر دیدگاه فیزیکی بود و از مشتق برای به دست آوردن سرعت لحظه‌ای استفاده کرد، اما لایب‌نیتس با دیدگاهی هندسی از مشتق برای به دست آوردن شیب خط مماس در منحنی‌ها استفاده کرد.


خط‌های  $d_1$  تا  $d_4$  را در نظر بگیرید. خط  $d_1$  در نقطه  $A$ ، خط  $d_2$  در نقطه  $B$  و خط  $d_3$  در نقاط  $A$  و  $B$  بر منحنی مماس هستند. خط  $d_4$  در نقطه  $A$  بر منحنی مماس نیست. همچنین خطوط  $d_2$  و  $d_3$  در نقطه  $C$  بر منحنی مماس نیستند. در ادامه این درس با دلایل این امر به صورت دقیق‌تری آشنا خواهید شد.



اکنون سعی می‌کنیم که به کمک نمودار منحنی، خط مماس بر منحنی در یک نقطه را بررسی کنیم. نقطه ثابت  $A$  را روی منحنی زیر در نظر می‌گیریم. خطی که از  $A$  و  $B$  می‌گذرد یک خط قاطع نامیده می‌شود. روی منحنی نقطه‌های دیگری را نزدیک‌تر به نقطه  $A$  اختیار می‌کنیم و خط‌های گذرنده از  $A$  و آن نقطه‌ها را رسم می‌کنیم. حدس بزنید که وقتی نقاط به قدر کافی به  $A$  نزدیک می‌شوند، برای خط‌های قاطع چه اتفاقی می‌افتد؟ به عبارت دیگر خط‌های قاطع به چه خطی نزدیک می‌شوند؟ **خط مماس**

اکنون نقطه  $C$  را سمت چپ نقطه  $A$  اختیار می‌کنیم و خط قاطع  $AC$  را رسم می‌کنیم. مانند قبل نقاط دیگری را نزدیک‌تر به نقطه  $A$  اختیار می‌کنیم. حدس می‌زنید برای خط‌های قاطع چه اتفاقی می‌افتد؟ به طور شهودی می‌توان گفت: **به خط مماس نزدیک می‌شوند.**

شیب خط مماس بر منحنی در نقطه  $A$  حد شیب خط‌های قاطع گذرنده از  $A$  است به شرطی که نقطه‌ها به قدر کافی به  $A$  نزدیک شوند.



تهیه کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان

در ادامه این بحث را دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد.

الف) تابع  $f(x) = -x^2 + 1$  داده شده است، اگر  $0 \leq x \leq 1$  نقاط  $A(2, f(2))$ ،  $B(4, f(4))$ ،  $C(5, f(5))$ ،  $D(4, f(4))$  و  $E(3, f(3))$  را روی منحنی در نظر می‌گیریم. شیب خطی که از نقاط  $A$  و  $B$  می‌گذرد یعنی  $m_{AB}$  از دستور زیر به دست می‌آید:

$$m_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{f(4) - f(2)}{4 - 2} = \frac{24 - 16}{4} = \frac{8}{4} = 2$$


$$A | \frac{2}{16} \quad B | \frac{4}{24} \quad C | \frac{5}{25} \quad D | \frac{4}{24} \quad E | \frac{3}{21}$$

به همین روش  $m_{AD}$  و  $m_{AC}$  و  $m_{AE}$  را به دست آورید.

$$m_{AC} = \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} = \frac{25 - 16}{5 - 2} = 3$$

$$m_{AD} = \frac{y_D - y_A}{x_D - x_A} = \frac{24 - 16}{4 - 2} = 4$$

$$m_{AE} = \frac{y_E - y_A}{x_E - x_A} = \frac{21 - 16}{3 - 2} = 5$$



تهیه کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان

همان طور که می دانید برای محاسبه شیب خط  $AB$  نسبت تغییر عمودی را به تغییر افقی به دست می آوریم. اگر این تغییرات را به ترتیب با  $\Delta y$  و  $\Delta x$  نمایش دهیم، داریم:

$$m_{AB} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$


در هنگام محاسبه شیب های بالا، توضیح دهید که  $\Delta x$  ها چگونه تغییر می کنند؟

$[2, 6]$     ۲ ————— ۶     $\Delta x = 6 - 2 = 4$      $\Delta y = 24 - 16 = 8$

$[2, 5]$     ۲ ————— ۵     $\Delta x = 5 - 2 = 3$      $\Delta y = 25 - 16 = 9$

$[2, 4]$     ۲ ————— ۴     $\Delta x = 4 - 2 = 2$      $\Delta y = 24 - 16 = 8$


$[2, 3]$     ۲ ————— ۳     $\Delta x = 3 - 2 = 1$      $\Delta y = 21 - 16 = 5$



$$m_{AF} = \frac{f(2/5) - f(2)}{2/5 - 2}$$

$$= \frac{18/75 - 16}{-1/5}$$

$$= \frac{2/75}{-1/5} = 5/5$$



$$m_{AG} = \frac{f(2/4) - f(2)}{2/4 - 2}$$

$$= \frac{18,25 - 16}{2,5 - 2} = \frac{2,25}{0,5}$$

$$= 5,225$$

ب) حال فرض کنید که با ادامه روندی که در قسمت (الف) اختیار کردیم، نقاط بسطی را نزدیک به  $A$  انتخاب کنیم. شیب خطوط به دست آمده به شیب خط مماس بر منحنی در نقطه  $A$  نزدیک می‌شود. برای درک بهتر این موضوع، منحنی رسم شده است. در ادامه نمودار تابع در بازه  $[2, 2/4]$  رسم شده است.

اگر به همین ترتیب بازه‌های کوچک‌تری در نظر بگیریم، شیب خطوط به دست آمده به شیب خط مماس بر منحنی در نقطه  $A$  نزدیک می‌شود. برای درک بهتر این موضوع، با تکمیل جدول و مناسبت شیب خط‌های قاطع، شیب خط مماس را حدس بزنید.

شیب خطی که از نقاط  $(a, f(a))$  و  $(b, f(b))$  می‌گذرد بازه  $[a, b]$

$$[2, 2/4] \quad \frac{f(2/4) - f(2)}{2/4 - 2} = \frac{18,25 - 16}{2,5 - 2} = \frac{2,25}{0,5} = 5/6$$

$$[2, 2/3] \quad \frac{f(2/3) - f(2)}{2/3 - 2} = \frac{17,75 - 16}{2,3 - 2} = \frac{1,75}{0,3} = 5,833$$

$$[2, 2/2] \quad \frac{f(2/2) - f(2)}{2/2 - 2} = \frac{17/16 - 16}{-1/2} = \frac{1/16}{-1/2} = 5/8$$

$$[2, 2/1] \quad \frac{f(2/1) - f(2)}{2/1 - 2} = \frac{16/59 - 16}{-1} = \frac{-1/59}{-1} = 5/9$$

$$[2, 2/0.1] \quad \frac{f(2/0.1) - f(2)}{2/0.1 - 2} = \frac{16/0.599 - 16}{-0.1} = \frac{-1/599}{-0.1} = 5/99$$

$$[2, 2/0.01] \quad \frac{f(2/0.01) - f(2)}{2/0.01 - 2} = \frac{16/0.5999 - 16}{-0.01} = \frac{-1/5999}{-0.01} = 5/999$$

$$\vdots$$

$$[2, 2+h] \quad \frac{f(2+h) - f(2)}{h} \longrightarrow ?$$

$h$  یک عدد خیلی کوچک و مثبت است.

معادله به دست آمده به  $h$  نزدیک می‌شوند.



اگر بخواهیم دقیق‌تر صحبت کنیم، باید در مورد مقادیر عبارت  $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$  وقتی  $h$  به قدر کافی نزدیک به صفر (و مثبت) است، بررسی کنیم. روند بالا این حدس را تقویت می‌کند که هر چقدر که بخواهیم می‌توانیم این مقادیر را به عدد ۶ نزدیک کنیم مشروط بر آنکه  $h$  را به قدر کافی نزدیک به صفر (و مثبت) اختیار کنیم. به عبارت دیگر حدس می‌زنیم که:  $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 6$  کافی است با محاسبه مقدار حد، صحت حدس خود را بررسی کنیم:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-(x+h)^2 + 1 \cdot (x+h) - 16}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-(h^2 + 2h + 4) + 20 + 1 \cdot h - 16}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h^2 - 2h - 4 + 20 + 1 \cdot h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h^2 - h + 16}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h(-h + 16)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} (-h + 16) = 16$$

به طریق مشابه می‌توان دید که اگر نقاط روی منحنی را در سمت چپ  $A$  اختیار کنیم، به عبارت دیگر اگر بازه‌هایی مانند،  $[1/5, 2]$ ،  $[1/6, 2]$ ،  $[1/7, 2]$ ،  $[1/8, 2]$  و ... را در نظر بگیریم شیب خط‌های قاطع برابر با  $6/5$ ،  $6/4$ ،  $6/3$ ،  $6/2$ ، ... خواهد شد. به عبارت دیگر در این حالت هم شیب خط‌های قاطع به هر اندازه که بخواهیم به عدد ۶ نزدیک می‌شوند، مشروط بر آنکه  $h$  به قدر کافی از سمت چپ به صفر نزدیک شود، یعنی داریم:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 6$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 6$$

بنابراین به طور کلی می‌توان نوشت:

شیب خط مماس بر منحنی  $f$  در نقطه  $A(a, f(a))$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\text{شیب خط مماس بر منحنی در نقطه } A = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

به شرط آنکه این حد موجود و منتهایی باشد.

حد بالا را (در صورت وجود) مشتق تابع  $f$  در نقطه  $a$  می‌نامند و با  $f'(a)$  نمایش می‌دهند، یعنی:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

حد مذکور را شیب منحنی در  $a$  نیز می‌نامند.

تهیه کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان

$$f(3) = -(3)^2 + 10(3) = -9 + 30 = 21$$

بنابراین در مثال قبل داریم  $f'(2) = 6$ . در ادامه  $f'(3)$  برای  $f(x) = -x^2 + 10x$  محاسبه شده است:

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(3+h)^2 + 10(3+h) - 21}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-9 - 6h - h^2 + 30 + 10h - 21}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h^2 + 4h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (-h + 4) = 4$$

مثال: معادله خط مماس بر منحنی تابع  $f(x) = -x^2 + 10x$  را در نقطه  $A(2, f(2))$  واقع بر نمودار تابع بنویسید.

$$A(2, f(2)) = (2, 16)$$

حل: با توجه به آنچه که در فعالیت قبل مشاهده شد:

$$f'(2) = 6$$

$$y - 16 = 6(x - 2) \Rightarrow y = 6x + 4$$

کارد کلاس

$$f(-2) = (-2)^2 + 3 = 7$$

معادله خط مماس بر منحنی تابع  $y = x^2 + 3$  را در نقطه‌ای به طول  $-2$  بنویسید.

$$f'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2+h) - f(-2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(-2+h)^2 + 3 - 7}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 - 4h + h^2 + 3 - 7}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 - 4h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h - 4) = -4$$

تذکره: با نمادهای معرفی شده در فعالیت در مورد شیب خطهای قاطع می‌توان دستورهای معادل دیگری برای محاسبه

مشق در یک نقطه به دست آورد. به طور مثال شیب خطی که از نقاط  $A$  و  $B$  می‌گذرد برابر است با:

$$m_{AB} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

و از آنجا:


مثال: اگر  $f'(2)$ ،  $f(x) = -x^2 + 10x$  را از دستور بالا به دست آورید:

$$f'(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-(2 + \Delta x)^2 + 10(2 + \Delta x) - 16}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-4 - 4\Delta x - \Delta x^2 + 20 + 10\Delta x - 16}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-\Delta x^2 + 6\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x(-\Delta x + 6)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (-\Delta x + 6) = 6$$

### محاسبه $f'(a)$ به روش دیگر

مشق تابع  $f$  در نقطه  $x = a$  به صورت:  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  تعریف شد. اکنون دستور دیگری برای مشتق تابع  $f$  در

نقطه  $x = a$  می‌یابیم که در برخی محاسبات کار را ساده‌تر می‌کند.



با استفاده از نموداری مشابه نمودار (الف) برای محاسبه مشتق  $f$  در  $a$  داریم:

$$AB \text{ خط شیب} = m_{AB} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$A \text{ در منحنی در } A \text{ شیب خط مماس بر منحنی در } A = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

با استفاده از نمودار (ب) راه دیگر محاسبه شیب خط مماس این است که نقطه دلخواه  $B$  را به مختصات  $(x, f(x))$  در نظر بگیریم در این صورت داریم:

$$AB \text{ خط شیب} = m_{AB} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

برای محاسبه شیب خط مماس کافی است که  $x$  را مرتباً به  $a$  نزدیک کنیم. در این صورت شیب خط مماس برابر با  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  است مشروط بر اینکه این حد موجود باشد (واضح است که مانند قبل  $x$  باید از راست و چپ به قدر کافی به

$$a \text{ نزدیک شود). به عبارت دیگر: } f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

**تهیه کننده:**

**گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان**

مثال: اگر  $f(x) = x^2$ ،  $f'(3)$  را به دو روش به دست آورید.

حل:

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(h+3)^2 - 9}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 6h + 9 - 9}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 6h}{h}$$

روش اول:

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h+6)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h+6) = 6$$

$$f'(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x+3) = 6$$

روش دوم:

$$f(x) = -x^2 + 10x = 19 \quad f'(x) = \lim_{n \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{n - 1} = \lim_{n \rightarrow 1} \frac{-x^2 + 10x - 9}{x - 1} = \lim_{n \rightarrow 1} \frac{-(n-2)(n-1)}{n-1} = -2$$

$$f(5) = -(5)^2 + 10(5) = 25 \quad f'(5) = \lim_{n \rightarrow 5} \frac{f(x) - f(5)}{n - 5} = \lim_{n \rightarrow 5} \frac{-x^2 + 10x - 25}{x - 5} = \lim_{n \rightarrow 5} \frac{-(n-5)^2}{n-5} = 0$$

در موقعیت‌های مختلف، ممکن است یکی از این دو روش بر دیگری به دلیل ساده‌تر بودن محاسبات برتری داشته باشد. معادل بودن این دو روش را به شیوه هندسی ملاحظه نمودید. در کار در کلاس بعد به شیوه جبری نیز معادل بودن دو روش بالا را بررسی کنید.

کار در کلاس

اگر  $f'(a)$  موجود باشد، ثابت کنید.


$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

اگر قرار دهیم  $a+h = x$  پس  $h = x-a$  و حال آنکه  $h \rightarrow 0$  پس  $x-a \rightarrow 0$  پس  $x \rightarrow a$  و لذا

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

راه‌نمایی: تغییر متغیر  $a+h = x$  را به کار ببرید. توجه کنید وقتی که  $h \rightarrow 0$  آنگاه  $x \rightarrow a$

کار در کلاس



رابطه  $A, E, D$  و  $B, C, F$  نسبت مثبت و در صورت  $F, G$  و  $A, B$  نسبت منفی است.

الف) برای تابع  $f(x) = -x^2 + 10x$ ،  $f'(4)$  و  $f'(5)$  را حساب کنید.

ب) دو نقطه روی منحنی مشخص کنید که مقدار مشتق تابع در آنها قرینه یکدیگر باشد.  $A, F$

پ) به کمک شکل توضیح دهید که تابع در چه نقاطی دارای مشتق مثبت و در چه نقاطی مشتق منفی است.

ت) بدون محاسبه و تنها به کمک نمودار، شیب خط‌های مماس بر منحنی در نقاط 3 و 4 را با هم مقایسه کنید  $m_E > m_D \Rightarrow f'(3) > f'(4)$

ث) با محاسبه  $f'(3)$  و  $f'(4)$  صحت حدس خود را بررسی نمایید.

$$f'(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \dots = 4$$

$$f'(4) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - f(4)}{x - 4} = \dots = 2$$

لذا  $f'(3) > f'(4)$

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 2x + 1 - 9}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 2x - 8}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(3x+4)}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} (3x + 4) = 10$$

فصل چهارم: مشتق ۸۱

$$y - 9 = 10(x - 2)$$


$$y - 9 = 10x - 20 \rightarrow y = 10x - 11$$

معادله خط مماس


۱ اگر  $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ ،  $f'(2)$  را به دست آورید و معادله خط مماس بر منحنی  $f$  را در نقطه‌ای به طول ۲ واقع بر آن بنویسید.

۲ نقاط داده شده روی منحنی زیر را با شیب‌های ارائه شده در جدول نظیر کنید.

شیب	نقطه
-۳	E
-۱	C
۰	E
۱	A
۱	B
۲	D



۳ برای نمودار  $y = f(x)$  در شکل زیر شیب‌های داده شده از «الف» تا «ج» را از کوچک‌ترین به بزرگ‌ترین مرتب کنید.



الف) شیب نمودار در نقطه A  $m_1$

ب) شیب نمودار در نقطه B  $m_2$

پ) شیب نمودار در نقطه C  $m_3$

ت) شیب خط AB  $m_4$

ث) شیب خط  $y=2$   $m_5 = 0$


ج) شیب خط  $y=x$   $m_6 = 1$

شیب‌های داده شده از «الف» تا «ج» را به ترتیب  $m_6, \dots, m_2, m_1$  در نظر بگیرید.

تهیه کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان

۴ با در نظر گرفتن نمودار  $f$  در شکل، نقاط به طول‌های  $a, b, c, d, e$  را با مشتق‌های داده شده در جدول نظیر کنید.



$x$	$f'(x)$
a	۰
b	۰/۵
c	۲
d	-۰/۵
e	-۲

۵ نقاطی مانند  $A, B, C, D, E, F, G$  را روی نمودار  $y = f(x)$  مشخص کنید به طوری که:

الف) نقطه‌ای روی نمودار است که شیب خط مماس بر نمودار در آن منفی است.


ب) نقطه‌ای روی نمودار تابع است که مقدار تابع و مقدار مشتق در آن منفی است.

ج) نقطه‌ای روی نمودار است که مقدار تابع در آنجا صفر است ولی مقدار مشتق در آن مثبت است.

د) نقطه‌ای روی منحنی است که مشتق در آنجا صفر است.

ه) نقاط  $E$  و  $F$  نقاط متفاوتی روی منحنی هستند که مشتق یکسان دارند.

و) نقطه‌ای روی منحنی است که مقدار تابع در آنجا مثبت ولی مقدار مشتق منفی است.



$f(-1) = -3$

$f'(-1) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x + 3 - (-3)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x + 6}{x + 1}$

اگر  $f(x) = x^2 - 2x + 3$  را به دست آورید.

$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2 - x + 1)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - x + 1) = 3$

۶ نقاط  $A, B, C, D, E, F$  را روی منحنی روبه‌رو در نظر می‌گیریم. در مورد شیب منحنی در این نقاط کدام گزاره درست و کدام یک نادرست است؟

الف) شیب منحنی در همه این نقاط مثبت است. **درست**

ب)  $m_A < m_B$  (شیب خط مماس بر منحنی در نقطه  $A$  را با  $m_A$  نمایش داده‌ایم) **درست**

ج)  $m_E < m_B < m_A$  **درست**

د) شیب منحنی در نقاط  $C$  و  $D, F$  منفی است. **درست**

ه)  $m_C < m_D < m_F$  **درست**

و)  $m_C < m_D < m_F < m_E < m_B < m_A$  **درست**



تهیه کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان




۸ برای تابع  $f$  در شکل زیر داریم:  $f'(4) = 1/5$  و  $f(4) = 25$  با توجه به شکل مختصات نقاط  $A$ ,  $B$ ,  $C$  را بیابید.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(B) - f(A)}{x_B - x_A} = \frac{f(C) - f(A)}{x_C - x_A} = f'(A)$$

$$\Rightarrow \frac{f(B) - 25}{1} = \frac{f(C) - 25}{-1} = 1/5$$

$$f(B) = 25/5 \rightarrow B(5, 25/5)$$

$$f(C) = 23/5 \rightarrow C(3, 23/5)$$



۹ در هر ثانیه علی  $z$  متر با دو جرخه و رضا  $s$  متر با پای پیاده طی می کنند، به طوری که  $z > s$ . در یک زمان داده شده، چگونه

می توان مسافت طی شده توسط رضا و علی را مقایسه کرد؟

الف) علی  $z - s$  متر بیش از رضا مسافت طی خواهد کرد.

ب) علی  $s$  متر بیش از رضا مسافت طی خواهد کرد.

پ) علی  $z/s$  متر بیش از رضا مسافت طی خواهد کرد.


ت) علی  $z \cdot s$  برابر رضا مسافت طی خواهد کرد.

ث) علی  $z/s$  برابر رضا مسافت طی خواهد کرد.

علی	۱	۲	۳	$n$
رضا	$s$	$2s$	$3s$	$ns$
علی	$z$	$2z$	$3z$	$nz$

لذا  $\frac{z}{s}$  ثابت است. پس هر چه  $z$  بزرگتر شود،  $\frac{z}{s}$  بزرگتر می شود.

علی  $\frac{z}{s}$  برابر رضا مسافت طی خواهد کرد.



## مشتق پذیری و پیوستگی

درس


در درس گذشته مشتق تابع  $f$  در نقطه‌ای به طول  $x$  به یکی از دو صورت زیر تعریف شد:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \text{یا} \quad f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

در صورت وجود حد (متناهی) فوق گفته می‌شود که  $f$  در  $x$  مشتق پذیر است. در مطالعه رفتار یک تابع مشخص کردن نقاطی که تابع در آن نقاط مشتق پذیر نیست دارای اهمیت است. در فعالیت زیر با یکی از حالت‌هایی که یک تابع در آن مشتق پذیر نیست آشنا می‌شوید.

فعالیت

نمودار تابع  $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \neq 2 \\ 1 & x = 2 \end{cases}$  (شکل مقابل) را در نظر می‌گیریم:



الف) چگونه به کمک نمودار تابع و تعریف مشتق به عنوان شیب خط مماس می‌توانید استدلال کنید که  $f'(2)$  وجود ندارد؟

زیرا شیب خط‌ها مایع که از نقطه  $x=2$  می‌گذرند به عدد حقیقی و منتهی‌بندی میل نمی‌کنند.

اگر برای بررسی مشتق پذیری این تابع در  $x=2$  تعریف مشتق  $f$  در  $x=2$  را به کار گیریم:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 1}{x - 2} =$$

نهی کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان



حد صورت کسر برابر ۳ است و حد مخرج کسر برابر صفر است. وقتی  $x \rightarrow 2$ ، داریم:

$$\text{حد راست} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 1}{x - 2} = +\infty$$

$$\text{حد چپ} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 1}{x - 2} = -\infty$$

بنابراین  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$  موجود (و منتهای) نیست، پس  $f'(2)$  وجود ندارد.

ب) نقطه دیگری (به جز  $x = 2$ ) در نظر بگیرید. آیا تابع در این نقطه مشتق پذیر است؟ پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید.

کارد در کلاس

تابع  $g$  (شکل زیر) را به صورت  $g(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 1 \\ x+1 & x > 1 \end{cases}$  در نظر می‌گیریم.

چرا  $g'(1)$  موجود نیست؟ زیرا سبب خطای ما اینست که  $x=1$  می‌گذریم، به عدد حقیقی و منصفیر نفوذی



مثل نمی‌کند. همین

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1-1}{x-1} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} x+1 = 2 \end{cases}$$

پس  $g'(1)$  وجود ندارد.

تابع  $f$  و  $g$  فعالیت و کار در کلاس قبل به ترتیب در  $x = 2$  و  $x = 1$  ناپیوسته بودند و همان‌گونه که مشاهده کردید،  $f'(2)$  و  $g'(1)$  موجود نبودند. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر تابعی در یک نقطه مشتق پذیر باشد، الزاماً در آن نقطه باید پیوسته باشد. این مطلب را به عنوان یک قضیه ثابت می‌کنیم.

تهیه کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان



قضیه : اگر تابع  $f$  در  $x = a$  مشتق پذیر باشد آن گاه  $f$  در  $a$  پیوسته است.

اثبات : کافی است نشان دهیم :  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = \lim_{x \rightarrow a} \left( (x-a) \left( \frac{f(x) - f(a)}{x-a} \right) \right) =$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (x-a) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \left( \frac{f(x) - f(a)}{x-a} \right) = 0 \cdot f'(a) = 0$$

بنابراین  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = 0$  و از آنجا  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$  (چرا؟)

با توجه به این قضیه به طور منطقی می توان نتیجه گرفت که :

اگر تابع  $f$  در  $x = a$  پیوسته نباشد، آن گاه  $f$  در  $x = a$  مشتق پذیر هم نیست.

مثال بعد نشان می دهد که عکس قضیه درست نیست، یعنی حتی با وجود پیوستگی تابع در یک نقطه، لزوماً نمی توان مشتق پذیری تابع در آن نقطه را نتیجه گرفت.


مثال : مشتق پذیری تابع  $f(x) = |x^2 - 1|$  را در  $x = 1$  بررسی کنید.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x^2 - 1| - 0}{x - 1}$$

برای محاسبه  $f'(1)$  ناچاریم حدهای راست و چپ را به دست آوریم.

$$\text{حد راست} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

$$\text{حد چپ} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x^2 - 1)}{x - 1} = -2$$



بنابراین  $f'(1)$  موجود نیست. به عبارت دیگر خط مماس بر منحنی در نقطه  $x = 1$  وجود ندارد. اما حدهای یک طرفه فوق را می توان با وجود نیم خط های مماس بر منحنی در نقطه  $x = 1$  توجیه کرد. اگر از سمت راست به نقطه  $x = 1$  نزدیک شویم، شیب نیم خط مماس بر منحنی در این نقطه برابر ۲ و اگر از سمت چپ به  $x = 1$  نزدیک شویم، شیب خط مماس بر منحنی در این نقطه برابر -۲ است. حدهای راست و چپ بالا را به ترتیب مشتق های راست و چپ  $f$  در  $x = 1$  می نامیم و با  $f'_+(1)$  و  $f'_-(1)$  نمایش می دهیم.

در مثال قبل  $f$  در  $x=1$  پیوسته است ولی  $f$  در آن مشتق پذیر نیست.

نیم خط‌های مماس راست و چپ را به اختصار، نیم مماس راست و چپ می‌نامیم.

شیب نیم مماس چپ  $f'_-(1) =$

شیب نیم مماس راست  $f'_+(1) =$

معادله این نیم مماس‌ها نیز به ترتیب عبارت‌اند از:

نیم مماس راست  $y - 0 = 2(x-1)$  یا  $y = 2x - 2, x \geq 1$

نیم مماس چپ  $y - 0 = -2(x-1)$  یا  $y = -2x + 2, x \leq 1$

می‌باشند.

کاردر کلاس

نشان دهید که مشتق تابع  $f$  در مثال قبل در  $x=-1$  نیز موجود نیست. در صورت امکان معادله نیم مماس‌های راست و چپ در  $x=-1$  را بنویسید.

تعریف: مشتق راست و مشتق چپ تابع  $f$  در  $x=a$  را با  $f'_+(a)$  و  $f'_-(a)$  نمایش می‌دهیم و آن را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \quad f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

یا به طور معادل:

$$f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \quad f'_-(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$f'_+(-1) = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{x^2 - 1 - f(-1)}{x + 1} \quad \left\{ \begin{array}{l} ① \\ ② \end{array} \right.$$

$$① \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} -(x-1) = 2 \Rightarrow f'_+(-1) = 2$$

معادله نیم مماس راست

$$\rightarrow y - 0 = 2(x+1) \rightarrow y = 2x + 2 \quad x > -1$$

$$② \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} (x-1) = -2 \Rightarrow f'_-(-1) = -2$$



معادله نیم مماس چپ

$$\rightarrow y - 0 = -2(x+1) \rightarrow y = -2x - 2 \quad x < -1$$

## نهیة کننده:


## گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان

مثال: توابع  $f(x) = [x]$  و  $g(x) = \sqrt{x}$  در صفر پیوسته نیستند. بنابراین  $f'(0)$  و  $g'(0)$  موجود نیستند.



اکنون به بررسی حالت دیگری می‌پردازیم که در آن تابع مشتق پذیر نیست.



مثال: تابع  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  را در نظر می‌گیریم. مشتق پذیری این تابع را در  $x = 0$  بررسی کنید.



$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = +\infty$$

بنابراین تابع  $f$  در صفر مشتق پذیر نیست. شکل‌ها نشان می‌دهند که وقتی از سمت راست یا چپ به نقطه صفر نزدیک می‌شویم خط‌های قاطع به خط  $x = 0$  نزدیک می‌شوند.

تابع  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  در  $x = 0$  مشتق پذیر نیست. خط  $x = 0$  را «مماس قائم» منحنی می‌نامیم.



اگر تابع  $f$  در  $x = a$  پیوسته باشد و  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty$  یا  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$  در این صورت خط  $x = a$  را «عماس قائم» بر منحنی  $f$  در نقطه  $(a, f(a))$  می‌نامیم. بدیهی است  $f'(a)$  در این حالت وجود ندارد.


به‌طور خلاصه می‌توان گفت:

- ۱  $f$  در  $a$  پیوسته نباشد.
- ۲  $f$  در  $a$  پیوسته باشد و مشتق راست و مشتق چپ در  $x = a$ :

  - الف) هر دو موجود (متناهی) ولی نابرابر باشند (نقطه گوشه‌ای).
  - ب) یکی متناهی و دیگری نامتناهی باشد (نقطه گوشه‌ای).
  - ب) هر دو نامتناهی باشند.

کاردو کلاس

در شکل‌های زیر مشخص کنید که هر تابع در کدام نقطه یا نقاط مشخص شده مشتق‌پذیر نیست.




۱- همکاران محترم توجه دارند که ذکر مثال‌های پیچیده در این قسمت در زمره اهداف کتاب نیست.



### تابع مشتق

تاکنون با مفهوم مشتق تابع در یک نقطه (معین) آشنا شده‌اید. حال به دنبال یافتن رابطه‌ای بین مجموعه نقاط متعلق به دامنه یک تابع و مشتق تابع در آن نقاط هستیم.

### فصلت



تابع  $f(x) = x^2$  را در نظر می‌گیریم.

جدول زیر را کامل کنید (مشتق تابع در برخی نقاط حساب شده‌اند).

$x$	-3	-2	-1	0	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	2
$f'(x)$	-6	-4	-2	0	1	$2\sqrt{3}$	4

$$f'(-2) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(-2)}{x - (-2)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} (x - 2) = -4$$

$$f'(\sqrt{3}) = \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{f(x) - f(\sqrt{3})}{x - \sqrt{3}} = \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{x^2 - 3}{x - \sqrt{3}} = \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})}{x - \sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = 0$$

می‌دانیم مشتق تابع در یک نقطه (در صورت وجود) برابر شیب خط مماس بر منحنی در آن نقطه است و از طرفی مماس بر منحنی در هر نقطه یکناست، بنابراین  $f'(x)$  تابعی از  $x$  است. حدس می‌زنید در چه نقاطی مشتق تابع  $f(x) = x^2$  وجود دارد؟

اگر عضو  $x$  از دامنه تابع  $f$  باشد، تابع مشتق  $f$  در  $x$  را با  $f'(x)$  نمایش می‌دهیم و آن را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

مشروط بر آنکه حد فوق موجود باشد. مجموعه تمام نقاطی از دامنه  $f$  که برای آنها  $f'$  موجود باشد را دامنه  $f'$  می‌نامیم.

به طور مثال برای تابع  $f(x) = x^2$ ، دامنه تابع  $f'$ ، مجموعه اعداد حقیقی است. روش محاسبه ضابطه تابع  $f'$  نیز، در ادامه ارائه شده است.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2hx + h^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x+h) = 2x \end{aligned}$$

بنابراین  $f'(x) = 2x$ . همان گونه که قبلاً ذکر شد دامنه تابع  $f'$ ، مجموعه اعداد حقیقی است. به کمک این دستور مقدار مشتق تابع  $f(x) = x^2$  در هر نقطه را می‌توان حساب کرد، به طور مثال:

$$f'(-\frac{1}{5}) = -\frac{2}{5}, f'(\sqrt{7}) = 2\sqrt{7} \text{ و } f'(5^\circ) = 10^\circ$$


مثال: اگر  $f(x) = \frac{1}{x}$ ، تابع مشتق و دامنه آن را به دست آورید.  $f'(3)$  را از دو روش به دست آورید: با استفاده از تابع مشتق و سپس با استفاده از تعریف مشتق در  $x=3$ .

حل:  $f'(0)$  وجود ندارد. دامنه  $f'$  برابر  $\mathbb{R} - \{0\}$  است. اگر  $x \neq 0$  داریم:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x - x - h}{hx(x+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{hx(x+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{x(x+h)} = -\frac{1}{x^2} \end{aligned}$$

تهیه کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان



با استفاده از دستور فوق داریم:  $f'(3) = \frac{-1}{9}$  البته مشتق  $f$  در هر نقطه دیگر ( $x \neq 0$ ) را نیز به کمک این دستور می‌توان محاسبه کرد. به طور مثال:  $f'(\sqrt{5}) = \frac{-1}{5}$  و  $f'(-2) = -\frac{1}{4}$  و  $f'(3)$  را به طور مستقیم نیز می‌توان حساب کرد:

$$f'(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{3}}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{3-x}{3x}}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-(x-3)}{3x(x-3)} = -\frac{1}{9}$$

در عمل هنگام حل مسائل با توجه به شرایط هر یک از دو روش فوق ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

کاردر کلاس

اگر  $f(x) = \begin{cases} 5x & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases}$  دامنه  $f$  و دامنه  $f'$  را محاسبه کنید و ضابطه  $f'$  را به دست آورید. نمودار  $f$  و نمودار  $f'$  را رسم کنید.

$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1\} \cup \{1\} = \mathbb{R}$

تابع در نقطه  $x=1$  پیوسته نیست. لذا  $f'(1)$  وجود ندارد پس  $D_{f'} = \mathbb{R} - \{1\}$

$f'(x) = \begin{cases} 5 & x \neq 1 \\ \text{نمی‌تواند} & x = 1 \end{cases}$




اکنون آماده هستیم که برای برخی از توابع، تابع مشتق را محاسبه کنیم.

محاسبه تابع مشتق برخی توابع

اگر  $f(x) = c$  آن گاه  $f'(x) = 0$ . به عبارت دیگر مشتق تابع ثابت در هر نقطه برابر صفر است.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

به طور مثال اگر  $f(x) = 7$  و  $g(x) = -\frac{2}{5}$  آن گاه  $f'(x) = 0$  و  $g'(x) = 0$ .





❑ اگر  $n \in \mathbb{N}$  و  $f(x) = x^n$  آن گاه:  $f'(x) = nx^{n-1}$ .

این دستور کاربرد زیادی دارد. قبلاً ثابت کردیم که اگر  $f(x) = x^2$ ،  $f'(x) = 2x$ ، همچنین اگر  $f(x) = x^3$ ، به کمک این دستور نشان می‌دهیم که:  $f'(x) = 3x^2$ . ابتدا این رابطه آخر را ثابت می‌کنیم و از روش ارائه شده برای اثبات دستور مشتق  $f(x) = x^n$  استفاده می‌کنیم. اگر  $f(x) = x^3$  داریم:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h-x)[(x+h)^2 + x(x+h) + x^2]}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h[(x+h)^2 + x(x+h) + x^2]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} [(x+h)^2 + x(x+h) + x^2] = x^2 + x^2 + x^2 = 3x^2$$

اکنون اگر  $f(x) = x^n$ ، محاسبات کمی دشوارتر می‌شود، اما در عوض دستور مهم‌تری را ثابت کرده‌ایم.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h-x)[(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}]}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} [(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}]$$

$$= \underbrace{x^{n-1} + x^{n-1} + \dots + x^{n-1} + x^{n-1}}_{\text{آن } n \text{ بار}} = nx^{n-1}$$

❑ به‌طور کلی اگر  $n$  یک عدد صحیح باشد و  $f(x) = x^n$  آن گاه:  $f'(x) = nx^{n-1}$ .

❖ مثال: اگر  $f(x) = \frac{1}{x}$  و  $x \neq 0$  قبلاً دیدیم که  $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

همچنین با استفاده از دستور اخیر داریم:  $f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1} \Rightarrow f'(x) = -x^{-1-1} = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$

❑\* اگر  $x > 0$  و  $f(x) = \sqrt{x}$  آن گاه  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

\* در مورد توابع رادیکالی در این کتاب فقط مشتق تابع  $\sqrt{f(x)}$  و  $\sqrt[n]{f(x)}$  که  $f(x)$  گویاست، مورد نظر است. رعایت این موضوع در ارزشنمایی‌ها الزامی است.

۵ اگر  $f(x) = \sqrt{ax+b}$  و  $ax+b > 0$  آن گاه  $f'(x) = \frac{a}{2\sqrt{ax+b}}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a(x+h)+b} - \sqrt{ax+b}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{a(x+h)+b} - \sqrt{ax+b})(\sqrt{a(x+h)+b} + \sqrt{ax+b})}{h(\sqrt{a(x+h)+b} + \sqrt{ax+b})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{ax} + ah + \cancel{b} - \cancel{ax} - \cancel{b}}{h(\sqrt{a(x+h)+b} + \sqrt{ax+b})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a}{\sqrt{a(x+h)+b} + \sqrt{ax+b}} = \frac{a}{2\sqrt{ax+b}} \end{aligned}$$

۶ اگر  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  آن گاه  $f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+h} - \sqrt[3]{x}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{x+h} - \sqrt[3]{x})(\sqrt[3]{(x+h)^2} + \sqrt[3]{x(x+h)} + \sqrt[3]{x^2})}{h(\sqrt[3]{(x+h)^2} + \sqrt[3]{x(x+h)} + \sqrt[3]{x^2})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h \cdot A} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \end{aligned}$$

۷ اگر توابع  $f$  و  $g$  در  $x = a$  مشتق پذیر باشند، آن گاه توابع  $kf$  ( $k \in \mathbb{R}$ )،  $f \pm g$  و  $\frac{f}{g}$  ( $g(a) \neq 0$ ) نیز در  $x = a$  مشتق پذیرند و داریم:

الف)  $(f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a)$       ب)  $(kf)'(a) = kf'(a)$

پ)  $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$       ت)  $(\frac{f}{g})'(a) = \frac{f'(a)g(a) - g'(a)f(a)}{(g(a))^2}$

به کمک تعریف مشتق هر یک از روابط بالا را می توان ثابت نمود، اما در این کتاب به اثبات آنها نمی پردازیم.  
مثال: مشتق چند تابع محاسبه شده است.

الف)  $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{3} \cdot 3x^2$

ب)  $g(x) = x^5 + 2x^3 - \sqrt{2}x + 1 \Rightarrow g'(x) = 5x^4 + 12x^2 - \sqrt{2}$

پ)  $h(x) = (2x^2+1)(-x^2+7x-2) \Rightarrow h'(x) = 6x^2(-x^2+7x-2) + (2x^2+1)(-2x+7)$

ت)  $l(x) = \frac{x^2-4}{3x+1} \Rightarrow l'(x) = \frac{2x(3x+1) - 3(x^2-4)}{(3x+1)^2}$

۱ مشتق تابع های زیر را به دست آورید:

الف)  $f(x) = \frac{1}{x-2}$

ب)  $g(x) = \sqrt{x}(3x^2 + 5)$

پ)  $h(x) = \frac{x}{2x^2 + x - 1}$

$f'(x) = \frac{-1}{(x-2)^2}$

$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}(3x^2 + 5) + \sqrt{x}(6x)$

$h'(x) = \frac{1(2x^2 + x - 1) - (2x + 1)x}{(2x^2 + x - 1)^2}$

۲ اگر  $f$  و  $g$  توابع مشتق پذیر باشند و  $f(2) = 2$ ،  $f'(2) = 5$ ،  $g(2) = 8$  و  $g'(2) = -6$  مقدار  $(fg)'(2)$  و  $(\frac{f}{g})'(2)$  را به دست

$(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$   
 $= 5 \times 8 + (-6) \times 2 = 22$

$(\frac{f}{g})'(x) = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{(g(x))^2}$   
 $= \frac{5 \times 8 - (-6) \times 2}{(8)^2} = \frac{29}{32}$

مشتق توابع مثلثاتی

$f(x) = \cos x$  و  $g(x) = -\sin x$

توابع  $f(x) = \sin x$  و  $g(x) = \cos x$  مشتق پذیر هستند و داریم:

♦ اثبات: با استفاده از تعریف مشتق داریم:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x(\cos h - 1) + \cos x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (\sin x \frac{\cos h - 1}{h}) + \lim_{h \rightarrow 0} (\cos x \frac{\sin h}{h}) = 0 + \cos x = \cos x \end{aligned}$$

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$ ،  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$

در حسابان (۱) دیدیم که:

بنابراین:  $f'(x) = (\sin x)' + (\cos x)(1)$  و در نتیجه  $f'(x) = \cos x$

به طریق مشابه اگر  $g(x) = \cos x$  داریم:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x(\cos h - 1) - \sin x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos h - 1)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \end{aligned}$$

$= (\cos x)(0) - (\sin x)(1) = -\sin x \Rightarrow g'(x) = -\sin x$

تهیه کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان

با استفاده از دو دستور فوق می توان مشتق بسیاری از توابع مثلثاتی را به دست آورد.

مثال: مشتق  $f(x) = \tan x$  را به دست آورید.

$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow f'(x) = \frac{(\cos x)(\cos x) + (\sin x)(\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

### کاردرکلاس

مشتق توابع زیر را به دست آورید.

الف)  $f(x) = \sin x \tan x$

ب)  $g(x) = \frac{\sin x}{1 - \sin x}$

$$f'(x) = \cos x \tan x + \sin x (1 + \tan^2 x) \quad g'(x) = \frac{-\sin x (1 - \sin x) - (\sin x)(-\cos x)}{(1 - \sin x)^2}$$

### مشتق تابع مرکب / قاعده زنجیری

اگر  $f$  و  $g$  دو تابع مشتق پذیر باشند، در این صورت تابع مرکب  $f \circ g$  مشتق پذیر است و داریم:

$$(f \circ g)'(x) = g'(x) f'(g(x))$$

مثال: اگر  $h(x) = (x^2 + 3x + 1)^4$ ، مطلوب است  $h'(x)$ .

حل: اگر  $f(x) = x^4$  و  $g(x) = x^2 + 3x + 1$ ، آن گاه:  $h(x) = f(g(x))$

$$h'(x) = g'(x) f'(g(x)) = (2x + 3) f'(g(x))$$

اگر  $u = g(x)$  آن گاه لازم است که  $f'(u)$  را پیدا کنیم.

$$f(u) = u^4 \Rightarrow f'(u) = 4u^3 = 4(g(x))^3 = 4(x^2 + 3x + 1)^3$$

بنابراین:

$$h'(x) = (2x + 3) (4) (x^2 + 3x + 1)^3$$

دستور فوق را به صورت زیر نیز می توان ارائه کرد،

اگر  $f$  تابعی بر حسب  $u$  و  $u$  تابعی از  $x$  باشد:

$$y = f(u) \Rightarrow y' = u' f'(u)$$

مثال: مشتق تابع  $y = \sin^2 x$  را به دست آورید.

حل: با فرض  $\sin x = u$  داریم:  $y = u^2$  و از آنجا:

$$y' = u' \cdot 2u = (\cos x)(2)(\sin x) = 2 \sin x \cos x$$

مشتق تابع‌های زیر را به دست آورید.

الف)  $f(x) = (x^2 + 1)^2(5x - 1)$

$$f'(x) = 2(2x)(x^2 + 1)(5x - 1) + (x^2 + 1)^2(5)$$

ب)  $g(x) = \cos^2 x$

$$g'(x) = -2 \sin x \cos x$$


ب)  $h(x) = \sin(2x^2 + 5)$

$$h'(x) = 4x \cos(2x^2 + 5)$$

مشتق پذیری روی یک بازه

تابع  $f$  روی بازه  $(a, b)$  مشتق پذیر است هرگاه، در هر نقطه این بازه مشتق پذیر باشد.  
 تابع  $f$  روی بازه  $[a, b]$  مشتق پذیر است، هرگاه  $f$  در بازه  $(a, b)$  مشتق پذیر باشد و در نقطه  $a$  مشتق راست و در  $b$  مشتق چپ داشته باشد.

مشتق پذیری روی بازه‌های  $(a, b)$  و  $[a, b]$  را به طور مشابه تعریف کنید.  
 تابع  $f$  روی بازه  $[a, b]$  مشتق پذیر است هرگاه  $f$  روی بازه  $(a, b)$  مشتق پذیر باشد و در نقطه  $a$  مشتق راست داشته باشد.  
 تابع  $f$  روی بازه  $(a, b)$  مشتق پذیر است هرگاه  $f$  روی بازه  $(a, b)$  مشتق پذیر باشد و در نقطه  $b$  مشتق چپ داشته باشد.



اگر  $D_f = \mathbb{R}$  و  $f$  در هر عدد حقیقی مشتق پذیر باشد،  
 گوئیم  $f$  روی بازه  $(-\infty, +\infty)$  مشتق پذیر است.

مثال: تابع  $f(x) = \begin{cases} x^2 & -2 \leq x \leq 1 \\ x+1 & x > 1 \end{cases}$  را در نظر  
 می‌گیریم.

$f$  روی بازه‌های  $(1, \infty)$  و  $[-2, 1)$  مشتق پذیر است. ولی  
 $f$  روی بازه  $[1, 2]$  مشتق پذیر نیست (چرا؟)


زیرا با اینکه روی بازه  $(1, 2)$  مشتق پذیر است، اما در  $x = 1$  پیوستگی راست ندارد، لذا  
 $x = 1$  مشتق راست ندارد.

$f(x) = \begin{cases} 2x+4 & x < -1 \\ x^2-1 & -1 \leq x < 2 \\ -x+5 & 2 \leq x < 5 \end{cases}$  نمودار  $f$  را رسم کنید و مشتق پذیری  $f$  را روی بازه‌های  $[-2, 0]$  و  $(2, 5)$  بررسی کنید.

$f'(-1) = -2$  و  $f'(1) = 2$

بررسی کنید.

تابع در نقطه  $[-1, 0]$  مشتق پذیر است.  
 تابع در نقطه  $(2, 5)$  مشتق پذیر است.  
 تابع در فاصله  $[-2, 0]$  مشتق پذیر نیست.  
 زیر تابع در فاصله  $[-2, 0]$  پیوسته نیست.  
 جمله تابع در  $x = -1$  ناپیوسته و مشتق پذیر است.



توجه کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان

### مشتق مرتبه دوم

مشتق تابع  $y = f(x)$  با نماد  $y' = f'(x)$  نمایش داده شد. به همین ترتیب اگر تابع مشتق، مشتق پذیر باشد، مشتق مرتبه دوم  $y'' = f''(x)$  را به  $y = f(x)$  نمایش می‌دهیم و برای محاسبه آن از تابع  $y' = f'(x)$  نسبت به  $x$  مشتق می‌گیریم.

مثال: اگر  $y = 3x^3 + 2x^2 - 1$  آن گاه:

$y' = 12x^2 + 4x$  ,  $y'' = 24x + 4$




(ب)  $f'(0)$  وجود ندارد چنانچه

در  $x=0$  تانگنسی نیست.

$f'(3) = 1$  و  $f'(3) = 6 \rightarrow f'(3)$  وجود ندارد

فصل چهارم: مشتق ۹۹




مغزین


۱ دو تابع مختلف مانند  $f$  و  $g$  مثال بزنید که هر دو در  $x=2$  پیوسته باشند ولی در این نقطه مشتق پذیر نباشند.

$$f(x) = |x-2| \quad \text{و} \quad g(x) = \begin{cases} x^2 & x < 2 \\ x+2 & x \geq 2 \end{cases}$$


۲ با محاسبه مشتق راست و مشتق چپ توابع داده شده در نقطه  $A$ ، نشان دهید که این توابع در نقطه  $A$  مشتق پذیر نیستند.



$f'_+(0) = 0$   
 $f'_-(0) = -1$   
 وجود ندارد.  $f'(0)$  (الف)



$f'_+(1) = -1$   
 $f'_-(1) = 0$   
 وجود ندارد.  $f'(1)$  (ب)




$f'_+(4) = 1/4$   
 $f'_-(4) = 1/4$   
 وجود ندارد.  $f'(4)$  (ب)

۳ تابع  $f(x) = \begin{cases} 5x-4 & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 3 \\ x+6 & x > 3 \end{cases}$  داده شده است.

(الف) نمودار تابع  $f$  را رسم کنید.  
 (ب) ضابطه تابع مشتق را بنویسید.


پایا



(ب) نشان دهید که  $f'(0)$  و  $f'(3)$  وجود ندارند.  
 (ت) نمودار تابع  $f'$  را رسم کنید.


پایا

۴ نمودار تابعی را رسم کنید که مشتق آن  
 (الف) در یک نقطه برابر صفر شود.  
 (ب) در تمام نقاط مثبت باشد.  
 (ت) در تمام نقاط منفی باشد.



(ب) در  $x=2$  برابر ۳ شود.

(ت) در تمام نقاط یکسان باشد.



۵

(الف) با استفاده از نمودار تابع  $f(x) = x^2 + 2x + 3$  (شکل


مقابل) مقادیر زیر را به ترتیب صعودی مرتب کنید.  
 $f'(-1) = 0 < f'(0) < f'(2) < f'(3)$   
 $f'(2)$  و  $f'(-1)$  و  $f'(0)$  و  $f'(3)$

(ب) صحت ادعای خود در (الف) را با محاسبه مشتق تابع

$f'(x) = 2x + 2$   $f(x) = x^2 + 2x + 3$  بررسی کنید.

(ب) تابع مشتق را رسم کنید.

$f'(-1) = 0$  ,  $f'(0) = 2$  ,  $f'(3) = 8$



$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$$

• مشتق پذیری تابع  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & x \geq 1 \\ 2x & x < 1 \end{cases}$  را در نقطه  $x=1$  بررسی کنید. تابع در نقطه  $x=1$  ناپیوسته است.  
 • پس در این نقطه مشتق پذیری نیست.

سه تابع مختلف مثال بزنید که مشتق آنها با هم برابر باشند.


$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2 & x < -2 \\ -(x-2) & -2 \leq x \leq 2 \\ x^2 - 4 & x > 2 \end{cases}$$

$$f(x) = 3x, \quad g(x) = 3x + 1, \quad h(x) = 3x - 2$$


$$f'(x) = \begin{cases} 2x & x < -2 \\ -1 & -2 < x < 2 \\ 2x & x > 2 \end{cases}$$

$$f'(x) = |x-2|, \quad f'(2) = 0, \quad f'(2^+) = 2, \quad f'(2^-) = -2$$

$x=2, x=2$  مشتق پذیری نیست.



$$\begin{aligned} f'(1) &= 2 \\ g'(1) &= -1 \\ f'(2) &= \text{وجود ندارد} \\ g'(2) &= 1 \\ f'(3) &= 2 \\ g'(3) &= -1 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} h'(1) &= f'(1)g(1) + g'(1)f(1) = 2 \times 1 + (-1) \times 2 = 0 \\ h'(2) &= f'(2)g(2) + g'(2)f(2) = \text{وجود ندارد} \\ h'(3) &= f'(3)g(3) + g'(3)f(3) = -2 \times 1 + (-1) \times 2 = -4 \end{aligned}$$

• نمودار توابع  $f$  و  $g$  را در شکل زیر در نظر بگیرید.  
 الف) اگر  $h(x) = f(x) \cdot g(x)$  مطلوب است  $h'(1), h'(2)$  و  $h'(3)$

ب) اگر  $k(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$  مطلوب است  $k'(1), k'(2), k'(3)$

$$k'(1) = \frac{f'(1)g(1) - g'(1)f(1)}{(g(1))^2} = \frac{2 \times 1 - (-1) \times 2}{(1)^2} = \frac{4}{1} = 4$$

$k'(2) =$  وجود ندارد چون  $f(2)$  وجود ندارد.

$$k'(3) = \frac{f'(3)g(3) - g'(3)f(3)}{(g(3))^2} = \frac{2 \times 1 - (-1) \times 2}{(1)^2} = 4$$



اگر  $f'(1) = 3$  و  $g'(1) = 5$  مطلوب است،  $(f+g)'(1)$  و  $(3f+2g)'(1)$

$$(f+g)'(1) = f'(1) + g'(1) = 3 + 5 = 8$$

$$(3f+2g)'(1) = 3f'(1) + 2g'(1) = 3 \times 3 + 2 \times 5 = 19$$

اگر  $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 0 \\ x & x > 0 \end{cases}$  نشان دهید  $f'_-(0)$  و  $f'_+(0)$  موجودند ولی  $f'(0)$  موجود نیست.

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 0}{x - 0} = 1$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 0}{x - 0} = 0$$

$f'_+(0) \neq f'_-(0) \Rightarrow f'(0)$  وجود ندارد.

مشتق توابع داده شده را بیابید.

$$f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+2}}(3x+2) + 3x^2 \sqrt{3x+2}$$

ب)  $f(x) = (\sqrt{3x+2})(x^2+1)$

الف)  $f(x) = (3x^2-4)(2x-5)^2$   
 $f'(x) = 6x(2x-5) + 2(3x^2-4)(2) = 12x^2 - 30x + 8(3x^2-2)$

ب)  $f(x) = \frac{x^2-3x+1}{-3x+2}$

ت)  $f(x) = \frac{9x-2}{\sqrt{x}}$   
 $f'(x) = \frac{9\sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}}(9x-2)}{(\sqrt{x})^2} = \frac{9x+2}{2x\sqrt{x}}$

$$f'(x) = \frac{(2x-3)(-3x+2) - (-3)(x^2-3x+1)}{(-3x+2)^2}$$

مشتق توابع مثلثاتی زیر را به دست آورید.

الف)  $f(x) = \sin^2 x + \cos^2 x$

$$f'(x) = 2\cos x \sin^2 x - 2\sin x \cos x$$

ب)  $f(x) = \frac{\sin^2 x}{\sin 2x}$  ?

ب)  $f(x) = \tan^2 x - 2\cos x$

$$f'(x) = 2(1+\tan^2 x) \tan x + 2\sin x$$


ت)  $f(x) = \sin x \cos^2 x$

$$f'(x) = \frac{2\cos^2 x \sin 2x - 2\cos 2x \sin^2 x}{\sin^2 x}$$


$$f'(x) = \cos x \cos 2x - 2\sin 2x \sin x$$

### خواندنی

مشتق پذیری در یک نقطه به صورت شهودی می تواند برحسب رفتار تابع در نزدیکی نقطه  $A(a, f(a))$  تعبیر شود. اگر نمودار تابع را در نزدیک نقطه  $A$  در نظر بگیریم و مرتباً از نمای نزدیک تری به نمودار نگاه کنیم، هنگامی که  $f$  در  $a$  مشتق پذیر باشد، نمودار منحنی شبیه یک خط راست می شود.




تابع در  $a$  مشتق پذیر است.




تابع در  $a$  مشتق پذیر نیست.


## آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه‌ای تغییر



با مفهوم سرعت متوسط در فیزیک آشنا شده‌اید. اگر اتومبیلی در امتداد خط راست مسافت  $280$  کیلومتر را در  $4$  ساعت طی کند سرعت متوسط آن در این زمان  $v = \frac{280}{4} = 70$  کیلومتر بر ساعت است. با این حال ممکن است اتومبیل در لحظات مختلف سرعت‌های متفاوتی داشته باشد. همچنین مطابق آنچه که در درس فیزیک آموخته‌اید، سرعت متوسط روی یک بازه زمانی خیلی کوچک، به سرعت لحظه‌ای نزدیک است. اگر نمودار مکان - زمان در مورد حرکت اتومبیل را داشته باشیم، سرعت متوسط اتومبیل بین هر دو لحظه دلخواه، برابر شیب خطی است که نمودار مکان - زمان را در آن دو لحظه قطع می‌کند.

همچنین در درس فیزیک سرعت لحظه‌ای در هر لحظه دلخواه  $t$ ، برابر شیب خط مماس بر نمودار در آن لحظه تعریف شد. با آنچه که در درس‌های گذشته ملاحظه کردید، می‌توان گفت که سرعت در لحظه  $t$  همان مقدار مشتق تابع (مکان - زمان) در لحظه  $t$  است. مفهوم مشتق را در بسیاری از پدیده‌های دیگر نیز می‌توان مشاهده کرد. ابتدا در مورد سرعت متوسط و سرعت لحظه‌ای به ذکر مثالی خواهیم پرداخت.





مثال: خودرویی در امتداد خط راست طبق معادله  $d(t) = -5t^2 + 20t$  حرکت می‌کند، که در آن  $0 \leq t \leq 5$  برحسب ثانیه است. با در نظر گرفتن نمودار مکان - زمان (شکل):

الف) سرعت متوسط خودرو را در بازه‌های زمانی  $[1, 2]$ ،  $[1, 1/5]$  و  $[1, 1/4]$  به دست آورید.

ب) اگر به همین ترتیب بازه‌های کوچک‌تری مانند  $[1, 1/2]$  و  $[1, 1/3]$  و ... اختیار کنیم، سرعت متوسط در این بازه‌ها به چه عددی نزدیک می‌شود؟

ب) سرعت لحظه‌ای را با استفاده از مشتق تابع  $d$  در  $t=1$  به دست آورید.

ت) سرعت لحظه‌ای در  $t=2$  و  $t=3$  چقدر است؟

پاسخ حل:

الف)

$$\text{سرعت متوسط در بازه زمانی } [1, 2] = \frac{d(2) - d(1)}{2 - 1} = \frac{20 - 15}{1} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\text{سرعت متوسط در بازه زمانی } [1, 1/5] = \frac{d(1/5) - d(1)}{1/5 - 1} = \frac{18/25 - 15}{-4/5} = \frac{3/25}{-4/5} = -3/20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\text{سرعت متوسط در بازه زمانی } [1, 1/4] = \frac{d(1/4) - d(1)}{1/4 - 1} = \frac{18/4 - 15}{-3/4} = \frac{3/2}{-3/4} = -2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

ب) اگر به همین ترتیب بازه‌های زمانی کوچک‌تری اختیار کنیم، سرعت متوسط به سرعت لحظه‌ای در  $t=1$  نزدیک می‌شود.

ب)  $d'(t) = -10t + 20$ ، پس  $d'(1) = 10$

ت)  $d'(2) = 0$ ،  $d'(3) = -10$

سرعت در لحظه  $t=2$ ، صفر است و مماس بر منحنی در این نقطه موازی محور  $x$  هاست و خودرو ساکن است. مقدار سرعت در لحظه‌های  $t=1$  و  $t=3$  برابر است و علامت منفی در مورد  $d'(3)$  نشان می‌دهد که جهت حرکت در  $t=3$  برخلاف جهت حرکت در  $t=1$  است.

به جز مفهوم سرعت، در مطالعه پدیده‌های زیاد دیگری که در قالب یک تابع نمایش داده می‌شوند با موضوع نسبت تغییرات متغیر وابسته به تغییرات متغیر مستقل مواجه می‌شویم. نسبت تغییرات دما به تغییرات زمان و همچنین نسبت تغییرات جمعیت نسبت به زمان نمونه‌های دیگری از اینگونه تغییرات هستند.

به طور کلی آهنگ متوسط تغییر یک تابع را در بازه‌ای مانند  $[a, a+h]$  به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$\text{آهنگ متوسط تغییر تابع } f \text{ در بازه } [a, a+h] = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

همچنین آهنگ تغییر لحظه‌ای تابع  $f$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\text{آهنگ لحظه‌ای تغییر تابع } f \text{ در نقطه } x=a = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$$


آهنگ متوسط تغییر با شیب خط قاطع و آهنگ لحظه‌ای تغییر با مقدار مشتق و شیب خط مماس در آن نقطه متناظر اند.

نهیته کنده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان

کار در کلاس

۱ نمودار زیر موقعیت یک ذره را در لحظه  $t$  نمایش می‌دهد. مقادیر زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید: (محاسبه عددی لازم نیست.)



A سرعت متوسط بین  $t=1$  و  $t=3$

B سرعت متوسط بین  $t=5$  و  $t=6$

C سرعت لحظه‌ای در  $t=1$

D سرعت لحظه‌ای در  $t=3$

E سرعت لحظه‌ای در  $t=5$

F سرعت لحظه‌ای در  $t=6$


$$F < B < E < D < A < C$$

کاربردهایی دیگر از آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه‌ای تغییر

آهنگ رشد همان‌گونه که در حسابان (۱) ملاحظه کردید تابع  $f(x) = \sqrt{x} + 50$  قد متوسط کودکان را برحسب سانی متر تا حدود ۶۰ ماهگی نشان می‌دهد، که در آن  $x$  مدت زمان پس از تولد (برحسب ماه) است. آهنگ متوسط رشد در بازه زمانی  $[0, 60]$  چنین است:

$$\frac{f(60) - f(0)}{60 - 0} = \frac{\sqrt{60} + 50 - 50}{60} \approx 0.09 \frac{\text{سانی متر}}{\text{ماه}}$$

یعنی در طی ۵ سال، رشد متوسط قد حدود ۰/۹ سانی متر در هر ماه است.



گارد کلاس

الف) آهنگ متوسط رشد در بازه زمانی  $[0, 25]$  چقدر است؟  $\frac{f(25) - f(0)}{25 - 0} = \frac{\sqrt{25} + 50 - 50}{25} = \frac{5}{25} = 0.2 \frac{\text{سانی متر}}{\text{ماه}}$

ب) آهنگ لحظه‌ای تغییر قد کودک را در ۲۵ ماهگی و ۴۹ ماهگی، با هم مقایسه کنید. کدام یک بیشتر است؟  
 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$   
 $f'(25) = \frac{1}{2\sqrt{25}} = \frac{1}{10} = 0.1 \frac{\text{سانی متر}}{\text{ماه}}$   $f'(49) = \frac{1}{2\sqrt{49}} = \frac{1}{14} \approx 0.07 \frac{\text{سانی متر}}{\text{ماه}}$   $f'(25) > f'(49)$

ب) اگر قد علی در ۱۶ ماهگی، ۸۰ سانی متر و در ۳۶ ماهگی، ۹۵ سانی متر باشد، آهنگ متوسط تغییر رشد او را در این فاصله


حساب کنید و با نمودار بالا مقایسه کنید.  
 $\frac{f(36) - f(16)}{36 - 16} = \frac{9.5 - 8}{20} = \frac{1.5}{20} = 0.075 \frac{\text{سانی متر}}{\text{ماه}}$

نرخ باروری: نمودار زیر روند رو به کاهش نرخ باروری در کشورمان را در طی نیم قرن نمایش می‌دهد. آهنگ متوسط تغییر باروری در بازه زمانی [۱۳۳۹, ۱۳۸۹] در مدت ۵۰ سال برابر است با:

$$\frac{1/6 - 7}{1389 - 1339} = \frac{-5/4}{50} = -0.108$$

آهنگ متوسط تغییر باروری در بازه زمانی [۱۳۶۴, ۱۳۷۹] را به دست آورید. (با استفاده از مقادیر تقریبی روی نمودار) بازه زمانی را مشخص کنید که در آن آهنگ متوسط تغییر باروری مثبت باشد.

$$\frac{f(1379) - f(1364)}{1379 - 1364} = \frac{2.2 - 7.2}{15} = \frac{-5}{15} = -0.33$$




میانگین تعداد فرزندان متولد شده به ازای هر مادر ایرانی

### خواندنی

نرخ باروری در ایران در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ به حدود ۶/۵ فرزند رسید. با توجه به اینکه کشورمان امکانات لازم برای چنین رشد جمعیت بالایی را دارا نبود، سیاست‌های کاهش جمعیت و عوامل دیگر باعث شد که نرخ باروری تا سال ۱۳۸۵ به ۱/۹ کاهش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که کاهش باروری در ایران بزرگ‌ترین و سریع‌ترین کاهش باروری ثبت شده بود. کارشناسان معتقدند که باید سیاست‌های کاهش رشد جمعیت پس از کاهش نرخ باروری به حدود ۲/۵ متوقف می‌شد. کاهش رشد جمعیت مشکلات فراوانی نظیر کاهش نیروی کار و بحران سالمندی را در پی خواهد داشت. با ابلاغ سیاست‌های کلی «جمعیت» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۳، و تغییر برنامه‌های وزارت بهداشت، بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، نرخ باروری به حدود ۲/۱ افزایش یافته است. با این حال نگرانی‌های مربوط به احتمال کاهش بیش از حد رشد جمعیت در سال‌های ۱۴۲۵ تا ۱۴۳۰ تأکید می‌کند که این سیاست‌ها تا دست‌یابی کامل به اهداف تعیین شده باید دنبال شود.

## سرعت متوسط و سرعت لحظه‌ای



مثال: جسمی را از سطح زمین به طور عمودی پرتاب می‌کنیم. جهت حرکت به طرف بالا را مثبت در نظر می‌گیریم. فرض کنیم ارتفاع این جسم از سطح زمین در هر لحظه از معادله  $h(t) = -5t^2 + 40t$  به دست می‌آید. به طور مثال ۲ ثانیه پس از پرتاب این جسم در ارتفاع ۶۰ متری از سطح زمین است. به هر حال جسم پس از مدتی به زمین برمی‌گردد. نمودار مکان - زمان حرکت این جسم در شکل نشان داده شده است.

اگر سرعت متوسط این جسم در بازه‌های زمانی  $[0, 2]$ ،  $[1, 2]$ ،  $[2, 3]$  و  $[3, 4]$  را به ترتیب با  $v_1$ ،  $v_2$ ،  $v_3$  و  $v_4$  نمایش دهیم، داریم:

$$v_1 = \frac{h(2) - h(0)}{2 - 0} = \frac{60}{2} = 30 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \frac{h(2) - h(1)}{2 - 1} = 25 \text{ m/s}$$

$$v_3 = \frac{h(3) - h(2)}{3 - 2} = \frac{75 - 60}{1} = 15 \text{ m/s}$$

$$v_4 = \frac{h(4) - h(3)}{4 - 3} = \frac{80 - 75}{1} = 5 \text{ m/s}$$

سرعت لحظه‌ای در زمان‌های  $t=1$ ،  $t=2$ ،  $t=3$  و  $t=4$  با استفاده از مشتق تابع  $h$  چنین به دست می‌آید:

$$h(t) = -5t^2 + 40t \Rightarrow h'(t) = -10t + 40$$

$$h'(1) = 30 \text{ m/s}, \quad h'(2) = 20 \text{ m/s}, \quad h'(3) = 10 \text{ m/s}, \quad h'(4) = 0 \text{ m/s}$$

در  $t=4$  جسم به بالاترین ارتفاع خود از سطح زمین (۸۰ متر) می‌رسد و در این لحظه سرعت آن برابر صفر (متر بر ثانیه) می‌شود.

سپس جسم شروع به حرکت به طرف زمین می‌کند. سرعت متوسط در بازه  $[4, 5]$  برابر  $\frac{h(5) - h(4)}{5 - 4} = \frac{75 - 80}{1} = -5 \text{ m/s}$  است. علامت منفی نشان می‌دهد که حرکت جسم رو به پایین است. سرعت لحظه‌ای در  $t=5$  برابر  $h'(5) = -10 \text{ m/s}$  است.

با توجه به مثال قبل:

الف) سرعت جسم هنگام برتاب و هنگام برخورد به زمین را به دست آورید.

ختمام برتاب  $t=0 \Rightarrow h'(0) = 40 \text{ m/s}$

ب) سرعت متوسط جسم را در بازه زمانی  $[5, 8]$  به دست آورید.

ختمام برخورد به زمین  $t=8 \Rightarrow h'(8) = -40 \text{ m/s}$

سرعت متوسط  $= \frac{h(8) - h(5)}{8 - 5} = \frac{0 - 75}{3} = -25 \text{ m/s}$

ب) لحظاتی را معلوم کنید که سرعت جسم  $25 \text{ m/s}$  و  $-25 \text{ m/s}$  است.

سرعت لحظه  $= h'(t) = -10t + 40$

$25 = -10t + 40 \rightarrow t = 1.5 \text{ s}$

$-25 = -10t + 40 \rightarrow t = 6.5 \text{ s}$

تمرین

۱ جدول زیر درجه حرارت  $T$  (سانتی گراد) را در شهری از ساعت ۸ تا ۱۸ در یک روز نشان می دهد.

ساعت $h$	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
درجه حرارت $T$	۱۱	۱۲	۱۴	۱۷	۱۹	۱۸	۱۷	۱۵	۱۳	۱۰	۹


الف)  $\frac{T(12) - T(8)}{12 - 8} = \frac{19 - 11}{4} = 2$       ب)  $\frac{T(18) - T(12)}{18 - 12} = \frac{9 - 19}{6} = -\frac{5}{3}$

آهنگ تغییر متوسط درجه حرارت نسبت به زمان را:

الف) از ساعت ۸ تا ساعت ۱۲ به دست آورید.

ب) از ساعت ۱۲ تا ساعت ۱۸ به دست آورید.

پ) پاسخها را تفسیر کنید.



۲ کسری از جمعیت یک شهر که به وسیله یک ویروس آلوده شده اند برحسب زمان (هفته) در نمودار روبه رو نشان داده شده است.

الف) شیب های خطوط  $t$  و  $d$  چه چیزهایی را نشان می دهند.


ب) گسترش آلودگی در کدام یک از زمان های  $t=1$ ،  $t=2$  یا  $t=3$  بیشتر است؟

پ) قسمت ب را برای  $t=4$ ،  $t=5$  و  $t=6$  بررسی کنید.

الف) شیب خط  $t$  آهنگ تغییر لحظه ای کسری از جمعیت آلوده شده در لحظه  $t$  است (مختصی نسبی) نشان می دهد.

ب) شیب خط  $d$  آهنگ تغییر متوسط کسری از جمعیت آلوده شده در فاصله ای زمانی  $t$  است (مختصی نسبی) نشان می دهد.





۲ نمودار روبه‌رو نمایش میزان فروش تعداد نوعی کالا ( $N$ ) پس از صرف  $x$  میلیون تومان هزینه برای تبلیغ است.

الف) آهنگ تغییر  $N$  بر حسب  $x$  را وقتی  $x$  از ۰ تا ۱، ۱ تا ۲، ۲ تا ۳ و ۳ تا ۴ تغییر می‌کند به دست آورید.

از ۰ تا ۱	از ۱ تا ۲	از ۲ تا ۳	از ۳ تا ۴
۳۰۰	۱۸۰	۱۲۰	۱۰۰

$\frac{300-0}{1-0} = 300$   
 $\frac{480-300}{2-1} = 180$   
 $\frac{600-480}{3-2} = 120$   
 $\frac{700-600}{4-3} = 100$

ب) به نظر شما چرا آهنگ تغییرات، وقتی که مقادیر  $x$  افزایش می‌یابند، در حال کاهش است؟  
 فروخته شده کم می‌شود در زمان کم‌تر. خریدار کم می‌سوزد.

۳ معادله حرکت متحرکی به صورت  $f(t) = t^2 - t + 1$  بر حسب متر در بازه زمانی  $[0, 5]$  ( $t$  بر حسب ثانیه) داده شده است.

در کدام لحظه سرعت لحظه‌ای با سرعت متوسط در بازه زمانی  $[0, 5]$  با هم برابرند؟

$$\frac{f(5) - f(0)}{5 - 0} = \frac{25 - 1}{5} = 4.8$$

$f'(t) = 2t - 1 = 4.8 \Rightarrow t = 2.9$

۵ تویی از یک پل به ارتفاع ۱۱ متر به هوا پرتاب می‌شود.  $f(t)$  نشان‌دهنده فاصله توپ از سطح زمین در زمان  $t$  است. برخی از مقادیر  $f(t)$  در جدول زیر نمایش داده شده است.

$$\frac{f(1/8) - f(1/4)}{1/8 - 1/4} = 12 \text{ m/s}$$

$$\frac{f(1/5) - f(1/6)}{1/5 - 1/6} = 11 \text{ m/s}$$

$t$	ثانیه	۰	۰/۱	۰/۲	۰/۳	۰/۴	۰/۵	۰/۶
$f(t)$	متر	۱۱	۱۲/۴	۱۳/۸	۱۵/۱	۱۶/۳	۱۷/۴	۱۸/۴


$f'(1/6) = 11.5 \text{ m/s}$

بر اساس جدول کدام یک از مقادیر زیر می‌تواند سرعت توپ را هنگامی که در ارتفاع نظیر زمان ۰/۴ ثانیه، است نشان دهد؟

- الف) ۱/۲۳ m/s      ب) ۱۴/۹۱ m/s      ج) ۱۱/۵ m/s      د) ۱۶/۰۳ m/s



۶ با توجه به مقادیر تابع  $f$  در جدول زیر،  $f'$  را برای نقاط داده شده تخمین بزنید. به‌طور مثال  $f'(1) = -6$ . بقیه جدول را کامل کنید.

$x$	۰	۵	۱۰	۱۵	۲۰
$f(x)$	۱۰۰	۷۰	۵۵	۴۶	۴۰
مقدار تقریبی $f'(x)$	-۶	-۳	-۱/۸	-۰/۸	۸



۷ کدام یک از عبارات زیر درست و کدام یک نادرست است :

- الف) آهنگ تغییر متوسط تابعی مانند  $f$  در بازه  $[0, 1]$  همیشه کمتر از شیب آن منحنی در نقطه است. **نادرست**
- ب) اگر تابعی صعودی باشد، آهنگ تغییر متوسط آن، همواره صعودی است. **نادرست**
- پ) تابعی وجود ندارد که برای آن هم  $f(a) = 0$  و هم  $f'(a) = 0$  **نادرست**
- ۸ یک توده باکتری پس از  $t$  ساعت دارای جرم  $m(t) = \sqrt{t} + 2t^3$  گرم است.



$f(a) = f'(a) = 0$

الف) جرم این توده باکتری در بازه زمانی  $3 \leq t \leq 4$  چند گرم افزایش می یابد؟

ب) آهنگ رشد جرم توده باکتری در لحظه  $t=3$  چقدر است؟

$$\frac{m(4) - m(3)}{4 - 3} = \frac{13^3 - \sqrt{3^3} - 5^3}{1} \approx 78, 3$$

$$m'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} + 6t^2 \rightarrow m'(3) \approx 58, 3g$$

۹ گنجایش ظرفی  $40$  لیتر مایع است. در لحظه  $t=0$  سوراخی در ظرف ایجاد می شود. اگر حجم مایع باقی مانده در ظرف پس از  $t$  ثانیه از رابطه  $V = 40(1 - \frac{t}{100})^2$  به دست آید:

الف) آهنگ تغییر متوسط حجم مایع در بازه زمانی  $[0, 1]$  چقدر است؟

ب) در چه زمانی، آهنگ تغییر لحظه ای حجم برابر آهنگ تغییر متوسط آن در بازه  $[0, 100]$  می شود؟

الف)  $\frac{V(1) - V(0)}{1 - 0} = 39, 208 - 40 = -0, 792$  لیتر

ب)  $\frac{V(100) - V(0)}{100 - 0} = -0, 4$  لیتر متوسط

$V'(t) = -0, 8(1 - \frac{t}{100})$   $\rightarrow -0, 8(1 - \frac{t}{100}) = -0, 4$

$\rightarrow 1 - \frac{t}{100} = \frac{1}{2} \rightarrow t = 50$

تهیه کننده :

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه ، استان خوزستان



## کاربردهای مشتق

- ۱ اکستریم‌های یک تابع و توابع صعودی و نزولی
- ۲ جهت تغير نمودار یک تابع و نقطه عطف آن
- ۳ رسم نمودار توابع

فصل

گردنه جبران (اردبیل)


سرعت لحظه‌ای یک اتومبیل، با مشتق معادله مکان - زمان نسبت به زمان و یا شیب خط مماس بر نمودار مکان زمان است. شتاب لحظه‌ای، مشتق دوم معادله مکان نسبت به زمان است.

# اکسترم‌های یک تابع و توابع صعودی و نزولی

درس

نمودار زیر، نمودار تابع تغییرات دمای هوای یک شهر در دو شبانه‌روز متوالی است. اگر  $x$  زمان و  $y$  دما باشد؛ بیشترین و کمترین دما در این ۴۸ ساعت در چه زمان‌هایی بوده است و مقدار آنها چند است؟

نقطه ۳ دما ۱۰، کمترین و در نقطه ۲۹ دما ۲۷ و بیشترین



نقاط به طول ۱۵ و ۲۹ به گونه‌ای هستند که مقدار تابع در آنها نسبت به مقادیر تابع در نقاط اطراف آنها (نقاط یک همسایگی حول آنها) بیشتر است، بدین خاطر اصطلاحاً گفته می‌شود تابع در این نقاط «ماکزیم نسبی» دارد. نقاط به طول ۳ و ۲۷ به گونه‌ای هستند که مقدار تابع در آنها نسبت به مقادیر تابع در نقاط اطراف آنها کمتر است، لذا اصطلاحاً گفته می‌شود تابع در این نقاط «مینیم نسبی» دارد. به طور دقیق‌تر می‌توان گفت:

تعریف:

اگر  $f$  یک تابع و  $I \subseteq D_f$  یک همسایگی از نقطه  $c$  (بازه باز شامل نقطه  $c$ ) باشد که

(الف) به ازای هر  $x$  متعلق به  $I$  داشته باشیم  $f(x) \leq f(c)$ ، در این صورت  $f(c)$  را یک ماکزیم نسبی تابع  $f$  می‌نامیم.

(ب) به ازای هر  $x$  متعلق به  $I$  داشته باشیم  $f(x) \geq f(c)$ ، در این صورت  $f(c)$  را یک مینیم نسبی تابع  $f$  می‌نامیم.

دقت کنید که در نمودار، مقادیر ماکزیمم نسبی برابر ۲۵ و ۲۷ هستند و نقاط ماکزیمم نسبی نقاط (۱۵, ۲۵) و (۲۷, ۲۹) هستند و یا به عبارتی مقادیر ماکزیمم‌های نسبی در نقاطی به طول  $x = ۱۵$  و  $x = ۲۹$  اتفاق افتاده‌اند. به طریق مشابه مقادیر مینیمم نسبی ۱۰ و ۱۳ هستند و نقاط مینیمم نسبی نقاط (۳, ۱۰) و (۲۷, ۱۳) هستند و یا به عبارتی مقادیر مینیمم‌های نسبی در نقاطی به طول  $x = ۱۳$  و  $x = ۲۷$  اتفاق افتاده‌اند.


در بسیاری از مسائل فقط بیشترین و کمترین مقدار یک تابع در یک مجموعه اهمیت دارد. به بزرگ‌ترین مقدار تابع  $f$  در مجموعه  $I$  «ماکزیمم مطلق» این تابع در این مجموعه می‌گوییم. همچنین به کوچک‌ترین مقدار تابع  $f$  در مجموعه  $I$  «مینیمم مطلق» این تابع در این مجموعه می‌گوییم. بنابراین نقاط ماکزیمم مطلق و مینیمم مطلق تابع  $f$  در مجموعه  $I$  به ترتیب «بالاترین» و «پایین‌ترین» نقطه نمودار تابع در آن مجموعه هستند و زمانی که می‌گوییم ماکزیمم مطلق تابع  $f$  در نقطه  $x = a$  (منظور نقطه‌ای از تابع به طول  $x = a$  است) اتفاق افتاده است یعنی  $f(a)$  مقدار ماکزیمم مطلق و نقطه  $(a, f(a))$  نقطه ماکزیمم مطلق تابع بر مجموعه مورد نظر است. به عبارتی برای هر  $x \in I$  داریم  $f(x) \leq f(a)$ . همچنین وقتی می‌گوییم مینیمم مطلق تابع  $f$  در نقطه  $x = a$  اتفاق افتاده است یعنی  $f(a)$  مقدار مینیمم مطلق و نقطه  $(a, f(a))$  نقطه مینیمم مطلق تابع بر مجموعه مورد نظر است.

تذکر: گوییم تابع  $f$  در نقطه  $x = c$  اکسترمم نسبی دارد هرگاه در این نقطه ماکزیمم نسبی یا مینیمم نسبی داشته باشد و اگر در نقطه  $x = c$  ماکزیمم مطلق یا مینیمم مطلق داشته باشد می‌گوییم در آن نقطه اکسترمم مطلق دارد.


### کارد کلاس

۱ در هر یک از نمودارهای توابع زیر مقدار ماکزیمم مطلق و مینیمم مطلق و همچنین طول نقاط ماکزیمم مطلق و مینیمم مطلق را مشخص نمایید.

$x = a$  ماکزیمم مطلق




(ب)  $x = f$  مینیمم مطلق



(ب) مینیمم مطلق ندارد

$x = c$  ماکزیمم مطلق








(الف)  $x = b$  ماکزیمم مطلق

$x = c$  مینیمم مطلق

دقت کنید که با توجه به تعریف، نقطهٔ ماکزیمم نسبی یا مینیمم نسبی به گونه‌ای است که تابع در یک همسایگی آن تعریف شده است اما نقطهٔ ماکزیمم مطلق و مینیمم مطلق لازم نیست حتماً در چنین شرطی صدق کند. حال با توجه به این مطلب در هر نمودار زیر، نقاط ماکزیمم و مینیمم نسبی و ماکزیمم و مینیمم مطلق را مشخص نمایید.




Max مطلق نسبی



در هر یک از نمودارهای زیر، مقادیر و طول نقاط اکسترمم‌های نسبی و اکسترمم‌های مطلق را مشخص نمایید.


Min نسبی و مقدار بزرگتر  
Min مطلق }  $x=0$

Max نسبی و مطلق ندارد



Min مطلق در  $x=4$  برابر صفر  
Min نسبی در  $x=1$  برابر ۱  
Max مطلق در  $x=5$  برابر ۱۱


نمودار یک تابع را رسم کنید که در نقطه (۲, ۴) ماکزیمم نسبی و در نقطه (۵, ۱) مینیمم نسبی دارد.



©

ب) در  $x=0$  مماس افقی (0,0) Min مطلق دارد اما ماکزیمم مطلق ندارد.

فصل پنجم: کاربردهای مشتق 115



الف) تابع  $f(x) = x^2$  را در نظر بگیرید.  
وجود مقادیر ماکزیمم مطلق و مینیمم مطلق تابع  $f$  را در بازه‌های  $[0, 1]$  و  $(0, 1)$  بررسی کنید.  
ب) وجود اکسترم‌های مطلق تابع  $f$  را بر  $\mathbb{R}$  بررسی نمایید.


الف) در  $[0, 1]$  Min مطلق برای  $f$

و Max مطلق برای  $f$

ب) در  $\mathbb{R}$  Min و Max مطلق ندارد.

فعالیت

1 در نمودار زیر نقاطی که تابع در آنها مماس افقی دارد؛ یعنی تمام جاهایی که مشتق در آنها وجود دارد و برابر صفر است مشخص شده‌اند. به سؤالات زیر پاسخ دهید.



الف) تمام نقاط اکسترم نسبی را مشخص نمایید.  $c$  و  $d$  و  $e$  و  $f$  و  $g$  و  $h$  و  $i$  و  $j$  و  $k$  و  $l$

ب) تمام نقاطی که مشتق در آنها وجود ندارد را مشخص نمایید.  $a$  و  $c$  و  $d$  و  $e$  و  $f$  و  $g$  و  $h$  و  $i$  و  $j$  و  $k$  و  $l$

ب) تمام نقاطی که مشتق برابر صفر است را بنویسید.  $a$  و  $c$  و  $d$  و  $e$  و  $f$  و  $g$  و  $h$  و  $i$  و  $j$  و  $k$  و  $l$

ت) آیا در همه نقاط اکسترم نسبی مشتق وجود دارد؟ **خیر**


ث) در اکسترم‌های نسبی که مشتق در آنها وجود دارد، مقدار این مشتق چقدر است؟ **صفر**

ج) آیا امکان دارد در نقطه‌ای مشتق برابر صفر باشد ولی آن نقطه اکسترم نسبی نباشد؟ **بله (نقطه ۱)**

چ) آیا امکان دارد در نقطه‌ای مشتق وجود نداشته باشد ولی آن نقطه اکسترم مطلق باشد؟ **بله**

در نقطه  $c$





۲

۱۱۶

۲ سعی کنید نمودارهای دیگری رسم کنید که در آنها نقاط اکسترممی باشند که مشتق در این نقاط موجود باشد (خط مماس بر منحنی در نقاط اکسترمم وجود داشته باشد). مقدار مشتق در این نقاط اکسترمم چقدر است؟

$f' = 0$


۱ با توجه به آنچه در قسمت‌های ۱ و ۲ دیدید، کدام یک از موارد زیر می‌تواند درست باشد؟

الف) اگر  $f'(c) = 0$  وجود نداشته باشد، آنگاه  $x = c$  یک نقطه اکسترمم نسبی نیست. **نادرست**

ب) اگر  $f'(c) = 0$  آنگاه  $x = c$  یک نقطه اکسترمم نسبی است. **نادرست**

ب) اگر  $x = c$  طول یک نقطه اکسترمم نسبی باشد و  $f'(c) = 0$  وجود داشته باشد، آنگاه  $f'(c) = 0$ . **درست**

فعالیت



۱ شکل روبه‌رو نمودار یک تابع پیوسته را نشان می‌دهد.

min مطلق

Max مطلق

الف) وجود ماکزیمم مطلق و مینیمم مطلق را برای تابع  $f$  در بازه‌های بسته زیر بررسی کنید.

$[-1, 0]$	$[5, 10]$	$[13, 15]$	$[10, 13]$	$[16, 20]$
Max مطلق	Min مطلق	Max مطلق	Min مطلق	Max مطلق

ب) وجود هر یک از مقادیر ماکزیمم مطلق و مینیمم مطلق را برای تابع  $f$  در بازه‌های باز زیر بررسی کنید.

$(-1, 0)$	$(5, 10)$	$(13, 15)$	$(10, 13)$	$(16, 20)$
وجود ندارد	Min مطلق $x=9$	وجود ندارد	Max مطلق $x=12$	وجود ندارد

۲ با توجه به آنچه در قسمت ۱ مشاهده کردید کدام یک از موارد زیر نمی‌تواند درست باشد؟

الف) هر تابع پیوسته بر یک بازه بسته دارای اکسترمم‌های مطلق است. **درست**

ب) هر تابع پیوسته بر یک بازه باز دارای اکسترمم‌های مطلق است. **نادرست**

قضیه زیر را بدون اثبات می‌پذیریم.

قضیه: اگر تابع  $f$  در بازه بسته  $[a, b]$  پیوسته باشد، آنگاه تابع در این بازه هم ماکزیمم مطلق و هم مینیمم مطلق دارد.






با توجه به آنچه تا به حال ملاحظه کردیم، اکسترم‌های مطلق تابع در «نقاط ابتدا و انتهای بازه»، یا در «اکسترم‌های نسبی تابع» و یا در «نقاطی که تابع در آنها مشتق پذیر نیست» اتفاق می‌افتند. از طرفی دیدیم که در اکسترم‌های نسبی یا «مشتق تابع وجود ندارد» و یا «مشتق وجود دارد و برابر صفر است». بنابراین اکسترم‌های مطلق تابع را باید در بین نقاطی بررسی کنیم که یکی از سه ویژگی زیر را داشته باشند:

- ۱) نقاطی که مشتق تابع در آنها وجود ندارد.
- ۲) نقاطی که مشتق در آنها برابر صفر است.
- ۳) نقاط ابتدایی و انتهایی بازه مورد نظر.

مجموعه حاصل از اجتماع نقاط دو دسته (۱) و (۲) را «نقاط بحرانی» می‌نامیم؛ «به عبارتی نقاط بحرانی نقاطی از دامنه تابع هستند که مشتق تابع در آنها وجود ندارد و یا وجود دارد و برابر صفر است.» برای یافتن نقاط اکسترم مطلق ابتدا این نقاط بحرانی را مشخص می‌نماییم. در این صورت از بین تمام نقاط بحرانی و نقاط انتهایی بازه، نقطه یا نقاطی که بیشترین مقدار تابع در آنها اتفاق می‌افتد نقاط **ماکزیمم مطلق** تابع و مقدار تابع در این نقاط مقدار **ماکزیمم مطلق** تابع است. همچنین در بین نقاط مذکور نقطه یا نقاطی که کمترین مقدار تابع در آنها اتفاق می‌افتد نقاط **مینیمم مطلق** تابع و مقدار تابع در این نقاط مقدار **مینیمم مطلق** تابع است.

مثال: اکسترم‌های مطلق تابع  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$  را در بازه  $[-2, 2]$  بیابید.



حل: بنا بر آنچه گفته شد باید نقاط بحرانی، یعنی نقاطی که مشتق در آنها وجود ندارد یا برابر صفر است را مشخص نماییم.

بنابراین باید در بازه  $(-2, 2)$  به دنبال نقاطی باشیم که تابع در آنها مشتق نداشته باشد و یا مشتق در آنها برابر صفر باشد. اما  $f$  در تمام بازه  $(-2, 2)$  مشتق پذیر است و داریم  $f'(x) = x^2 - 1$  و مقدار  $f'$  در  $x = \pm 1$  برابر صفر می‌شود یعنی داریم  $f'(1) = 0$  و  $f'(-1) = 0$ .

بنابراین  $x = \pm 1$  طول نقاط بحرانی و  $x = \pm 2$  طول نقاط انتهایی بازه هستند و از آنجا که داریم:

$$f(-2) = -\frac{2}{3} \quad f(-1) = \frac{2}{3} \quad f(1) = -\frac{2}{3} \quad f(2) = \frac{2}{3}$$

لذا مقادیر **ماکزیمم** و **مینیمم مطلق** تابع بر این بازه به ترتیب برابر  $\frac{2}{3}$  و  $-\frac{2}{3}$  و نقاط **ماکزیمم** نقاط به طول  $x = -1$  و  $x = 2$  و نقاط **مینیمم** نقاط به طول  $x = 1$  و  $x = -2$  است.



مثال: مقادیر ماکزیمم مطلق و مینیمم مطلق تابع  $f$  با ضابطه  $f(x) = |x^2 - 1|$  را روی بازه  $[-2, 2]$  پیدا کنید.


حل: نقاط  $x = \pm 2$  نقاط انتهایی بازه اند. برای یافتن نقاط اکسترمم مطلق، باید به دنبال نقاط بحرانی باشیم، یعنی نقاطی مانند  $c$  که برای آنها  $f'(c) = 0$  یا  $f'(c)$  وجود نداشته باشد. لذا باید مشتق پذیری تابع  $f$  در نقاط بازه بررسی شود. اما داریم:

$$f(x) = |x^2 - 1| = \begin{cases} x^2 - 1 & x \leq -1 \text{ یا } 1 \leq x \\ 1 - x^2 & -1 \leq x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 2x & x < -1 \text{ یا } x > 1 \\ -2x & -1 < x < 1 \end{cases}$$

حال باید مشتقات چپ و راست را در نقاط  $x = -1$  و  $x = 1$  به دست آوریم که با توجه به تعاریف مشتق چپ و راست از فصل مشتق خواهیم داشت:

$$\text{و } f'_+(-1) = -2, \quad f'_-(-1) = 2, \quad f'_-(1) = -2, \quad f'_+(1) = 2$$

بنابراین تابع  $f$  در نقاط  $x = \pm 1$  مشتق پذیر نیست و از طرفی  $f'$  تنها در نقطه  $x = 0$  مقدار صفر می‌گیرد. لذا نقاط  $x = 0$  و  $x = \pm 1$  نقاط بحرانی این تابع اند و با بررسی مقدار تابع در این نقاط و نقاط انتهایی بازه، به سادگی مشخص می‌شود که مینیمم مطلق تابع در دو نقطه  $x = \pm 1$  است و مقدار آن برابر صفر است و ماکزیمم مطلق در نقاط  $x = \pm 2$  و مقدار آن برابر ۳ است. در بسیاری از مسائل در زندگی خواهان این هستیم که با داشتن برخی شرایط از پیش تعیین شده، مسئله را طوری حل کنیم که بیشترین بازده را داشته باشیم. به عنوان نمونه در مثال زیر می‌خواهیم از ورقه‌ای با ابعاد مشخص جعبه‌ای با بیشترین حجم ممکن بسازیم.



مثال: یک سازنده جعبه‌های حلبی، با بریدن مربع‌های همنهشت از چهار گوشه ورق‌های حلبی به ابعاد ۸ اینچ و ۱۵ اینچ و بالا بردن چهار طرف آن، جعبه‌های سرباز می‌سازد. اگر بخواهیم حجم جعبه‌های ساخته شده بیشترین مقدار ممکن باشند، طول ضلع مربع‌هایی که باید بریده شود چقدر باید باشد؟

حل: فرض کنید طول ضلع مربعی که از گوشه‌های مستطیل مفروض برحسب اینج بریده می‌شود  $x$  باشد. پس

$$\begin{aligned} 0 \leq x \leq \frac{15}{2} & \text{ طول قوطی مورد نظر} \\ 0 \leq x \leq 4 & \text{ عرض قوطی} \end{aligned}$$

پس با توجه به این مفروضات داریم:

$$V(x) = x(15 - 2x)(8 - 2x) = 4x^2 - 46x + 120, \quad 0 \leq x \leq 4$$

حون  $V$  روی  $[0, 4]$  پیوسته است، پس دارای اکسترم‌های مطلق در این بازه است و داریم:

$$V'(x) = 12x^2 - 92x + 120 = 0$$

$$(3x-5)(x-6) = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{3} \text{ یا } x = 6$$

اما  $x = 6$  در بازه مورد نظر قرار ندارد، پس قابل قبول نیست و  $x = \frac{5}{3}$  تنها نقطه بحرانی تابع است. از طرفی  $V(0) = 0$ ،  $V(\frac{5}{3}) > 0$  و  $V(4) = 0$  نشان می‌دهد که ماکزیمم مطلق تابع در  $x = \frac{5}{3}$  حاصل می‌شود و لذا طول ضلع مربع‌های مورد نظر باید  $\frac{5}{3}$  اینج باشد.

مثال: در کره‌ای به شعاع  $R$  یک استوانه محاط کرده‌ایم. شعاع قاعده و ارتفاع استوانه را طوری به دست آورید که حجم استوانه، بیشترین مقدار ممکن را داشته باشد.

حل: فرض کنیم استوانه مورد نظر دارای شعاع قاعده  $r$  و ارتفاع  $h$  باشد. اگر  $O$  مرکز کره باشد، در مثلث قائم‌الزاویه  $OAB$ ،

$$OB = \frac{h}{2} \text{ و داریم:}$$

$$AB^2 + OB^2 = OA^2$$

$$\text{بنابراین } r^2 + \frac{h^2}{4} = R^2$$

حجم این استوانه برابر است با:


$$V = \pi r^2 h = \pi \left( R^2 - \frac{h^2}{4} \right) h \Rightarrow V(h) = \pi R^2 h - \frac{\pi}{4} h^3 ; 0 \leq h \leq 2R$$

برای یافتن نقاط بحرانی این تابع در بازه  $[0, 2R]$ ، ریشه‌های مشتق را به دست می‌آوریم:

$$V'(h) = \pi R^2 - \frac{3\pi}{4} h^2 = 0 \Rightarrow h = \frac{2R}{\sqrt{3}}$$

از طرفی  $V(0) = 0$  و  $V(2R) = 0$

بنابراین تابع  $V$  به ازای  $h = \frac{2R}{\sqrt{3}}$  بیشترین مقدار حجم را دارد. با توجه به اینکه  $r^2 + \frac{h^2}{4} = R^2$ ، مقدار  $r$  برابر با  $r = \frac{\sqrt{2}R}{\sqrt{3}}$  می‌باشد.




## تشخیص صعودی یا نزولی بودن یک تابع

در فصل اول با مفهوم صعودی یا نزولی بودن یک تابع در یک بازه آشنا شدیم. همچنین در فصل قبل با مفهوم مشتق آشنا شدیم و دیدیم که مقدار مشتق یک تابع در یک نقطه برابر است با شیب خط مماس بر نمودار تابع در آن نقطه. از طرفی برای یک تابع مانند  $f$  با تابع  $f'$  آشنا شدیم. اکنون خواهیم دید که با بررسی  $f'$  می‌توان ویژگی‌هایی از تابع  $f$  و نمودار آن از جمله صعودی و نزولی بودن تابع را مشخص نمود.

### فعالیت

۱ نمودار تابع  $f$  در شکل زیر رسم شده است.



الف) با رسم مماس‌هایی در نقاط مختلف نمودار  $f$  تعیین کنید در چه بازه‌هایی شیب مماس‌ها مثبت و در چه بازه‌هایی شیب مماس‌ها منفی و در چه زیرمجموعه‌ای از دامنه شیب مماس‌ها برابر صفر است.

$$\begin{aligned} m=0 & \in \{b, c\} \\ m < 0 & \in (a, b) \\ m > 0 & \in (d, e) \end{aligned}$$


ب) تعیین کنید در چه بازه‌هایی مشتق  $f$  مثبت و در چه بازه‌هایی مشتق  $f$  منفی و در چه بازه‌هایی  $f'$  برابر صفر است.

$$\begin{aligned} f' < 0 & \in (a, b) \\ f' > 0 & \in (d, e) \\ f' = 0 & \in \{b, c, d\} \end{aligned}$$

ب) تعیین کنید در چه بازه‌هایی تابع  $f$  صعودی اکید و در چه بازه‌هایی نزولی اکید و در چه بازه‌هایی مقدار تابع  $f$  ثابت است.

$$\begin{aligned} \text{در بازه‌ها } (a, b) \text{ و } (d, e) \text{ اکیداً صعودی و در بازه } (b, c) \text{ اکیداً نزولی} \\ \text{و در بازه } (c, d) \text{ مقدار تابع ثابت است} \end{aligned}$$

$$\text{و در بازه } (d, e) \text{ تابع ثابت}$$



۱۲ دو نقطه از نمودار یک تابع در شکل روبه‌رو داده شده‌اند. نمودار این تابع را در بازه  $[a, e]$  به گونه‌ای رسم کنید که دارای همه ویژگی‌های زیر باشد:

- تابع  $f$  در بازه  $(a, e)$  مشتق پذیر باشد.
- مقدار مشتق تابع در بازه‌های  $(a, b)$  و  $(b, c)$  و  $(c, d)$  و  $(d, e)$  به ترتیب منفی، مثبت، صفر و منفی باشد.
- تعیین کنید تابع  $f$  در کدام بازه‌ها صعودی اکید و در کدام بازه‌ها نزولی اکید و در کدام بازه‌ها ثابت است.

در بازه  $(b, c)$  صعودی در بازه  $(a, b)$  و  $(d, e)$  نزولی در بازه  $(c, d)$  تابع ثابت

با توجه به آنچه گفته شد قضیه زیر را بدون اثبات بیان می‌نماییم.


قضیه:

فرض کنیم تابع  $f$  بر بازه  $[a, b]$  پیوسته و در بازه  $(a, b)$  مشتق پذیر باشد. در این صورت:

الف) اگر به ازای هر  $x$  در  $(a, b)$ ،  $f'(x) > 0$ ، آن‌گاه تابع  $f$  بر  $[a, b]$  صعودی اکید است.

ب) اگر به ازای هر  $x$  در بازه  $(a, b)$ ،  $f'(x) < 0$ ، آن‌گاه تابع  $f$  بر  $[a, b]$  نزولی اکید است.

پ) اگر به ازای هر  $x$  در بازه  $(a, b)$ ،  $f'(x) = 0$ ، آن‌گاه تابع  $f$  بر  $[a, b]$  یک تابع ثابت است.



کاردر کلاس

۱ توابع  $f(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 1 \\ x & x < 1 \end{cases}$  و  $g(x) = x^2$  در تمام  $\mathbb{R}$  صعودی اکیداند.

الف) آیا می‌توان گفت هر تابع که در یک بازه صعودی اکید باشد، در آن بازه مشتق پذیر هم هست؟  
 ب) آیا می‌توان گفت هر تابع که در یک بازه صعودی اکید و مشتق پذیر باشد، در هر نقطه از آن بازه دارای مشتق مثبت است؟




۲ تابع  $f(x) = \frac{1}{x}$  را در نظر بگیرید.


الف) نشان دهید که این تابع در بازه‌های  $(-\infty, 0)$  و  $(0, +\infty)$  اکیداً نزولی است.  
 ب) آیا می‌توان گفت این تابع در تمام دامنه خود اکیداً نزولی است؟  
 در ادامه محکی برای تعیین نقاط ماکزیمم نسبی و مینیمم نسبی ارائه می‌دهیم.



فرض کنیم  $c \in (a, b) \subseteq D_f$  یک نقطه بحرانی تابع  $f$  باشد و  $f$  بر  $(a, b)$  پیوسته و به جز احتمالاً در  $c$  مشتق پذیر باشد.





۱ اگر تابع  $f$  در بازه‌ای مانند  $(a, c)$  در سمت چپ آن صعودی و در بازه‌ای مانند  $(c, b)$  در سمت راست آن نزولی باشد، در این صورت  $x = c$  یک نقطه ماکزیم نسبی تابع  $f$  است.  
در شکل مقابل بخشی از نمودار تابع  $f$  رسم شده است. علامت  $f'$  را در دو طرف نقطه  $c$  مشخص نمایید.



۲ مشابه قسمت (۱) را برای نقطه مینیمم نسبی تابع  $f$  بنویسید

آرایع  $f$  در بازه‌ای مانند  $(a, c)$  در سمت چپ آن نزولی و در بازه‌ای مانند  $(c, b)$  در سمت راست آن صعودی باشد در این صورت  $x = c$  یک نقطه مینیمم نسبی تابع  $f$  است

۳ در شکل‌های زیر نمودار تابع  $f$  و نقطه  $c$  مشخص شده است و  $f'(c) = 0$ . الف) علامت  $f'$  را در دو طرف نقطه  $c$  در هر دو نمودار بررسی کنید. ب) در هر یک از نمودارها مشخص کنید آیا  $c$  یک نقطه اکسترمم نسبی است؟



نقاط اکسترمم ندارند زیرا علامت  $f'$  در شکل‌ها  $f'$  تغییر نمی‌کند  
در دو طرف نقطه  $x = c$  یکسان می‌مانند

با توجه به آنچه گفته شد می توان محک زیر را که به نام آزمون مشتق اول معروف است بیان نمود.

### آزمون مشتق اول

فرض کنیم تابع  $f$  بر بازه‌ای باز مانند  $I$  ( $I \subseteq D_f$ ) پیوسته باشد و  $c \in I$  یک نقطه بحرانی تابع  $f$  باشد. هرگاه  $f$  بر این بازه به جز احتمالاً در نقطه  $c$  مشتق پذیر باشد، در این صورت:

(الف) اگر به ازای تمام مقادیر  $x$  در بازه‌ای مانند  $(a, c)$ ،  $f'(x) > 0$  و به ازای تمام مقادیر  $x$  در بازه‌ای مانند  $(c, b)$ ،  $f'(x) < 0$ ، در این صورت  $f(c)$  یک مقدار ماکزیمم نسبی  $f$  است.

(ب) اگر به ازای تمام مقادیر  $x$  در بازه‌ای مانند  $(a, c)$ ،  $f'(x) < 0$  و به ازای تمام مقادیر  $x$  در بازه‌ای مانند  $(c, b)$ ،  $f'(x) > 0$ ، آن‌گاه  $f(c)$  یک مقدار مینیمم نسبی  $f$  است.

(پ) اگر  $f'$  در نقطه  $c$  تغییر علامت ندهد، به طوری که  $f'$  در هر دو طرف  $c$  مثبت یا هر دو طرف آن منفی باشد، آن‌گاه  $f(c)$  نه مینیمم نسبی و نه ماکزیمم نسبی است.

مثال: اکستریم‌های نسبی و مطلق تابع  $f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 6$  را در بازه  $[-3, 4]$  به دست آورید و مشخص کنید این تابع در چه بازه‌هایی صعودی و در چه بازه‌هایی نزولی است؟

حل: از آنجا که توابع چندجمله‌ای همواره مشتق پذیرند لذا برای مشخص کردن نقاط بحرانی تابع  $f$  باید تمام نقاطی که مشتق تابع در آنها صفر می‌شود را به دست آوریم.

$$f'(x) = 3x^2 - 4x - 4 \quad f'(x) = 0 \Rightarrow x = 2 \quad \text{یا} \quad x = -\frac{2}{3}$$

لذا نقاط بحرانی این تابع نقاط  $x = 2$  و  $x = -\frac{2}{3}$  است و نقاط  $x = -3$  و  $x = 4$  هم که نقاط انتهایی بازه هستند و داریم:

$$(-3, -27), \left(-\frac{2}{3}, \frac{20}{27}\right), (2, -2), (4, 22)$$

لذا  $x = -3$  و  $x = 4$  به ترتیب طول نقاط ماکزیمم و مینیمم مطلق و مقادیر آنها به ترتیب ۲۲ و -۲۷ است. حال برای تعیین اکستریم‌های نسبی و صعودی و نزولی بودن تابع باید مشتق تابع را تعیین علامت کنیم. با توجه به تعیین علامت معادلات درجه دوم داریم:

$x$		$-\frac{2}{3}$		۲	
$f'(x)$	+	۰	-	۰	+

از این جدول مشخص می‌شود که تابع  $f$  در بازه  $(-\frac{2}{3}, 2)$  نزولی و در سایر جاها صعودی است. همچنین مشخص می‌شود که نقطه  $x = -\frac{2}{3}$  یک ماکزیمم نسبی و مقدار آن برابر  $\frac{202}{27}$  است و نقطه  $x = 2$  یک مینیمم نسبی و مقدار آن برابر  $-2$  است. می‌توان اطلاعات فوق را در جدول زیر که به آن جدول تغییرات تابع می‌گوییم نمایش داد.


$x$	$-3$	$-\frac{2}{3}$	$2$	$4$
$f'$		$+$	$-$	$+$
$f$	$-27$	$\frac{202}{27}$	$-2$	$22$

ماکزیمم نسبی
مینیمم نسبی

کاردر کلاس


نمودار تابع  $f'$  در شکل زیر داده شده است. در بازه  $(a, b)$  و  $(s, t)$  تابع صعودی و در بازه  $(b, c)$  و  $(c, d)$  نزولی و در بازه  $(d, e)$  تابع نزولی است. بررسی کنید. بازه نزولی و محدب در بازه  $(d, e)$  تابع نزولی است. کدام بحرانی، کدام ماکزیمم نسبی و کدام مینیمم نسبی اند؟

پ) آیا نقاط بازه  $(d, e)$  اکسترمم نسبی هستند؟ **بله زیرا تابع در این بازه تابع مقعر است.**



ب) در  $x=a$  ماکزیمم نسبی در دو نقطه  $x=a, b, c, d, e$  بحرانی هستند زیرا مشتق در این نقاط مقعر است و در  $x=b$  مینیمم نسبی






- ۱ نمودار تابعی را رسم کنید که همه شرایط زیر را داشته باشد.
  - نقطه ماکزیم نسبی داشته باشد که مشتق در آن برابر صفر باشد.
  - نقطه مینیم نسبی داشته باشد که تابع در آن نقطه پیوسته باشد ولی مشتق نداشته باشد.
  - نقطه ماکزیم مطلق تابع نقطه بحرانی نباشد.
  - نقطه ماکزیم نسبی داشته باشد که تابع در آن ناپیوسته باشد.
  - نقطه ای داشته باشد که اکسترم نسبی نباشد ولی مشتق تابع در آن نقطه صفر باشد.




۲ نمودار تابعی را رسم کنید که بر دامنه اش پیوسته باشد ولی بر آن ماکزیم و مینیمم مطلق نداشته باشد.

۳ برای هر مورد زیر نمودار یک تابع را رسم کنید.



- الف) تابع  $f$  در بازه ای مانند  $[a, b]$  صعودی است اما صعودی اکید نیست.
  - ب) تابع  $f$  در بازه ای مانند  $[a, b]$  نزولی است اما نزولی اکید نیست.
  - پ) تابع  $f$  در بازه ای مانند  $[a, b]$  هم صعودی و هم نزولی است.
- ۴ برای هر کدام از موارد زیر نمودار یک تابع را رسم کنید.

- الف) تابعی که در یک بازه اکیداً نزولی است اما در برخی نقاط آن بازه پیوسته نیست.
- ب) تابعی که در یک بازه اکیداً صعودی و بر آن بازه پیوسته است اما در برخی نقاط آن بازه مشتق پذیر نیست.
- پ) تابعی که در یک بازه اکیداً نزولی و مشتق پذیر است اما مشتق آن در برخی نقاط منفی نباشد.



۵ نمودار تابع  $f$  را به گونه ای رسم کنید که ماکزیمم مطلق داشته باشد ولی تابع  $|f|$  ماکزیمم مطلق نداشته باشد.

۶ نقاط اکسترم نسبی و مطلق توابع زیر را در بازه های داده شده در صورت وجود بیابید و نقاط بحرانی این توابع را به دست

الف)  $f(x) = 2x^2 - 2x + 5$   $[-2, 1]$

ب)  $f(x) = x^3 - 2x$   $[-1, 2]$

پ)  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & 0 \leq x < 2 \\ 4-x & x \geq 2 \end{cases}$

فصلی آورید.  $f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{x}} & 0 < x < 2 \\ -1 & x > 2 \end{cases}$

Max برای  $x > 2$

$f'$	$\geq$	$+$	$-$
$f$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$

الف)  $f'(x) = 4x - 2 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$

$x = -1 \Rightarrow y = 12 + 2 + 5 = 21 \Rightarrow \text{Max}$

$x = \frac{1}{2} \Rightarrow y = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 5 = \frac{19}{4} \Rightarrow \text{Min}$

$x = 1 \Rightarrow y = 3 - 2 + 5 = 6 \Rightarrow \text{Max}$

ب)  $f'(x) = 3x^2 - 2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \end{cases}$

$x = -1 \Rightarrow y = -1 + 3 = 2 \Rightarrow \text{Max}$

$x = 1 \Rightarrow y = 1 - 2 = -1 \Rightarrow \text{Min}$

$x = 2 \Rightarrow y = 8 - 4 = 4 \Rightarrow \text{Max}$

۷ ضرایب  $a$  و  $b$  را در تابع  $f(x) = x^2 + ax + b$  طوری پیدا کنید که در نقطه  $(1, 2)$ ، ماکزیمم نسبی داشته باشد.

۸ نمودار تابعی مانند  $f$  را به گونه‌ای رسم کنید که در تمام شرایط زیر صدق کند.

$$f(-1) = 5, \quad f(4) = -2, \quad f(0) = 0$$

نقطه  $(1, 1)$  ماکزیمم نسبی این تابع باشد.

۹ یک برگه کاغذی مستطیل شکل با اضلاع  $x$  و  $y$  در اختیار داریم. با بریدن چهار مربع به ضلع  $h$  از گوشه‌های آن و تا زدن اضلاع، یک مکعب ساخته شده است. اگر  $xy = 100 \text{ cm}^2$  و  $h = 2 \text{ cm}$ ، مقادیر  $x$  و  $y$  را طوری پیدا کنید که حجم این مکعب بیشترین مقدار ممکن شود.

۱۰ یک مستطیل در یک نیم‌دایره محاط شده است. اگر شعاع دایره، ۴ سانتی‌متر باشد، طول و عرض مستطیل را طوری به دست آورید که مساحت آن بیشترین مقدار ممکن باشد.



۱۱ توابع زیر در چه بازه‌هایی صعودی و در چه بازه‌هایی نزولی اند؟

الف)  $f(x) = 2x^2 - 3x^3 - 12x + 7$

ب)  $f(x) = \frac{x}{x-2}$

$(1, 2) \Rightarrow 1 + a + b = 2 \Rightarrow a + b = 1 \Rightarrow -3 + b = 1 \Rightarrow b = 4$  (۷)

$f'(x) = 3x^2 + a \Rightarrow f'(1) = 0 \Rightarrow 3 + a = 0 \Rightarrow a = -3$



$$V = 2(x-4)(y-4) = 2xy - 8x - 8y + 32$$

$$V(x) = 2 \cdot 2 - 8x - \frac{100}{x}$$


$$V(x) = \frac{2^2 - 8x^2 - 100}{x}$$

$$V'(x) = \frac{(2^2 - 14x)(x) - (2^2 - 100)}{x^2}$$

$$\Rightarrow V'(x) = \frac{-8x^2 + 100}{x^2} = 0$$

$$\Rightarrow x^2 = 100 \Rightarrow x = 10$$

$$\Rightarrow y = 10$$



الف)  $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - 3x + 4 \Rightarrow D_f = \mathbb{R}$   
 $f'(x) = x^2 - 3 \Rightarrow f''(x) = 2x = 0 \Rightarrow x = 0$

$x$	$0$	$+$
$f''$	$-$	$+$

تغییر نسبت پایین  
 تغییر نسبت بالا

ب)  $f(x) = \frac{x+1}{x-1} \Rightarrow f'(x) = \frac{1(x-1) - 1(x+1)}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2}$   
 $x+1=0 \Rightarrow x=-1$   
 $D = \mathbb{R} - \{1\}$   
 $f''(x) = \frac{0 + 2(x-1)^{-3}}{(x-1)^4} = \frac{2}{(x-1)^3}$

$x$	$1$
$f''$	$+$

ج)  $f(x) = \sqrt[3]{x+1} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x+1)^2}} \Rightarrow f''(x) = \frac{0 - 2 \left( \frac{2}{3\sqrt[3]{x+1}} \right)}{\left( 3\sqrt[3]{(x+1)^2} \right)^2}$   
 $D = \mathbb{R}$


$x$	$-1$
$f''$	$-$

$\Rightarrow f''(x) = \frac{-2}{3(x+1)^{\frac{5}{3}}} <$   
 $x+1=0 \Rightarrow x=-1$

$f(x) = ax^2 + bx + c$   
 $f(0) = 1 \Rightarrow 0 + 0 + c = 1 \Rightarrow \boxed{c=1}$   
 $f(1) = 2 \Rightarrow a + b + 1 = 2 \Rightarrow \boxed{a+b=1}$

abc  $x = \frac{1}{4} \Rightarrow f''\left(\frac{1}{4}\right) = 0 \Rightarrow f'(x) = 4ax + b \Rightarrow 4a\left(\frac{1}{4}\right) + b = 0$   
 $\Rightarrow 4a + b = 0$

$\begin{cases} a+b=1 \\ 4a+b=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-2 \\ a+b=1 \Rightarrow b=3 \end{cases}$



$$x^2 + y^2 = r^2 = 14$$

$$\Rightarrow y^2 = 14 - x^2 \Rightarrow y = \sqrt{14 - x^2}$$

$$S(x) = 2xy = 2x\sqrt{14 - x^2}$$

$$\Rightarrow S'(x) = 2\sqrt{14 - x^2} + \frac{2x(-2x)}{2\sqrt{14 - x^2}} = \frac{2(14 - x^2) - 2x^2}{\sqrt{14 - x^2}}$$

$$\Rightarrow S'(x) = \frac{42 - 4x^2}{\sqrt{14 - x^2}} = 0 \Rightarrow 4x^2 = 42 \Rightarrow x^2 = 10.5 \Rightarrow x = \sqrt{10.5}$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{10.5} \Rightarrow x = 2\sqrt{2.625} \Rightarrow y = \sqrt{14 - 10.5} = \sqrt{3.5}$$

$$f(x) = 2x^2 - 2x^3 - 12x + 7$$

$$f'(x) = 4x - 6x^2 - 12 = x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x=2 \\ x=-1 \end{cases}$$

$x$	$-\infty$	$-1$	$2$	$+\infty$
$f'$		+	-	+
$f$		↗	↘	↗

در بازه  $(-1, 2)$  صعودی و در بازه  $(2, +\infty)$  و  $(-\infty, -1)$  نزولی

$$f(x) = \frac{x}{x-2} \quad D = \mathbb{R} - \{2\}$$

$x$	$-\infty$	$2$	$+\infty$
$f'$		-	-
$f$	↘	○	↘

در  $\mathbb{R} - \{2\}$  یعنی در تمام نقاط دامنه نزولی می باشد


$$f'(x) = \frac{1(x-2) - 1(x)}{(x-2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-2}{(x-2)^2} < 0$$

۱۱  
الف

۱۲


## جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن



با تابع  $f(x) = x^3$  آشنایی دارید. از آنجا که مشتق این تابع مثبت است، لذا شیب خطوط مماس بر منحنی این تابع در  $x = 0$  برابر صفر و در سایر نقاط همواره  $f'(x) = 3x^2$  در  $x = 0$  برابر صفر و در تمام نقاط دیگر مثبت است و این تابع همواره صعودی است. با این حال اگر خطوط مماس بر این منحنی را به صورت پاره خط‌هایی کوچک در اطراف نقاط مماس رسم کنید خواهید دید که این پاره خط‌ها برای  $x$  های منفی در بالای نمودار و برای  $x$  های مثبت در زیر نمودار واقع اند. اصطلاحاً گفته می‌شود که جهت تقعر این تابع در بازه  $(-\infty, 0)$  به سمت پایین و در بازه  $(0, +\infty)$  به سمت بالا است. برای درک بهتر مفهوم تقعر منحنی یک تابع به دو شکل زیر توجه کنید.




مماس‌ها در بالای منحنی اند.  
تقعر به سمت پایین است.




مماس‌ها در زیر منحنی اند.  
تقعر به سمت بالا است.

در زیر بخشی از نمودارهای دو تابع  $h(x) = x^2$  و  $g(x) = \sqrt{x}$  در بازه  $[0, +\infty)$  و خطوط مماس بر منحنی‌های آنها در برخی نقاط این بازه رسم شده است.



(ب)



(الف)

- ۱ با حرکت از نقطه  $x = 0$  به سمت راست، شیب خطوط مماس در هر کدام از منحنی‌ها چگونه تغییر می‌کند؟ (کم می‌شود یا زیاد) جهت تقعر منحنی در هر کدام از نمودارها چگونه است؟  
 در شکل الف شیب زیاد می‌شود اما در شکل ب شیب کم می‌شود. در این نمودارها جهت تقعر منحنی چه ارتباطی با تغییرات شیب (کم شدن یا زیاد شدن) خطوط مماس دارد؟  
 در این نمودارها جهت تقعر منحنی با زیاد شدن شیب (یا کم شدن شیب) چگونه تغییر می‌کند؟  
 تابع  $h'$  در بازه  $[0, +\infty)$  صعودی است یا نزولی؟ صعودی  
 تابع  $g'$  در بازه  $[0, +\infty)$  صعودی است یا نزولی؟ نزولی

تهیه کننده:

گروه ریاضی، مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان

۵ الف) در حالت کلی، صعودی یا نزولی بودن تابع  $f$  چه ارتباطی با علامت تابع  $f'$  دارد؟

علامت  $f'$  بر بازه  $I$  مثبت است، آنگاه تابع  $f$  بر بازه  $I$  صعودی است.

علامت  $f'$  بر بازه  $I$  منفی است، آنگاه تابع  $f$  بر بازه  $I$  نزولی است.

ب) با توجه به قسمت (الف)، صعودی یا نزولی بودن تابع  $f'$  چه ارتباطی با علامت تابع  $f''$  دارد؟

علامت  $f''$  بر بازه  $I$  مثبت است آنگاه تابع  $f'$  بر بازه  $I$  صعودی است.

علامت  $f''$  بر بازه  $I$  منفی است آنگاه تابع  $f'$  بر بازه  $I$  نزولی است.



۶ با توجه به آنچه گفته شد موارد زیر را کامل کنید:

الف) اگر مقدار  $f''$  در یک بازه مثبت باشد، تابع  $f'$  در آن بازه **صعودی** است و لذا شیب خطوط مماس بر منحنی در آن بازه **بالاتر** می‌یابد و تقعر منحنی تابع  $f$  در آن بازه رو به **بالا** است.

ب) اگر مقدار  $f''$  در یک بازه منفی باشد، تابع  $f'$  در آن بازه **نزولی** است و لذا شیب خطوط مماس بر منحنی در آن بازه **کاهش** می‌یابد و تقعر منحنی تابع  $f$  در آن بازه رو به **پایین** است.

آنچه در فعالیت قبل مورد بررسی قرار گرفت به طور خلاصه در قضیه زیر، که آزمونی برای تعیین جهت تقعر نمودار تابع است، آورده شده و در این کتاب اثبات آن مدنظر نیست.

قضیه:


فرض کنیم  $f''(x)$  به ازای هر نقطه  $x$  از بازه  $I$  موجود باشد.

الف) اگر به ازای هر  $x$  از  $I$ ،  $f''(x) > 0$ ، آنگاه نمودار  $f$  روی بازه  $I$  تقعر رو به بالا دارد.

ب) اگر به ازای هر  $x$  از  $I$ ،  $f''(x) < 0$ ، آنگاه نمودار  $f$  روی بازه  $I$  تقعر رو به پایین دارد.

پ) اگر به ازای هر  $x$  از  $I$ ،  $f''(x) = 0$ ، آزمون بی نتیجه است.

مثال: جهت تقعر توابع زیر را در دامنه تعریفشان به دست آورید.



الف)  $f(x) = \frac{1}{x}$

ب)  $g(x) = x^2 + 3x^3 + 1$

حل: الف) داریم  $D_f = \mathbb{R} - \{0\}$

$$f(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow f''(x) = \frac{2}{x^3}$$

بنابراین:


اگر  $x > 0$ ، آنگاه  $f''(x) > 0$  و لذا جهت تقعر نمودار این تابع بر بازه  $(0, +\infty)$  رو به بالاست.

اگر  $x < 0$ ، آنگاه  $f''(x) < 0$  و لذا جهت تقعر نمودار این تابع بر بازه  $(-\infty, 0)$  رو به پایین است.

ب) داریم  $D_g = \mathbb{R}$ 

$$g(x) = x^3 + 3x^2 + 1 \Rightarrow g'(x) = 3x^2 + 6x \Rightarrow g''(x) = 6x + 6$$

$$g''(x) = 0 \Rightarrow 6x + 6 = 0 \Rightarrow x = -1$$



بنابراین:

اگر  $x > -1$  آنگاه  $g''(x) > 0$  و لذا جهت تغير نمودار این تابع بر بازه  $(-1, +\infty)$  به سمت بالاست.

اگر  $x < -1$  آنگاه  $g''(x) < 0$  و لذا جهت تغير نمودار این تابع بر بازه  $(-\infty, -1)$  به سمت پايين است.


### کاردر کلاس

نمودار تابع  $y = f(x)$  را با اطلاعات زیر رسم کنید:

$$f(0) = f(1) = f(2) = 0$$


و بر بازه  $(-\infty, 1)$ ،  $f''(x) < 0$

و بر بازه  $(1, \infty)$ ،  $f''(x) > 0$ .





### نقطه عطف نمودار یک تابع




نمودار تابع  $f(x) = x^7$  را در نظر بگیرید. دیدیم که جهت تغير نمودار این تابع در بازه  $(-\infty, 0)$  رو به پایین و در بازه  $(0, +\infty)$  رو به بالاست. بنابراین نقطه  $x = 0$  نقطه‌ای است که جهت تغير منحنی در آن عوض می‌شود. از طرفی در  $x = 0$  منحنی دارای مماس نیز هست. چنین نقطه‌ای از یک منحنی را نقطه عطف آن منحنی گوئیم. به عبارت دیگر:

#### تعریف

فرض کنیم تابع  $f$  در نقطه  $x = c$  پیوسته است. در این صورت نقطه  $(c, f(c))$  نقطه عطف تابع  $f$  است، هرگاه هر دو شرط زیر برقرار باشند:

- الف) نمودار  $f$  در نقطه  $(c, f(c))$  خط مماس داشته باشد.
- ب) جهت تغير  $f$  در نقطه  $(c, f(c))$  تغییر کند.



خط  $x = c$  مماس قائم است.


از شرط (الف) در تعریف نقطه عطف تابع  $f$  نتیجه می‌شود که یا  $f''(c) > 0$  یا  $f''(c) < 0$  موجود است و یا تابع  $f$  در نقطه  $c$  مماس قائم دارد. از شرط (ب) می‌توان نتیجه گرفت که خط مماس بر نمودار تابع در نقطه  $(c, f(c))$  از نمودار تابع عبور می‌کند.

از آنجا که تغير تابع در دو طرف نقطه عطف تغییر می‌کند؛ لذا  $f''(c) > 0$  در یک طرف نقطه  $c$  مثبت و در طرف دیگر آن منفی است. بنابراین  $f''(c) = 0$  نمی‌تواند مقداری به جز صفر داشته باشد؛ یعنی برای اینکه  $(c, f(c))$  یک نقطه عطف منحنی باشد، یا باید  $f''(c) = 0$  وجود نداشته باشد و یا اگر وجود دارد باید داشته باشیم  $f''(c) = 0$ . با این حال شرط  $f''(c) = 0$  برای نقطه عطف بودن  $x = c$



به تنهایی کافی نیست: یعنی ممکن است  $f''(c) = 0$  ولی  $x = c$  یک نقطه عطف تابع نباشد. به طور مثال تابع  $f(x) = x^4$  را بررسی می‌کنیم. داریم:


$$f'(x) = 4x^3, \quad f''(x) = 12x^2$$



با اینکه  $f''(0) = 0$  اما تابع  $f''$  در دو طرف  $x = 0$  مثبت است و لذا تفرع همواره به سمت بالاست و جهت تفرع در  $x = 0$  عوض نمی‌شود و لذا  $x = 0$  یک نقطه عطف این تابع نیست.

### کارد کلاسی

۱ در هر یک از نمودارهای زیر، نقاط عطف را در صورت وجود مشخص و خط مماس بر منحنی در نقاط عطف را رسم کنید.



۲ کدام یک از گزاره‌های زیر درست و کدام نادرست است؟ برای گزاره‌های نادرست مثال نقض بیاورید.

الف) در نقطه عطف علامت  $f''(x)$  تغییر می‌کند. ✓

ب) هر نقطه که علامت  $f''$  در آن تغییر کند، نقطه عطف است. ✗ **مثال مثبت (ب)**

ب) هر نقطه‌ای که در آن مقدار  $f''$  برابر صفر شود یک نقطه عطف است. ✗

ت) تابع می‌تواند بیش از یک نقطه عطف داشته باشد. ✓

ث) تابع صعودی اکید، نقطه عطف ندارد. ✗ **مثال (ب) سوال مثبت**

مثال: جهت تقعر نمودار تابع زیر را مشخص کنید و نقاط عطف آنها را به دست آورید.

الف)  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 15$

ب)  $f(x) = \sqrt[3]{x}$

حل:

الف)  $f'(x) = 3x^2 - 12x$  و  $f''(x) = 6x - 12$


$f''(x) = 0 \Rightarrow x = 2$

از آنجا که  $f''(x)$  یک تابع خطی است، و در تمام  $\mathbb{R}$  تعریف شده است و تنها در  $x = 2$  برابر صفر می شود، بنابراین تنها نقطه ای که می تواند نقطه عطف باشد  $x = 2$  است به شرط آنکه:

۱)  $f'(2)$  موجود باشد

۲)  $f''$  در دو طرف  $x = 2$  تغییر علامت دهد.

اما  $f''(x)$  یک تابع چند جمله ای است و دامنه آن  $\mathbb{R}$  است و  $f'(2)$  نیز موجود و برابر  $-12$  است، از طرفی داریم:



$x$	$-\infty$	$2$	$+\infty$
$f''$	$(-)$	$0$	$(+)$
$f$		$-1$	
		نقطه عطف	

$$f(x) = \sqrt[3]{x} \rightarrow f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \rightarrow f''(x) = \frac{-2}{9\sqrt[3]{x^5}}$$

(ب)

از آنجا که مقدار  $\sqrt[3]{x^5}$  به ازای  $x$  های مثبت، مثبت و به ازای  $x$  های منفی، منفی است.


داریم:

اگر  $x > 0$ ، آنگاه  $f''(x) < 0$  و بنابراین جهت تقعر منحنی به سمت پایین است.

اگر  $x < 0$ ، آنگاه  $f''(x) > 0$  و بنابراین جهت تقعر منحنی به سمت بالاست.



لذا جهت تقعر این تابع در  $x = 0$  عوض می‌شود. از طرفی در فصل مشتق دیدیم که این تابع در نقطه  $x = 0$  دارای مماس (مماس قائم) است.

بنابراین  $x = 0$  نقطه عطف این تابع است.



@GambBeGambDarsi


۱ اگر شکل کشیده شده در صفحه شطرنجی مربوط به نمودار تابع  $f$  باشد کدام نمودار می‌تواند نمودار تابع  $f'$  باشد؟




(الف)

$a > 0$      $0 < 0$   
 $-\frac{b}{2a} < 0 \Rightarrow -b < 0 \Rightarrow b > 0$


یعنی تابع صعودی و طول نقطه  
 عطف آن منفی باشد



(ب)





(د)



(ع)

@CamBeCam-Darsi

۱ اگر شکل زیر مربوط به نمودار تابع  $f$  باشد کدام نمودار می تواند نمودار تابع  $f$  باشد؟



تابع صعودی طول نقطه عطف آن  $x = -\frac{b}{3a}$  مثبت است یا نه؟  
 که گوییم  $\frac{b}{3a}$  درست است

تمرین

- ۱ نمودار تابع  $f$  را به گونه ای رسم کنید که در نقطه ای مانند  $a$  جهت تغير عوض شود ولی این نقطه، نقطه عطف نباشد.
- ۲ جهت تغير توابع زیر را در دامنه آنها بررسی کرده و نقطه عطف آنها را در صورت وجود به دست آورید.

الف)  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 4$       ب)  $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$       ب)  $f(x) = \sqrt[3]{x+1}$

۳ برای هر مورد یک تابع درجه ۳ مثال بزنید که نقطه داده شده نقطه عطف آن باشد.

الف) نقطه  $(0, 0)$       ب) نقطه  $(1, 0)$       ت) نقطه  $(2, 2)$   
 $f(x) = y = x^3$        $f(x) = (x-1)^3$        $f(x) = (x-2)^3 + 2$

۴ مقادیر  $a, b, c$  را در تابع  $f(x) = ax^2 + bx + c$  طوری به دست آورید که در شرایط زیر صدق کند.

$f(0) = 1$  و  $f(1) = 2$  و  $x = \frac{1}{3}$  طول نقطه عطف نمودار تابع  $f$  باشد.

۵ اگر نقطه عطف تابع درجه سوم  $y = x^3 + ax^2 + bx + c$  با ضابطه  $(0, 0)$  باشد که نمودار آن در شکل زیر رسم شده است،  $a, b, c$  را پیدا کنید.

$y' = 3x^2 + 2ax + b$       ۵

$y'' = 4x + 2a \Rightarrow 4(0) + 2a = 0 \Rightarrow a = 0$

$(\min) x = 2 \Rightarrow 3(2)^2 + 0 + b = 0 \Rightarrow b = -12$

$(0, 0) \Rightarrow 0 + 0 + 0 + c = 0 \Rightarrow c = 0$

پایه کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان

## رسم نمودار توابع

می‌دانیم که هر تابع مانند  $f$  به ازای هر  $x \in D_f$  دقیقاً یک مقدار  $y$  به دست می‌دهد به طوری که  $y = f(x)$  و زوج مرتب  $(x, y)$  یک نقطه در دستگاه مختصات مشخص می‌کند. نمودار یک تابع، شکلی است که از همه این نقاط  $(x, y)$  به ازای تمام  $x \in D_f$  ها تشکیل شده است. از آنجا که هر بازه زیرمجموعه  $\mathbb{R}$  تعداد بی‌شماری عضو دارد؛ لذا هیچ‌گاه نمی‌توان با قلم و کاغذ نمودار یک تابع را به طور کاملاً دقیق رسم کرد. در سال‌های گذشته با رسم نمودار توابع خطی و درجه ۲ به کمک نقطه‌یابی آشنا شده‌اید. در این درس با به‌کارگیری مطالبی که قبلاً گفته شد نقاط مهمی از نمودار تابع را به دست آورده و به برخی ویژگی‌های آن تابع پی می‌بریم و با استفاده از آنها شکل تقریبی تابع را رسم می‌کنیم.

مثال: اگر بدانید تابع  $y = f(x)$  به گونه‌ای است که برای آن داریم:


۱ ریشه‌های تابع  $f$  به صورت  $x = 1$  و  $x = 0$  و  $x = -2$  است و  $f$  در همه نقاط مشتق پذیر باشد.

۲ ریشه‌های تابع  $f'$  به صورت  $x = \frac{1}{4}$  و  $x = -\frac{6}{5}$  است و علامت  $f'$  بین دو ریشه منفی و سایر جاها مثبت است و  $f(\frac{1}{4}) = -0.6$  و  $f(-\frac{6}{5}) = 2$ .

۳ تابع  $f''$  تنها یک ریشه در  $x = -\frac{1}{3}$  دارد و علامت  $f''$  در سمت چپ  $-\frac{1}{3}$  منفی و در سمت راست آن مثبت است و  $f(-\frac{1}{3}) = 0.7$ .  
در این صورت نمودار تابع  $f$  را رسم کنید.

حل: از (۲) نتیجه می‌شود که تابع  $f$  بین نقاط  $x = \frac{1}{4}$  و  $x = -\frac{6}{5}$  نزولی و سایر جاها صعودی است و  $x = -\frac{6}{5}$  و  $x = \frac{1}{4}$  به ترتیب طول نقاط ماکزیمم نسبی و مینیمم نسبی تابع اند و از (۳) نتیجه می‌شود که تفرع تابع  $f$  قبل از  $x = -\frac{1}{3}$  رو به پایین و در سمت راست  $x = -\frac{1}{3}$  رو به بالاست و چون  $f'$  در  $x = -\frac{1}{3}$  وجود دارد لذا مماس در این نقطه وجود دارد، بنابراین  $x = -\frac{1}{3}$  نقطه عطف این تابع است. قبل از رسم شکل می‌توان همه اطلاعات فوق را در یک جدول خلاصه کرد.

$x$	$-\infty$	$-\frac{6}{5}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$		
$f'$	+	=	-	-	=	+	
$f''$	(-)	(-)	0	(+)	(+)		
$f$	$\nearrow$	۲	$\searrow$	۰/۷	$\searrow$	-۰/۶	$\nearrow$
		ماکزیم	نقطه عطف	مینیم			



با توجه به این اطلاعات و اینکه ریشه‌های تابع محل برخورد نمودار با محور  $x$  ها هستند نمودار تابع به صورت روبه‌رو است.

همان‌طور که در این مثال مشاهده کردیم ریشه‌ها و علامت توابع  $f'$  و  $f''$  کمک زیادی به رسم نمودار تابع می‌نماید. همچنین حد تابع در بی‌نهایت گویای رفتار و چگونگی تابع در نقاط انتهایی نموداری که رسم می‌کنیم است. به‌طور کلی برای رسم نمودار یک تابع، همه یا برخی از مراحل زیر را انجام می‌دهیم و با توجه به اطلاعات به‌دست آمده جدول رفتار تابع را تشکیل می‌دهیم و به کمک آن نمودار تابع را رسم می‌کنیم.

- ۱ دامنه تابع را مشخص می‌کنیم.
- ۲ محل تلاقی نمودار با محورهای مختصات را مشخص می‌کنیم (در صورت وجود).
- ۳  $f'$  را به‌دست می‌آوریم و با تعیین علامت آن بازه‌هایی که  $f$  بر آنها صعودی یا نزولی است را مشخص می‌کنیم.
- ۴ نقاط بحرانی و اکسترم‌های نسبی تابع را به‌دست می‌آوریم (در صورت وجود).
- ۵  $f''$  را به‌دست می‌آوریم و با تعیین علامت آن جهت تقعر تابع در بازه‌های مختلف را مشخص می‌کنیم.
- ۶ نقطه عطف تابع را مشخص می‌کنیم (در صورت وجود).
- ۷ رفتار تابع را برای مقادیر بسیار بزرگ  $x$  و بسیار کوچک  $x$  مشخص می‌کنیم (در صورت وجود).
- ۸ معادلهٔ مجانب‌های تابع را به‌دست می‌آوریم (در صورت وجود).
- ۹ تنظیم یک جدول که با خلاصه کردن اطلاعات توابع  $f$  و  $f'$  و  $f''$  در آن تشخیص چگونگی شکل نمودار آسان‌تر شود.
- ۱۰ رسم نمودار تابع با استفاده از اطلاعات قسمت‌های قبل.
- ۱۱ در صورت نیاز از نقاط کمکی هم استفاده می‌کنیم.



مثال: نمودار تابع  $f(x) = x^3$  را رسم کنید.

حل: دامنه این تابع تمام اعداد حقیقی است و این تابع در تمام دامنه اش پیوسته و مشتق پذیر است. حال با به دست آوردن  $f'$  و  $f''$  و ریشه های آنها و تعیین علامت آنها جدول رفتار تابع را تشکیل می دهیم.


$$f(x) = x^3 = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow \text{محل برخورد نمودار با محورهای مختصات}$$

$$f'(x) = 3x^2 = 0 \rightarrow x = 0$$

$$f''(x) = 6x = 0 \rightarrow x = 0$$

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$f'$		$+$	$+$
$f''$	$(-)$		$(+)$
$f$	$\nearrow$		$\nearrow$

نقطه عطف



این تابع همواره صعودی است و اکسترم نسبی ندارد. از طرفی  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  لذا دو شاخه انتهایی نمودار در ربع های اول و سوم قرار دارند.

می توان برای دقیق تر شدن شکل، نقاط بیشتری از منحنی را به دست آورد؛ مثلاً در اینجا نقاط  $(1, 1)$  و  $(-1, -1)$  نیز بر نمودار تابع واقع اند. با توجه به آنچه گفته شد می توان نمودار تابع  $y = x^3$  را به صورت مقابل رسم کرد.

مثال: جدول رفتار و نمودار تابع  $f(x) = (x-1)^2(x+3)$  را رسم کنید.

حل:

دامنه این تابع  $\mathbb{R}$  است و این تابع همواره پیوسته و مشتق پذیر است.

$$f(x) = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ یا } x = -3$$

بنابراین نقاط  $(1, 0)$  و  $(-3, 0)$  محل های برخورد با محور  $x$  ها است

$$x = 0 \Rightarrow y = 3$$

بنابراین نقطه  $(0, 3)$  محل برخورد با محور  $y$  هاست

$$f'(x) = 2(x-1)(x+3) + (x-1)^2 = (x-1)(3x+5)$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ یا } x = -\frac{5}{3}$$

لذا نقاط  $(1, 0)$  و  $(-\frac{5}{3}, \frac{256}{27})$  نقاط بحرانی اند

$$f''(x) = (3x + 5) + 3(x - 1) = 6x + 2$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$$


ز آنجا که مماس بر منحنی در نقطه  $x = -\frac{1}{3}$  وجود دارد و  $f''$  در دو طرف نقطه  $x = -\frac{1}{3}$  تغییر علامت می دهد، نقطه

نقطه عطف تابع است، از طرفی  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  نقطه عطف تابع است،  $(-\frac{1}{3}, \frac{128}{27})$

$x$	$-\infty$	$-\frac{5}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$1$	$+\infty$
$f'$		+	-	-	+
$f''$		(-)	(-)	(+)	(+)
$f$	$-\infty$	$\frac{256}{27}$	$\frac{128}{27}$		$+\infty$

ماکزیم
عطف
مینیم

حال با توجه به آنچه گفته شد نمودار تابع فوق به شکل زیر است.



تابع  $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$  را که در آن  $c \neq 0$  است تابع هموگرافیک می‌نامیم.

اگر  $c = 0$  و  $d \neq 0$  باشد معادله این تابع به صورت  $y = \frac{a}{d}x + \frac{b}{d}$  تبدیل می‌شود که معادله یک خط راست است و اگر  $c \neq 0$  و  $d \neq 0$  باشد این تابع به یک تابع ثابت تبدیل می‌شود.

در رسم نمودار تابع هموگرافیک توجه داریم که:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{c}$$

بنابراین  $y = \frac{a}{c}$  مجانب افقی این تابع است.

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{d}{c}} \frac{ax+b}{cx+d} = +\infty \text{ یا } -\infty$$

بنابراین  $x = -\frac{d}{c}$  مجانب قائم این تابع است.

مثال: جدول تغییرات و نمودار تابع  $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$  را رسم کنید.

حل: دامنه این تابع  $D_f = \mathbb{R} - \{1\}$  است. داریم  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$ ، لذا خط  $y = 1$  مجانب افقی است و از طرفی  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$ ، لذا  $x = 1$  مجانب قائم نمودار این تابع است.

همچنین نمودار تابع محورهای مختصات را در نقاط  $(0, -2)$  و  $(-2, 0)$  قطع می‌کند. اکنون با گرفتن مشتق از تابع خواهیم داشت:


$$f'(x) = \frac{-3}{(x-1)^2}, \quad x \neq 1$$

و بنابراین مشتق به ازای هر  $x$  در بازه‌های  $(-\infty, 1)$  و  $(1, +\infty)$  همواره منفی است و لذا تابع در هر کدام از این بازه‌ها نزولی است. حال با گرفتن مشتق دوم خواهیم داشت.

$$f''(x) = \frac{6(x-1)}{(x-1)^3} = \frac{6}{(x-1)^2}, \quad x \neq 1$$

بنابراین برای هر  $x$  در بازه  $(-\infty, 1)$  داریم  $f''(x) < 0$ ، لذا تقعر منحنی به سمت پایین و برای هر  $x$  در بازه  $(1, +\infty)$  داریم  $f''(x) > 0$  و لذا تقعر منحنی به سمت بالاست. جدول رفتار تابع به صورت زیر است:

$x$	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$0$	$1$	$+\infty$
$y'$	-	-	-	-	-
$y''$	$\cap$	$\cap$	$\cap$	$\cup$	$\cup$
$y$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$-2$	$-\infty + \infty$	$\rightarrow$



با توجه به اطلاعات این جدول می‌توان نمودار این تابع را به صورت روبه‌رو رسم کرد.

مثال: جدول تغییرات و نمودار تابع  $f(x) = \frac{3x+4}{-2x+1}$  را رسم کنید.

حل: دامنه این تابع  $D = \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{2} \right\}$  است. داریم  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -\frac{3}{2}$ ، لذا  $y = -\frac{3}{2}$  مجانب افقی این تابع است و از طرفی

لذا  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x) = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} f(x) = -\infty$ ،  $x = \frac{1}{2}$  مجانب قائم این تابع است. همچنین نمودار در نقاط  $(-\frac{4}{3}, 0)$  و  $(0, 4)$  محورهای مختصات را قطع می‌کند.

$$f'(x) = \frac{11}{(-2x+1)^2} \quad \text{و} \quad x \neq \frac{1}{2}$$

فصل پنجم: کاربردهای مشتق ۱۳۳


بنابراین مشتق به ازای هر  $x$  در بازه‌های  $(-\infty, \frac{1}{4})$  و  $(\frac{1}{4}, +\infty)$  همواره مثبت و در نتیجه تابع  $f$  در هر کدام از این بازه‌ها صعودی است. حال با گرفتن مشتق دوم خواهیم داشت:

$$f''(x) = \frac{44}{(-2x+1)^3} \quad \text{و} \quad x \neq \frac{1}{4}$$

بنابراین برای هر  $x$  در بازه  $(-\infty, \frac{1}{4})$  داریم  $f'' > 0$ ، لذا تقعر منحنی به سمت بالاست و برای هر  $x$  در بازه  $(\frac{1}{4}, +\infty)$  داریم  $f'' < 0$ ، لذا تقعر منحنی به سمت پایین است. جدول رفتار تابع به صورت زیر است:

$x$	$-\infty$	$-\frac{3}{4}$	$0$	$\frac{1}{4}$	$+\infty$
$y'$	+	+	+	+	+
$y''$	(+)	(+)	(+)	(-)	(-)
$y$	$-\frac{3}{4}$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$-\frac{3}{4}$

با توجه به اطلاعات این جدول و به کمک چند نقطه کمکی می‌توان نمودار این تابع را به صورت زیر رسم کرد.



$$(2, 1) = \left(-\frac{a}{c}, \frac{a}{c}\right) \Rightarrow -\frac{a}{c} = 2, \frac{a}{c} = 1 \Rightarrow a = c, d = -2c \quad (2)$$

$$(-1, 0) \Rightarrow a(-1) + b = 0 \Rightarrow a = b$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{ax + a}{ax - 2a} \Rightarrow f(x) = \frac{x + 1}{x - 2}$$

تمرین

جدول رفتار و نمودار توابع زیر را رسم کنید.

الف)  $f(x) = 2x^2 - 2x + 1$

ب)  $f(x) = x^2 - 5x + 5$

ب)  $f(x) = -x(x+2)^2$

ن)  $f(x) = \frac{2x-1}{x-2}$

ن)  $f(x) = \frac{-x}{x+3}$

ج)  $f(x) = 2x^2 - 9x^2 + 12x + 1$




فرض کنید  $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ . محل تقاطع مجانب‌های آن نقطه  $(2, 1)$  است. اگر این تابع از نقطه  $(-1, 0)$  بگذرد، ضابطه تابع را به دست آورید.

حل الگای صفر

کدام یک از نمودارهای زیر مربوط به تابع  $f(x) = x^3 + x - 2$  است.

$$x = -\frac{b}{3a} = 0 \Rightarrow f(0) = -2$$

صغورک  $0 > 0$



@GambBeGambBeGambBe

نویسنده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان


۱)  $f(x) = \frac{-x}{x+3} \Rightarrow D = \mathbb{R} - \{-3\}$

۱)  $\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = \pm \infty \Rightarrow x = -3$  جانب قائم  
 $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{-x}{x+3} = -1 \Rightarrow y = -1$  افقی

۲)  $f'(x) = \frac{-(x+3) - (1)(-x)}{(x+3)^2} = \frac{-3}{(x+3)^2}$

۳)  $f''(x) = \frac{6}{(x+3)^3}$  ( $x+3=0 \Rightarrow x=-3$ )

x	$-\infty$	$-3$	$+\infty$
f'	-	-	-
f''	-	+	+
f	-1	$-\infty$	-1




۲)  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 1$  ( $D_f = \mathbb{R}$ )

$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=2 \end{cases}$

$f''(x) = 12x - 18 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$

x	$-\infty$	1	$\frac{3}{2}$	2	$+\infty$
f'	+	+	-	+	+
f''	-	-	+	+	+
f	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$




①  $f(x) = -x(x+2)^2 \Rightarrow x=0 \Rightarrow y=0$

$f'(x) = -1(x+2)^2 + 2(x+2)(-x) = 0$

$(x+2)(-x-2-2x) = 0$

$(x+2)(-3x-2) = 0 \Rightarrow$

$x = -2$   
 $x = -\frac{2}{3}$



$f''(x) = 1(-3x-2) + (-3)(x+2) = 0$

$\Rightarrow f''(x) = -3x-2-3x-6 \Rightarrow -4x-8 = 0$

$\Rightarrow x = -\frac{4}{3}$

تہیہ کنندہ:

گروہ ریاضی مقطع دوم متوسطہ، استان خوزستان

②  $f(x) = \frac{2x-1}{x-2} \Rightarrow D = \mathbb{R} - \{2\}$


①  $x=2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \pm \infty$  (مخالف قائم)

$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{2x-1}{x-2} = 2 \Rightarrow y=2$  (مخالف افقی)

②  $f'(x) = \frac{2(x-2) - (2x-1)}{(x-2)^2} = \frac{-4}{(x-2)^2} < 0$

③  $f''(x) = \frac{0 + 4(x-2)}{(x-2)^3} = \frac{4}{(x-2)^2}$

$x-2 = 0 \Rightarrow x=2$



از نقاط کلیدی رنگی می توان استفاد کرد.




الف)  $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$  (D=R)

①  $f'(x) = 4x - 4 = 0 \Rightarrow x = 1$

②  $f''(x) = 4 > 0$

③  $x = 0 \Rightarrow y = 1$

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
f'	-	-	0	+
f''	(+)	(+)	(+)	
f	↘	↘	-	↗




ب)  $f(x) = x^3 - 5x + 4 \Rightarrow (D=R)$

$f'(x) = 3x^2 - 5 = 0 \Rightarrow x = \sqrt{\frac{5}{3}} = 1,3$

$x = -\sqrt{\frac{5}{3}} = -1,3$

$f''(x) = 6x = 0 \Rightarrow x = 0$

x	$-\infty$	$-\sqrt{\frac{5}{3}}$	0	$\sqrt{\frac{5}{3}}$	$+\infty$
f'	+	+	0	-	+
f''	-	-	0	+	+
f	↘	↘	↘	↗	↗



نهیہ کننده:

گروه ریاضی مقطع دوم متوسطه، استان خوزستان

